AUSTROSAAT

# KATALOG 2024

# GEMÜSE



Karfiol Lisboa F1

Gemüse | Kräuter | Landwirtschaft & Rasen

SAATGUT



# SORTIMENT PRODUKTE 2024

## GARTENBAU



### GEMÜSESAATGUT
### KRÄUTERSAMEN
### BLUMENSAMEN

### FOLIEN, VLIESE und KULTURSCHUTZNETZE

### STECKZWIEBEL FÜR DEN FELDGEMÜSEBAU

- Sommer- und Überwinterungssteckzwiebel
- Schalotten und Pflanzknoblauch



## GARTEN-FACHHANDEL



### PRODUKTE FÜR DEN PRIVATEN GARTENBESITZER

- Gemüse-, Kräuter- und Blumensamenportionen
- Blumenzwiebeln zur Herbst- und Frühjahrspflanzung
- Rasen-Saatgutmischungen
- Steckzwiebel & Pflanzknoblauch





## LANDWIRTSCHAFT

### SAATGUTMISCHUNGEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

- Saatgutmischungen für Zwischenfruchtbau
- Saatgutmischungen für Wein- und Obstbau
- Saatgutmischungen für Dauergrünland und Feldfutterbau



## GRÜNRAUMGESTALTUNG



### SAATGUT für GRÜNRAUMGESTALTUNG

- Rasenmischungen für Gartengestaltung, Landschafts- und Sportflächenbau
- Gräser- und Blumensamenmischungen für Gartengestalter und Landschaftspfleger

### BLUMENZWIEBELN FÜR DIE PROFESSIONELLE GRÜNRAUMGESTALTUNG

- sortenrein und in erprobten Mischungen



# NEUHEITEN 2024



00.397.7 Aubergine Minerva $F_1$



00.051.8 Buschbohne Goldstrike



00.197.3 Stangenbohne Cobra


siehe Seite

00.397.7 «Finger»-Aubergine Minerva $F_1$ .....15
00.051.8 Buschbohne gelb Goldstrike .....17
00.097.6 Buschbohne violett Purple Queen ....17
00.197.3 Stangenbohne grün Cobra.....18
00.193.5 Stangenbohne grün Python.....18
00.053.2 Stangenbohne grün Markant .....18
00.570.4 Markerbse Eddy .....19
01.429.4 Treibgurke Dee Lite $F_1$ .....25
03.381.3 Karotte Orchestro $F_1$.....27
02.033.2 Karfiol Lisboa $F_1$ (CMS) .....31
02.980.9 Chinakohl Scarnade $F_1$ (CMS).....33
02.267.1 Weißkraut Cape Horn $F_1$.....41




00.570.4 Markerbse Eddy



00.193.5 Stangenbohne Python



01.429.4 Treibgurke Dee Lite $F_1$



03.381.3 Karotte Orchestro $F_1$



00.053.2 Stangenbohne Markant



02.033.2 Karfiol Lisboa $F_1$



02.980.9 Chinakohl Scarnade $F_1$



02.267.1 Weißkraut Cape Horn $F_1$

# NEUHEITEN 2024



02.165.0 Kalettes® Autumn Star $F_1$



02.324.1 Weißkraut Pronca $F_1$



02.272.5 Weißkraut Accord $F_1$



02.166.7 Sprouting-Brokkoli Limba $F_1$



02.278.7 Sprouting-Brokkoli Tyrian $F_1$

siehe Seite


02.272.5 **Weißkraut Accord $F_1$** ..... 41
02.324.1 **Weißkraut Pronca $F_1$** ..... 41
02.166.7 **Sprouting-Brokkoli Limba $F_1$ (CMS)** .... 44
02.278.7 **Sprouting-Brokkoli Tyrian $F_1$ (CMS)** .... 44
02.158.2 **Sprouting-Karfiol Fioretto Purple $F_1$** .44
02.165.0 **Sprouting-Flower Autumn Star $F_1$** ..... 44
03.104.8 **Kürbis Flexi Kuri $F_1$** ..... 47
03.087.4 **Kürbis Leckør $F_1$** ..... 47
03.081.2 **Kürbis Baby Pam** ..... 51
03.093.5 **Kürbis Tuffy** ..... 51
03.080.5 **Kürbis Ugly Dumpling $F_1$** ..... 51




02.158.2 Sprouting-Karfiol Fioretto Purple $F_1$



03.093.5 Kürbis Tuffy



03.104.8 Kürbis Flexi Kuri $F_1$



03.087.4 Kürbis Leckør $F_1$



03.081.2 Kürbis Baby Pam



03.080.5 Kürbis Ugly Dumpling $F_1$

# NEUHEITEN 2024



**03.409.4 Zuckermais Takeoff F1**



**03.778.1 Paprika Sunakko Yuzu F1**



**03.307.7 Paprika Zentus F1**


siehe Seite

03.409.4 **Zuckermais Takeoff F1** ..... 56
03.307.7 **Paprika Zentus F1** ..... 67
03.778.1 **Paprika Sunakko Yuzu F1** ..... 69
03.779.8 **Paprika Sunakko Mikan F1** ..... 69
03.777.4 **Paprika Sunakko Ichigo F1** ..... 69
03.721.7 **Pfefferoni Tuono F1** ..... 71
03.505.3 **Topf-Pfefferoni Maya F1** ..... 71
04.209.9 **Rote Rübe Aurora F1** ..... 83
04.262.5 **Rote Rübe RedVal F1** ..... 83
03.874.0 **Feldsalat Vitabel** ..... 84
06.829.7 **Mizuna-Mix F1** ..... 85
06.828.0 **Blattsenf Mix F1** ..... 85




**03.779.8 Paprika Sunakko Mikan F1**



**03.721.7 Pfefferoni Tuono F1**



**03.505.3 Pfefferoni Maya F1**



**03.777.4 Paprika Sunakko Ichigo F1**



**04.209.9 Rote Rübe Aurora F1**



**03.874.0 Feldsalat Vitabel**



**04.262.5 Rote Rübe RedVal F1**

# NEUHEITEN 2024



**04.423.9 Treibsalat Eichblatt rot Mondrian**



**04.681.3 Eazyleaf Salat Skilton**



**05.051.3 Endivie Benefine**



**05.063.6 Chicorée Atlas F1**



**05.143.5 Sellerie Boston F1**


siehe Seite

04.423.9 **Treibsalat Eichblatt rot Mondrian** .....89
04.681.3 **Eazyleaf Salat Skilton** .....96
05.051.3 **Winterendivie Benefine** .....99
05.063.6 **Chicorée Atlas F1** .....100
05.143.5 **Sellerie Boston F1** .....103
05.319.4 **Tomate Bauna F1** .....107
05.357.6 **Tomate Irvin F1** .....107
05.416.0 **Tomate Loreto F1** .....109
05.653.9 **Überwinterungszwiebel Thalassa F1** ..122
05.683.7 **Überwinterungszwiebel Telesto F1** .....122
05.774.1 **Basilikum Evi** .....126
21.195.2 **Hirschhornwegerich** .....129




**05.357.6 Tomate Irvin F1**



**05.416.0 Tomate Loreto F1**



**21.195.2 Hirschhornwegerich**



**05.319.4 Tomate Bauna F1**



**05.653.9 Zwiebel Thalassa F1**



**05.683.7 Zwiebel Telesto F1**

AUSTROSAAT

# bio 2024

BIO

## Übersicht

Stand Oktober 2023

# Gemüsesaatgut und Kräutersamen aus ökologischer Landwirtschaft

AT-BIO-401

Von der überwiegenden Mehrheit der Sorten in unserem Angebot ist unbehandeltes Saatgut für den ökologischen Anbau erhältlich (im Katalog erkenntlich am grünen Kreis **O**). Auf den folgenden Seiten haben wir zur raschen Übersicht die Sorten zusammengestellt, von denen Saatgut aus biologischer Landwirtschaft verfügbar ist (erkenntlich an dem grünen Punkt, ● = Biosaatgut). Den jeweils aktuellen Stand des verfügbaren Bio-Sortiments finden Sie auf der AGES-Biosaatgut-Datenbank unter: **www.ages.at**










Bio AUSTRIA

# bio Gemüsesaatgut & Kräutersamen aus ökologischer Landwirtschaft 2024

AT-BIO-401

*eine Übersicht*

Auch in der Saison 2024 bieten wir wieder Bio-Saatgut, also Saatgut aus anerkannt ökologischer Vermehrung und natürlich nur ungebeizt, an. Die hier angeführten Arten und Sorten können jedoch nur unter dem Vorbehalt eines guten Ernteverlaufes der Vermehrungen angeboten werden. Weitere Sorten auf Anfrage.

Voraussichtlich werden bei einigen Sorten nur begrenzte Mengen an Saatgut zur Verfügung stehen. Eine zeitgerechte Bestellung ist also empfohlen, bildet sie doch die Voraussetzung für die spätere Lieferfähigkeit der Saatgutes.



**00.386.1/0009 Aubergine Bartok F1**



**00.712.8/3009 Knollenfenchel Preludio F1**



**02.080.6/1009 Karfiol Flamenco F1**



**03.370.7/2009 Karotte Bangor F1**



**02.194.0/1009 Karfiol Veronica F1**



**19.374.6/0009 Grünkohl Nero di Toscana**

## AUBERGINEN

00.386.1/**0009** **Aubergine BARTOK F1** ..... *NS* K ●

## BOHNEN

00.065.5/**0009** **Buschbohne grün MAXI** ..... *NS* ●

00.285.7/**0009** **Stangenbohne grün NECKARGOLD** ..... *NS* ●

00.053.2/**0009** **Stangenbohne grün MARKANT** ..... *NS* ●

00.328.1/**0009** **Feuerbohne LADY DI** ..... *NS* ●

## FENCHEL

00.712.8/**3009** **Knollenfenchel PRELUDIO F1** ..... *TP* ●

00.710.4/**3009** **Knollenfenchel SOLARIS F1** ..... *TP* ●

00.713.5/**3009** **Knollenfenchel DRAGON F1** ..... *TP* ●

## GURKEN

01.429.4/**0009** **Treibgurke DEE LITE F1** ..... *NS* K ●

01.430.0/**1009** **Mini-Treibgurke KHASSIB F1** ..... *PR* K ●

01.427.0/**0009** **Mini-Treibgurke KATRINA F1** ..... *NS* K ●

01.439.3/**0009** **Mini-Treibgurke PICOLINO F1** ..... *NS* K ●

## KAROTTEN & MÖHREN

03.407.0/**2009** **Karotte MAESTRO F1** ..... *KS* K ●

03.424.7/**2009** **Karotte MIAMI F1** ..... *PR* K ●

03.370.7/**2009** **Karotte BANGOR F1** ..... *PR* K ●

03.356.1/**2099** **Karotte BENGALA** ..... *PR* K ●

03.526.8/**2009** **Gelbe Möhre YELLOWSTONE** ..... *PR* K ●

## KOHLGEMÜSE

02.240.4/**1009** **Brokkoli COVINA F1** ..... *PR* K ●

02.080.6/**1009** **Karfiol FLAMENCO F1** ..... *PR* K ●

02.194.0/**1009** **Karfiol Romanesco VERONICA F1** ..... *PR* K ●

02.957.1/**1009** **Chinakohl BILKO F1** ..... *PR* K ●

02.732.4/**1009** **Wirsingkohl FAMOSA F1** ..... *PR* K ●

19.374.6/**0009** **Grünkohl NERO DI TOSCANA** ..... *NS* ●

03.017.1/**1009** **Kohlrabi KORIST F1** ..... *PR* K ●

03.029.4/**1009** **Kohlrabi VIKORA F1** ..... *PR* K ●

03.028.7/**1009** **Kohlrabi KOSSAK F1** ..... *PR* K ●



Stand Oktober 2023

*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

## KOHLGEMÜSE Fortsetzung

03.023.2/**1009** **Kohlrabi KOLIBRI F1** ..... PR K ●
02.888.8/**1009** **Sprossenkohl DAGAN F1** ..... PR K ●
02.887.1/**1009** **Sprossenkohl HEMERA F1** ..... PR K ●
02.884.0/**0009** **Sprossenkohl GRONINGER** ..... NS ● 
02.364.7/**1009** **Weißkraut AMAZON F1** ..... PR K ●
02.380.7/**1009** **Weißkraut EXPECT F1** ..... PR K ●
02.385.2/**1009** **Weißkraut FARAO F1** ..... PR K ●
02.558.0/**1009** **Weißkraut TYPHOON F1** ..... PR K ●
02.643.3/**1009** **Rotkraut INTEGRO F1** ..... PR K ●
02.641.9/**1009** **Rotkraut KLIMARO F1** ..... PR K ●
02.702.7/**1009** **Rotkraut TRAVERO F1** ..... PR K ●

## KRESSE

03.115.4/**0009** **Gartenkresse CRESSIDA** ..... NS ● 
03.120.8/**0009** **Gartenkresse EINFACHE** ..... NS ● 

## KÜRBIS

03.133.8/**0009** Hokkaido-**Kürbis AMORO F1** ..... NS K ●
03.185.7/**0009** Hokkaido-**Kürbis UCHIKI KURI** ..... NS K ●
03.104.8/**0009** Hokkaido-**Kürbis FLEXI KURI F1** ..... NS K ●
03.204.5/**0009** Hokkaido-**Kürbis TRACTOR** ..... NS K ●
03.181.9/**0009** Hokkaido-**Kürbis SOLOR** ..... NS K ●
03.167.3/**0009** Hokkaido-**Kürbis FICTOR** ..... NS K ●
03.087.4/**0009** Hokkaido-**Kürbis LECKØR F1** ..... NS K ●
03.100.0/**0009** Riesenkürbis-**Kürbis BLUE BALLET** ..... NS K ●
03.140.6/**0009** Butternuß-**Kürbis BUTTERNUT** ..... NS K ●
03.165.9/**0009** Butternuß-**Kürbis TIANA F1** ..... NS K ●
03.142.0/**0009** **Kürbis MOSCHATA DE PROVENCE** ..... NS K ●

## ZUCCHINI

03.124.6/**0009** **Zucchini FENNA F1** ..... NS K ●
03.228.1/**0009** **Zucchini KEESHA F1** ..... NS K ●
03.108.6/**0009** **Zucchini YELLOWFIN F1** ..... NS K ●
03.102.4/**0009** **Zucchini LINGODOR F1** ..... NS K ●
03.229.8/**0009** **Zucchini SATELITE F1** ..... NS K ●
03.220.5/**1009** **Zucchini TEMPRA F1** ..... PR K ●
03.222.9/**0009** **Kletter-Zucchini OLA ESCALADORA** ..... NS K ●

## MANGOLD

03.275.5/**0009** **Mangold RHUBARB CHARD** ..... NS ● 



**02.385.2/1009 Weißkraut Farao F1**



**02.643.3/1009 Rotkraut Integro F1**



**03.181.9/0009 Kürbis Solor F1**



**03.204.5/0009 Kürbis Tractor**



**03.165.9/0009 Kürbis Tiana F1**



**03.133.8/0009 Kürbis Amoro F1**



**03.228.1/0009 Zucchini Keesha F1**



**03.229.8/0009 Zucchini Satelite F1**

# bio Gemüsesaatgut & Kräutersamen aus ökologischer Landwirtschaft 2024

AT-BIO-401

*eine Übersicht*



03.529.9/0009 Paprika Austrocapi



03.573.2/1009 Paprika Fiesta F1



Paprika (von links nach rechts): 03.611.1/0009 Olly F1, 03.614.2/0009 Ilyn F1, 03.613.5/0009 Elsa F1, 03.599.2/0009 Waldo F1, 03.617.3/0009 Lilo F1



03.667.8/0009 Pfefferoni Milder Spiral



03.659.3/0009 Pfefferoni Chili-AS Rot



03.955.6/2009 Radies Wiener Rotes Treib



04.122.1/2009 Rettich Wiener Runder Kohlschwarzer

## PAPRIKA & PFEFFERONI

| | | |
|---|---|---|
| 03.613.5/0009 | Paprika ELSA F1 | NS K ● |
| 03.573.2/0009 | Paprika FIESTA F1 | NS K ● |
| 03.572.5/0009 | Paprika GIALTE F1 | NS K ● |
| 03.611.1/0009 | Paprika OLLY F1 | NS K ● |
| 03.599.2/0009 | Paprika WALDO F1 | NS K ● |
| 03.563.3/0009 | Paprika BENDIGO F1 | NS K ● |
| 03.617.3/0009 | Paprika LILO F1 | NS K ● |
| 03.614.2/0009 | Paprika ILYN F1 | NS K ● |
| 03.657.9/0009 | Paprika XARO | NS K ● |
| 03.649.4/0009 | Paprika ZAZU | NS K ● |
| 03.616.6/0009 | Paprika KYRA | NS K ● |
| 03.529.9/0009 | Paprika AUSTROCAPI | NS K ● |
| 03.538.1/0009 | Paprika WE 880 | NS K ● |
| 03.533.6/0009 | Paprika GELBER BLOCK | NS K ● |
| 03.536.7/0009 | Paprika NEUSIEDLER IDEAL® | NS K ● |
| 03.595.4/0009 | Snack-Paprika CUCCINO ORANGE | NS K ● |
| 03.637.1/0009 | Snack-Paprika ARWEN | NS K ● |
| 03.638.8/0009 | Snack-Paprika RADJA | NS K ● |
| 03.639.5/0009 | Snack-Paprika FLYNN | NS K ● |
| 03.667.8/0009 | Pfefferoni MILDER SPIRAL | NS K ● |
| 03.669.2/0009 | Pfefferoni ZIEGENHORN BELLO | NS K ● |
| 03.663.0/0009 | Pfefferoni HALBLANGER VULKAN | NS K ● |
| 03.687.6/0009 | Pfefferoni KOH CHANG | NS K ● |
| 03.701.9/0009 | Pfefferoni KOH TAO F1 | NS K ● |
| 03.659.3/0009 | Pfefferoni CHILI-AS ROT | NS K ● |

## PETERSILIE

| | | |
|---|---|---|
| 03.797.2/0009 | Schnittpetersilie GIGANTE D'ITALIA | NS ● |

## PORREE

| | | |
|---|---|---|
| 03.817.7/1009 | Porree GENT | PR K ● |
| 03.817.7/3009 | –"– | TP ● |
| 03.819.1/1009 | Porree IMPALA Ⓢ | PR K ● |
| 03.819.1/3009 | –"– | TP ● |

## RADIES & RETTICH

| | | |
|---|---|---|
| 03.955.6/2009 | Radies WIENER ROTES TREIB | KS ● |
| 04.122.1/2009 | Rettich WIENER RUNDER KOHLSCHWARZER | KS ● |

## ROTE RÜBEN

| | | |
|---|---|---|
| 04.193.1/1009 | Rote Rübe BORO F1 | PR K ● |

## FELDSALAT

| | | |
|---|---|---|
| 03.880.1/1009 | Feldsalat CLARA | PR K ● |
| 03.899.3/0009 | Feldsalat VIT | NS ● |



Stand Oktober 2023

*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

## RUCOLA

04.310.2/**0009** **Rucola COLTIVATA** ..... NS ● 
04.311.9/**0009** **Rucola SELVATICA** ..... NS ●

## SALATE

04.330.0/**3009** **Freilandsalat ANALOTTA** ..... TP ●
04.428.4/**3009** **Freilandsalat DICATA** ..... TP ●
04.430.7/**3009** **Freilandsalat SINISA** ..... TP ●
04.630.1/**0009** **Freilandsalat ADMIRAL** ..... NS ●
04.728.5/**0009** **Freilandsalat KAGRANER SOMMER** ..... NS ●
04.877.0/**0009** **Freilandsalat NEUSIEDLER GELBER WINTER** NS ●
04.638.7/**3009** **Eissalat EDUARDO** ..... TP ●
04.378.2/**3009** **Eissalat DANILO** ..... TP ●
04.670.7/**0009** **Batavia GRAZER KRAUTHÄUPTEL 2** ..... NS ●
04.670.7/**3009** **–"–** ..... TP ●
04.304.1/**3009** **Batavia MAREIKA** ..... TP ●
04.752.0/**3009** **Batavia MARCORD** ..... TP ●
04.979.1/**3009** **Batavia MINERAL** ..... TP ●
04.411.6/**3009** **Lollo Bionda BABILA** ..... TP ●
04.299.0/**3009** **Lollo Rossa THEA** ..... TP ●
04.334.8/**3009** **Eichblattsalat grün ADMIR** ..... TP ●
04.810.7/**3009** **Eichblattsalat rot ALONIX** ..... TP ●
04.323.2/**3009** **Salanova® EXPERTISE** ..... TP ●
04.678.3/**3009** **Salanova® TRALEX** ..... TP ●
04.326.3/**3009** **Salanova® HAWKING** ..... TP ●
04.923.4/**3009** **Mini-Romanasalat XOANA** ..... TP ●
04.900.5/**0009** **Romanasalat FORELLENSCHLUß** ..... NS ●
06.814.3/**0009** **Spargelsalat CHINESISCHE KEULE** ..... NS ●

## ENDIVIEN

05.011.7/**3009** **Endivie ELIANCE** ..... TP ●
05.044.5/**3009** **Endivie NUANCE** ..... TP ●

## ZICHORIEN - ZUCKERHUT

05.105.3/**3009** **Zichoriensalat SUMERO F1** ..... TP ●
05.104.6/**3009** **Zichoriensalat URANUS F1** ..... TP ●
05.091.9/**3009** **Zichoriensalat VESPERO F1** ..... TP ●

## RADICCHIO

05.085.8/**3009** **Radicchio LEONARDO F1** ..... TP ●

## SELLERIE

05.135.0/**3009** **Sellerie PRINZ** ..... TP ●
05.127.5/**3009** **Sellerie MONARCH** ..... TP ●



**04.330.0/3009 Kopfsalat Analotta**



**04.430.7/3009 Kopfsalat Sinisa**



**04.979.1/3009 Batavia Mineral**



**04.670.7 Batavia Grazer Krauthäuptel 2**



**04.810.7/3009 Eichblatt rot Alonix**



**04.323.2/3009 Salanova Expertise**



**05.044.5/3009 Endivie Nuance**



**05.085.8/3009 Radicchio Leonardo F1**

# bio Gemüsesaatgut & Kräutersamen aus ökologischer Landwirtschaft 2024

AT-BIO-401

*eine Übersicht*



05.488.7/0009 Tomate
Enroza F1



05.434.4/0009 Tomate
Maitai F1



05.491.7/0009 Tomate
Myriade F1



05.321.7 Tomate
Bolstar Granda



05.494.8 Tomate
Bolstar Gimli F1



05.312.5 Tomate
Bolstar Sensatica F1

## TOMATEN

05.321.7/**0009** Tomate **BOLSTAR GRANDA** ..... NS Ⓚ ●
05.494.8/**0009** Tomate **BOLSTAR GIMLI F1** ..... NS Ⓚ ●
05.448.1/**0009** Tomate **CODINO F1** ..... NS Ⓚ ●
05.491.7/**0009** Tomate **MYRIADE F1** ..... NS Ⓚ ●
05.312.5/**0009** Tomate **BOLSTAR SENSATICA F1** ..... NS Ⓚ ●
05.450.4/**0009** Tomate **HANAMI F1** ..... NS Ⓚ ●
05.432.0/**0009** Tomate **CUBALIBRE F1** ..... NS Ⓚ ●
05.434.4/**0009** Tomate **MAITAI F1** ..... NS Ⓚ ●
05.488.7/**0009** Tomate **ENROZA F1** ..... NS Ⓚ ●
05.299.9/**0009** Tomate **BERNER ROSE** ..... NS Ⓚ ●
05.594.5/**0009** Tomate **ZIEGLERS FLEISCH** ..... NS Ⓚ ●

## ZWIEBEL & SCHALOTTEN

05.657.7/**7009** Sommerzwiebel **WIENER BRONZEKUGEL** ... PR Ⓚ ●
05.660.7/**7009** Sommerzwiebel **WIRO** ..... PR Ⓚ ●
05.725.3/**7009** Schnittzwiebel **PARADE** ..... PR Ⓚ ●
05.844.1/**7009** Säschalotte **CONSERVOR F1** ..... PR Ⓚ ●

## KRÄUTER

05.915.8/**0009** Basilikum Hohes Grünes **SUPERBO** ..... NS 👜 ●
05.774.1/**0009** Basilikum **EVI** ..... NS Ⓚ ●
05.750.5/**0009** Basilikum **DARK OPAL** ..... NS 👜 ●
05.920.2/**0009** **BOHNENKRAUT** (Pfefferkraut) ..... NS 👜 ●
05.933.2/**0009** Dill **TETRA** ..... NS 👜 ●
21.195.2/**0009** **HIRSCHHORNWEGERICH** ..... NS 👜 ●
05.950.9/**0009** **KAMILLE** ..... NS 👜 ●
05.955.4/**0009** Kerbel **FIJNE KRUL (Extra Krauser)** ..... NS 👜 ●
05.963.9/**0009** Koriander **KAIROS** ..... NS 👜 ●
05.982.0/**0009** **OREGANO** ..... NS 👜 ●
05.991.2/**0009** **ROTER SONNENHUT (Echinacea)** ..... NS ●
05.995.0/**0009** **SALBEI** ..... NS 👜 ●
05.114.5/**0009** Schnittlauch **STARO** ..... NS Ⓚ ●
06.000.0/**0009** **THYMIAN** ..... NS 👜 ●
05.980.6/**0009** **ZITRONENMELISSE** ..... NS 👜 ●



05.657.7/7009 Sommerzwiebel
Wiener Bronzekugel



05.660.7/7009 Sommerzwiebel
Wiro



Stand Oktober 2023

*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen 👜 = Verkauf nach Gewicht Ⓚ = Verkauf nach Korn

# GEMÜSE SAATGUT

## das Sortiment 2024

## von **A**rtischocke bis **Z**wiebel



Hänge-Erdbeere Toscana F1

Erdbeeren siehe Seite 124















00.405.9 Aubergine Teti $F_1$



00.401.1 Aubergine Money Maker No. 2 $F_1$



00.375.5 Aubergine Lemmy $F_1$



00.382.3 Aubergine Avan $F_1$



00.397.7 Aubergine Minerva $F_1$



00.379.3 Aubergine Ko Nasu $F_1$



00.386.1 Aubergine Bartok $F_1$



00.371.7 Aubergine Roxanne $F_1$



00.372.4 Aubergine Luna $F_1$



00.373.1 Aubergine Rosabella $F_1$



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# ARTISCHOCKE *Cynara scolymus L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 g | 200 g | Mitte Feb.–Mai | Mai–Juni | 100x100 | im nächsten Jahr | 100–150 kg |

00.010.5 **Verte de Provence (Green globe)** NS O
Breite, dicke und fleischige Blütenknospen.



# AUBERGINE (Melanzani, Eierfrucht) *Solanum melongena L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–8 g | 12 g bzw. 1.400 K. | ab Ende Februar bei 20–25°C | ab Mitte Mai, od. früher in Folien- od. Glashaus | 80 x 50 bzw. 60 x 60 | ab Mitte Juni (im Haus) | 1.600 – 2.000 Stück |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Farbe | Frucht gewicht ca. | Kelch | Kultur | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dunkelviolette Sorten** | | | | | | |
| 00.379.3 | **Ko Nasu F₁** NS K O | schwarz-violett | 70–100 g | violett | geschützter Anbau, Freiland | feste Früchte, Länge 12–15 cm, sehr gute Haltbarkeit; starke Pflanzen; 3-triebiges Aufleiten möglich; Fruchtansatz auch bei warmen Bedingungen |
| 00.401.1 | **Money Maker No. 2 F₁** NS K O | dunkel-violett | 200–300 g | violett | Treib und Freiland | bringt etwa 20 cm lange, schlanke Früchte; die Pflanze ist wüchsig, gesund und sehr reichtragend |
| 00.382.3 | **Avan F₁** PR K O | dunkel-violett | 250–300 g | grün | Treib und Freiland | bildet eine längliche Frucht von marktgerechter Größe, Form und Farbe aus; die Früchte sind sehr gleichmäßig |
| 00.405.9 | **Teti F₁** PR K O | schwarz-violett | 300–350 g | grün, stachelarm | Treib und Freiland | kräftig wachsende Hybride mit länglich-ovalen Früchten; das Fruchtfleich ist weiß und enthält nur wenige Samen |
| 00.386.1 | **Bartok F₁** NS K O, NS K ● | schwarz-violett | 300–350 g | grün, stachellos | geschützter Anbau | auch für Anbau im Folientunnel in Erde; offener Wuchs; halblange, ovale, feste Früchte; schmale Kelchblätter, langer Stiel |
| 00.375.5 | **Lemmy F₁** NS K O, | schwarz-glänzend | 225–400 g | grün, stachelarm | geschützter Anbau | generative Pflanze mit offenem Wuchs; halblange, ovale Früchte, die wenig Samen bilden; Mai-Juni kann es auch zu kleineren Früchten kommen; |
| **Sonderfarben & Sonderformen** | | | | | | |
| 00.397.7 | **Minerva F₁** *NEU* NS K O | hell-violett | ca. 35 g | grün, stachelarm | geschützter Anbau, Freiland | «**Fingermelanzani**»; Schulterbreite ca. 3 cm, Ernte bei einer Größe von 12–15 cm; grüner, wenig gestachelter Kelch; **gut geeignet zum Grillen und Braten** |
| 00.372.4 | **Luna F₁** PR K O | weiß | 300–400 g | grün, stachelarm | geschützter Anbau, Freiland | elfenbeinweiße, **rund-ovale Frucht** mit grünem Kelch; große, kräftige Pflanzen mit früher Reife |
| 00.374.8 | **Niobe F₁** PR K O | leuchtend violett | ca. 400 g | violett, stachelarm | geschützter Anbau, Freiland | mittelkräftige Pflanzen; frühe Reife; **runde Früchte** mit leuchtend violetter Farbe und weißem, süßlich schmeckendem Fruchtfleisch |
| 00.373.1 | **Rosabella F₁** PR K O | lila-violett | ca. 400 g | grün, stachelarm | Gewächshaus und Freiland | **rund-ovale Frucht** mit weißem Fruchtfleisch; exzellente Größe; mittel-frühe Reife; mittel-kräftige Pflanzen |
| 00.371.7 | **Roxanne F₁** PR K O | violett-weiß gestreift | ca. 250 g | grün, stachelarm | geschützter Anbau, Freiland | **violett-weiß gestreifte, ovale Frucht** mit weißem Fleisch; mittelfrühe Reife; mittelgroße Pflanzen mit aufrechtem Wuchs |
| **Topfsorten** | | | | | | ***kleinfrüchtig, für Pflanzkübel und Hochbeet auf Terrasse und Balkon*** |
| 00.392.2 | **Jackpot F₁** NS K O | dunkel-violett | ca. 80 g | grün | geschützter Anbau, Freiland | leuchtend dunkelviolette, 8–10 cm große Früchte; gut verzweigter, kompakter Wuchs; Höhe ca. 55 cm, Breite ca. 45 cm |
| 00.390.8 | **Pinstripe F₁** NS K O | purpur-weiß gestreift | ca. 80 g | grün | geschützter Anbau, Freiland | purpur-weiß gestreifte, 8–10 cm große Früchte; gut verzweigter, kompakter Wuchs; Höhe ca. 55 cm, Breite ca. 45 cm |



**00.374.8 Aubergine Niobe F₁**



**00.392.2 Aubergine Jackpot F₁**



**00.390.8 Aubergine Pinstripe F₁**



00.054.9 Buschb. Golden Goal



00.051.8 Buschbohne Goldstrike




Douglas im Austrosaat Buschbohnenversuch, Burgenland



00.055.6 Buschbohne Poseidon



00.097.6 Buschbohne Purple Queen



00.036.5 Buschbohne Douglas



00.125.6 Buschbohne Jaguar



Feuerbohne (Lady Di) am Spaliernetz



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# BUSCHBOHNEN *Phaseolus vulgaris L.*

EH = Einheit (100.000 K)

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Reihenabst. in cm | Ernte-termin | Ertrag pro ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 160–460 g | 55–175 kg je nach Korngr. bzw. 300.000–400.000 K | Ende April-Ende Juli | 40–50 | Ende Juni-Oktober | 6.000 - 16.000 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | TKG ca. in g | Reife-zeit | Ernte ca. Tage nach Aufgang | Hülsen Länge/cm | Hülsen Quer-schnitt | Hülsen Farbe | Korn-Farbe | Aussaat kg/ha | Eignung für | Widerstands-fähig gegen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grünhülsig, ohne Fäden** | | | | | | | | | | | | |
| 00.093.8 | **Rimember** NS EH; NS EH O | 175 | mittel | 65 | 12–13 | rund | dunkel-grün | weiß | 60/80 | I. F. | BCMV, Cl, Psp | für Filetbohne, Hülsenquerschnitt 8–10 mm |
| 00.125.6 | **Jaguar** NS O; NS EH O | 240 | mittel | 65 | 14–15 | rund | sehr dkl. grün | weiß | 85/95 | I. F. | BCMV, Cl, Ua | mittelfeine, hitzetolerante Sorte, leicht beerntbar, für maschinelle Ernte geeignet |
| 00.055.6 | **Poseidon** NS EH*, NS O; NS EH O* | 460 | mittel | 70 | 13–15 | breit, flach | mittel-grün | weiß | 140/180 | I. F. | Psp,BCMV, Cl | breite, flachhülsige Bohne mit fleischigen Hülsen |
| 00.036.5 | **Douglas** NS EH, NS O; NS EH O | 240 | spät | 70–75 | 13–15 | rund | mittel-grün | weiß | 85/95 | I. F. | BCMV, Psp, Ua | für maschinelle Ernte geeignet, sehr standfest |
| **Gelbhülsig, ohne Fäden (Wachsbohnen)** | | | | | | | | | | | | |
| 00.054.9 | **Golden Goal** NS EH, NS O; NS EH O | 260 | früh - mittel | 60 | ca. 14 | rund | intensiv gelb | weiß | 90/105 | F. | BCMV | ertragreich, standfest, sehr gleichmäßige Hülsen, für maschinelle Ernte geeignet |
| 00.051.8 | **Goldstrike** *NEU* NS EH | 240 | früh - mittel | 60 | 13–15 | rund | mittel-gelb | weiß | 110/120 | F. | BCMV, Cl | mittelfeine, standfeste, sehr ertragreiche Wachsbohne; für maschinelle Ernte geeignet |

*) Poseidon: 1 Einheit = 40.000 Korn

**BCMV** = Bohnenmosaikvirus *(Bean Common Mosaic Virus)*; **Cl** = Brennflecken *(Colletotrichum lindemuthianum)*; **Psp** = Fettflecken *(Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola)*, **Ua** = *Rost (Uromyces appendiculatus;* I. = Industrie F. = Frischmarkt

## Sorten für Direktvermarktung (z.B. Marktgärtner)

**Buschbohne grünhülsig**

00.065.5 **Maxi:** Mittelfrühe Pflückbohne mit 16–18 cm langen, runden, hellgrünen Hülsen mit hellbraunem Korn. Die Hülsen hängen über dem Laub. TKG ca. 300 g. Aussaatmenge ca. 1–1,2 kg/100 m². NS O, NS ●

**Buschbohne violetthülsig**

00.097.6 **Purple Queen:** Frühe Pflückbohne mit ca. 15 cm langen runden, violetten Hülsen und beigem Korn. Die Sorte kommt auch mit kühlen, feuchten Bedingungen zurecht. TKG ca. 350 g. Aussaatmenge 1,2-1,5kg/m². Beim Garen verfärben sich die Hülsen grün. NS O

# STANGENBOHNEN siehe Seite 18

# FEUERBOHNEN *Phaseolus coccineus L*

00.328.1 **Lady Di** NS ●

Kräftige, fadenlose rotblühende Feuerbohne mit einer langen Ernteperiode. Aussaat Mai bis Juni, Ernte Juli bis Oktober. Lady Di hat 28–30 cm lange, grüne Schoten und langsam ausreifende, **schwarz-lila Körner**. Wenn die Pflanzen in voller Blüte stehen, sind sie sehr dekorativ. Für Anbau im gemäßigten Klima.Tolerant gegen BCMV (V1) und BYMV.



**00.328.1 Feuerbohne Lady Di**

# PUFFBOHNEN *Vicia faba L. (partim)*

00.022.8 **Vroma** NS O

Sehr früher ‚Witkiem'-Typ mit ca. 19 cm Hülsenlänge und **hellbraunem Korn**. Sehr hoher Ertrag mit gleichmäßigem Fruchtansatz. Sehr gute Frischmarkt-Eignung. TKG 1.600–1.900 g.



**00.022.8 Puffbohne Vroma**

**Anmerkung: Generell sind die in diesem Katalog angebotenen Samen und Bohnenkerne als Saatgut zur Produktion von Pflanzen zu verwenden und können nicht als Lebensmittel für Speisezwecke verwendet oder verkauft werden.**

# STANGENBOHNEN *Phaseolus vulgaris L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf für 100 m² | Saat-termin | Reihenabst. in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 – 500 g | ca. 0,3–0,5 kg bzw. 1.000–1.300 K. | Anfang Mai – Mitte Juni | 100 x 50 je 5-7 Korn | Mitte Juli – Oktober | 150 – 250 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | TKG ca. in g | Reifezeit | Ernte ab ca. Tagen nach Aufgang | Hülsen Länge | Hülsen Querschnitt | Hülsen Farbe | Korn Farbe | Widerstands-fähig gegen | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grünhülsig, ohne Fäden** | | | | | | | | | | |
| 00.194.2 | **Algarve** NS O | 450 | sehr früh | 60 | sehr lang | flach, breit | mittelgrün | weiß | BCMV (V1) | sehr frühe, sehr breite Schwertbohne; Hülsenlänge 26–28 cm, Breite ca. 25 mm |
| 00.212.3 | **Ballet** NS O | 350 | früh - mittelfrüh | 60 | sehr lang | flach, breit | mittelgrün | weiß | BCMV (V1), BYMV | uniforme Hülsen; Hülsenlänge ca. 27 cm, Breite ca. 25 mm; sehr hoher Frühertrag |
| 00.197.3 | **Cobra** *NEU* NS O | 350 | mittel-spät | 80 | lang | rund | mittelgrün | schwarz | BCMV (V1), Cl | 18–20 cm lange Hülsen; hoher Ertrag; Anbaueignung Treib und Freiland |
| 00.193.5 | **Python** *NEU* NS O | 220 | mittel | 80 | lang | rund | mittelgrün | schwarz | BCMV (V1), Cl | 18–20 cm lange Hülsen; hoher Ertrag; Anbaueignung Treib und Freiland |
| **Gelbhülsig, ohne Fäden** | | | | | | | | | | |
| 00.225.3 | **Golden Gate** NS O | 340 | sehr früh | 60 | sehr lang | flach, breit | gelb | weiß | BCMV (V1), | Topsorte mit ca. 24 cm Hülsenlänge und ca. 2,3 cm Hülsenbreite |

**BCMV** = Bohnenmosaikvirus *(Bean Common Mosaic Virus)*, **BYMV** = Bohnengelbmosaikvirus, **Cl** = Brennflecken *(Colletotrichum lindemuthianum)*

## Sorten für Direktvermarktung (z.B. Marktgärtner)

**Stangenbohne grünhülsig**

00.053.2 **Markant** *NEU*: Frühe Sorte mit rundovalen Hülsen. Anbau im Freiland ab Mitte Mai, unter Glas ab Mitte März. widerstandsfähig gegen BCMV (V1). TKG ca. 300–500 g. NS O, NS ●

**Stangenbohne gelbhülsig**

00.285.7 **Neckargold:** Mittelfrühe Sorte mit langen, runden, tiefgelben Hülsen mit weißem Korn. TKG ca. 340 g. NS O, NS ●

**Anmerkung: Generell sind die in diesem Katalog angebotenen Samen und Bohnenkerne als Saatgut zur Produktion von Pflanzen zu verwenden und können nicht als Lebensmittel für Speisezwecke verwendet oder verkauft werden.**



**00.197.3 Stangenbohne Cobra**



**00.193.5 Stangenbohne Python**



**00.212.3 Stangenbohne Ballet**



**00.194.2 Stangenbohne Algarve**



**00.053.2 Stangenbohne Markant**



**00.225.3 Stangenbohne Golden Gate**



NS = Normalsaatgut KS = kalibriertes Saatgut PR = Präzisionssaatgut TP = Topfpillen

# ERBSEN - SPEISEERBSEN *Pisum sativum L. (partim)*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Reihenabstand in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 220–350 g | siehe Sorten | März –Mai Frühanbau bringt bes. Erträge | Frühsorten: 40 Spätsorten: 45–50 Ablage in der Reihe: 5 cm | Juni–Juli | mit Hülsen: 80–120 kg Kornertrag 40–60 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | TKG ca. | Aussaat kg per ha | Pflanzen-höhe cm | ca. Reife in Tagen nach Aufgang | Hülsen Länge/cm | Hülsenfarbe/ Kornfarbe | Kornzahl pro Hülse | Resistenzen (IR) | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zuckererbsen** (Zuckerschote, zur Ernte und Konsumation mit Hülse) | | | | | | | | | | |
| 00.412.7 | **Oregon Sugar Pod** NS O | 300 g | 240–290 | 90–120 | 60-65 | 9–10 | hellgrün/ hellgrün | 5–7 | Fop1, PEMV, Ep | erntereif solange die Erbsen in den flachen Schoten kaum ausgebildet sind |
| **Pal- oder Schalerbsen** (mit glattem Samenkorn) | | | | | | | | | | |
| 00.525.4 | **Kleine Rheinländerin** NS O | 220 g | 175–210 | 55 | 56 | 8–10 | dunkelgrün/ mittelgrün | 8–9 | | mittel- bis großkörnig, geschwungene Hülsenspitze |
| **Markerbsen** (mit gerunzeltem Samenkorn) | | | | | | | | | | |
| 00.575.9 | **Exzellenz** NS O | 240 g | 210–240 | 50 | 53 | 9–11 | dunkelgrün/ dunkelgrün | 8–10 | | früheste Sorte, bewährter Standard |
| 00.570.4 | **Eddy** *NEU* NS O | 260 g | 180–200 | 75–80 | 75–80 | 11–12 | mittelgrün/ dunkelgrün | 9–11 | Ep | hohe Kornanzahl pro Hülse; widerstandsfähig und ertragreich; für Frischmarkt |

**Hinweis für konventionellen Erbsen-Anbau:** Bei ungebeiztem Saatgut – wegen gleichmäßigem Aufgang – unbedingt Fungizidbeizung durchführen.

Angaben beziehen sich auf Hülsenernte für Frischmarkt. Definition entsprechend der ISF (International Seed Federation): IR = intermediäre/mittlere Resistenz

(IR) = intermediäre Resistenz
BYMV = Bohnenmosaikvirus
Ep = Echter Mehltau (Erysiphe pisi)
Fop 1 = Fusarium oxysporum f. sp. pisi Rasse 1
PEMV = Pea Enation Mosaic Virus
Pv = Peronospora viciae = Falscher Mehltau



**00.525.4 Palerbse Kleine Rheinländerin**



**00.575.9 Markerbse Exzellenz**



**00.570.4 Markerbse Eddy**


**BROKKOLI** . . . . . *siehe Kohlgewächse (S. 29)*
**CHINAKOHL** . . . . . *siehe Kohlgewächse (S. 33)*
**DILL** . . . . . *siehe Gewürze und Kräuter (S. 128)*
**EIERFRUCHT** . . . . . *siehe Aubergine (S. 15)*
**ENDIVIE** . . . . . *siehe Salate (S. 99)*



**RhizoFix®** **Flüssige Rhizobien-Impfmittel zur einfachen Impfung von Saatgut unmittelbar vor der Aussaat!**

Sorgfältig ausgewählte Rhizobien-Stämme die möglichst schnell eine Symbiose mit folgenden Kulturaten eingehen: z.B. ***RF 30*** mit Erbsen, ***RF 60*** mit Stangen- und Buschbohnen. Unsere Verkaufsmitarbeiter im Außendienst beraten Sie gerne!

# FENCHEL (Knollenfenchel) *Foeniculum vulgare Miller*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf für 100 m² | Saat-termin | Pflanz-termin | Reihenabst. in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4–6 g | Direktsaat: ca. 40 g bzw. 8.000 K. Vorkultur: 10 g bzw. 2.000 K für 1.000 Pfl. | Kultur im Folientunnel: Mitte Jänner Freilandkultur: Feb–Anf. Juli | Folientunnel: März Freiland März–Aug. | 40–45 cm x 20 cm | Folientunnel: Ende Mai Freiland Juli–Oktober | 150–250 kg |




**Kulturzeit: 100–120 Tage**

**ACHTUNG:** Um bei früher Aussaat der Schoßerbildung vorzubeugen, empfehlen wir neben der Sortenwahl eine warme Jungpflanzenanzucht bei 25 °C. Gegen Wildverbiss einzäunen.

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife in Tagen nach Pflanzung | Knollen-Form | Pflanzung | Ernte | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.714.2 | **Tenace F₁** *TPO* | 65 | rund | Anf. März - Ende Mai | Mitte Mai - Mitte August | hohe Schosstoleranz unter Kälte und Hitze; Aussaat ab Jänner unter Glas für Pflanzung Anfang März; reinweiße Knollen |
| 00.712.8 | **Preludio F₁** *TPO, TP● geprimt* | 70 | rund | Anf. März - Ende Juli | Mitte Mai - Mitte Okt. | sehr uniforme Sorte mit aufrechtem Wuchs; gute Schossfestigkeit, stark gegen braune Ränder |
| 00.710.4 | **Solaris F₁** *TPO, TP●* | 73 | rund - bauchig | Anf. März - Ende April; Mitte Juli - Mitte August | Mitte Mai - Mitte Juni; Anf. - Ende Oktober | geschlossene, weiße Knollen mit schmalem Bodenbereich; unempfindlich gegen Platzen und braune Ränder |
| 00.713.5 | **Dragon F₁** *TP●* | 75 | rund | Anf. Mai - Mitte August | Mitte Juli - Ende Okt. | schossfest, auch bei kritischen Wachstumsbedingungen im Hochsommer; feste Schale, sehr gute Haltbarkeit |



**00.714.2 Knollenfenchel Tenace F₁**



**00.712.8 Knollenfenchel Preludio F₁**



**00.710.4 Knollenfenchel Solaris F₁**



**00.713.5 Knollenfenchel Dragon F₁**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# GURKEN

## Einlegegurken | Feldgurken | Treibgurken | Minigurken





**01.393.8 Einlegegurke Anya $F_1$**



**01.298.6 Einlegegurke Harriet $F_1$**



**01.052.4 Salatgurke Corinto $F_1$**



**01.011.1 Salatgurke Audax $F_1$**



**01.290.0 Einlegegurke $F_1$ Majestosa**



**01.010.4 Salatgurke Amanda $F_1$**



**01.188.0 Salatgurke Lili $F_1$**



**01.195.8 Salatgurke Sagro $F_1$**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# EINLEGEGURKEN *Cucumis sativus L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–30 g | 1,5–2 kg oder 30.000–55.000 Korn | Ende April – Mai | ab A. Mai unter Vlies möglich | 120x25–30 bei Mulchfolie 180x25–30 | Juli–Sept. | 200–450 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | | Länge Dicke | Reife ab Tagen nach Aufgang | Resistent*) gegen CMV | Ccu | Pcu | Px | Bitter-frei | Frucht-schale | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Parthenokarpe Sorten** | | | | | | | | | | | |
| 01.298.6 | **Harriet $F_1$** | NS Ⓚ O | 3,3 : 1 | 50 | HR | HR | | | X | glatt | kompakte frühe Sorte mit zylindrischen, dunkelgrünen Früchten; für Freiland und Tunnelproduktion; für Cornichons und Gewürzgurken |
| 01.290.0 | **Majestosa $F_1$** | PR Ⓚ O | 3,2 : 1 | 52 | IR | HR | IR | HR | X | glatt | hohes Ertragspotenzial, sehr gutes Regenerationsvermögen auch unter schwierigen Bedingungen |
| 01.393.8 | **Anya $F_1$** | NS Ⓚ O | 3,1 : 1 | 52 | HR | HR | IR | IR | X | warzig | stresstolerante Sorte mit langem Erntefenster; für ungeheizten Folientunnel und Freiland; sehr gut geeignet zur Salzgurkenproduktion |

***) Resistenzen:**
**HR = hohe Resistenz**
**IR = intermediäre (mittlere Resistenz)**

**CMV** = **Gurkenmosaikvirus** (Cucumber Mosaic Virus)
**Ccu** = **Gurkenkrätze** (Cladosporium cucumerinum)

**Pcu** = **Falscher Mehltau** (Pseudoperonospora cubensis)
**Px** = **Echter Mehltau** (Podosphaera xanthii)

**PARTHENOKARPE GURKENSORTEN**

Unter parthenokarpen Sorten versteht man solche, die Früchte ansetzen, ohne dass eine Bestäubung notwendig ist.
**Die Vorteile der Parthenokarpie sind:**

1. **Frühere Ernte**: 7–15 Tage früher, auch bei kalter Witterung, da kein Bienenflug notwendig ist.
2. **Höherer Ertrag**: Größere Fruchtanzahl pro Pflanze.
3. **Gleichmäßigere Sortierung**.
4. **Weniger Pflückaufwand**, da eine größere Anzahl an Früchten gleichzeitig reift.

# FELDGURKEN, Slicer-, Salat-, Schäl-, Senfgurken *Cucumis sativus L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–30 g | 1,0–1,5 kg oder 30.000–50.000 Korn | ab A. Mai | ab A. Mai unter Vlies möglich | 100–150 x 30 | Juli–Oktober | 300–450 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | | Reifezeit | Reife ca. Tage nach Aufgang | Frucht Länge/cm | Länge: Dicke | Resistent*) gegen CMV | Cca | Ccu | CVYV | CYSDV | WMV | Px | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Salat- oder Feldgurken** | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.052.4 | **Corinto $F_1$** | NS Ⓚ O | sehr früh - früh | 58–60 | 18–20 | 4,4:1 | IR | | | IR | | | IR | kompakte, robuste Pflanzen; parthenokarp; auch für Unterglasanbau; auch Sekundärfrüchte haben eine sehr gute Qualität |
| 01.011.1 | **Audax $F_1$** | NS Ⓚ O | früh | 60 | 16–22 | 4,5:1 | IR | | HR | IR | IR | IR | IR | besonders für geschützten Anbau mit Aufleitung; homogene Sortierung; gutes Regenerationsvermögen; leicht gestachelt |
| 01.010.4 | **Amanda $F_1$** | NS Ⓚ O | früh | 60 | 23–28 | 4,5:1 | | | | | | | | robuste Sorte mit guter Gesundheit |
| 01.188.0 | **Lili $F_1$** | NS Ⓚ O | früh - mittel | 62 | 22–24 | 4,4:1 | | | | | | | | bitterfrei, tolerant gegen Falschen Mehltau |

**Alle Sorten bilden bitterfreie Früchte aus und sind dunkelgrün.**

***) Resistenzen:**
**HR = hohe Resistenz**
**IR = intermediäre (mittlere Resistenz)**

**CMV** = **Gurkenmosaikvirus** (Cucumber Mosaic Virus)
**Cca** = **Blattbrand** (Corynespora cassiicola)
**Ccu** = **Gurkenkrätze** (Cladosporium cucumerinum)

**CVYV** = **Ipomovirus** (Cucumber Vein Yellowing Virus)
**CYSDV** = **Cucumber yellowing stunting disorder**
**WMV** = **Watermelon mosaic**
**Px** = **Echter Mehltau** (Podosphaera xanthii)

## Sorten für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

01.195.8 **Salatgurke Sagro $F_1$:** Ertragssichere, bitterfreie Sorte mit dunkelgrünen, 20–22 cm langen Früchten. Länge:Dicke 4,0:1. NS Ⓚ O

01.000.5 **Schäl- oder Senfgurke Fatum:** Bitterfreie Riesenschälgurke mit glattschaligen, langen, schweren, dunkelgrünen Walzen und kleinem Kerngehäuse. Ideal als Schäl-, Senf- oder Schmorgurke. Länge 35-40 cm, Gewicht ca. 450 g. NS Ⓚ O



**01.427.0 Mini-Treibgurke Katrina $F_1$**



**01.429.4 Treibgurke Dee Lite $F_1$**



**01.012.8 Treibgurke Dee Scribe $F_1$**



**01.230.6 Snack-Gurke Hopeline $F_1$**



**01.430.0 Mini-Treibgurke Khassib $F_1$**



**01.443.0 Snack-Gurke Quarto $F_1$**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# TREIBGURKEN *Cucumis sativus L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–30 g | 1.100 Korn | Ende Dezember - Mitte Juli | Anfang Februar - Anfang August | 160 x 40 (ca. 1,6 Pfl. pro m²) | 3–7 Wochen nach Pflanzung | 2.500–4.500 Stk. |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Länge/cm | Frucht Schale | Resistent gegen | Besonders f. Pflanzung im frühen Frühjahr | Besonders f. Pflanzung im späten Frühjahr | Besonders f. Pflanzung im Herbst | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.429.4 | **Dee Lite F₁** *NEU* NS Ⓚ O, NS Ⓚ ● | 29–35 | leicht gerieft | **HR:** Cca / Ccu / CGMMV **IR:** CMV / CVYV / Px | | X | X | hohe Anbausicherheit im Substratanbau; wenig empfindlich für Chlorosen; halboffener Wuchs; für Anbau ab April |
| 01.012.8 | **Dee Scribe F₁** NS Ⓚ O | 30–35 | leicht gerieft | **HR:** Cca / Ccu **IR:** CMV / CVYV / CGMMV / Px | | X | | für Sommergewächshaus, Pflanzung KW 13–29; kräftige, generative, offene Pflanzen |
| | **Snack-Gurken** | | | | | | | |
| 01.230.6 | **Hopeline F₁** NS Ⓚ O | 8–10 | glatt - leicht gerieft | **IR:** CMV / Px / CVYV | | X | X | reichtragend; auch für Ampelbepflanzung an geschützten Standorten; knackige Früchte, Gewicht 80–150 g; überhängender Wuchs |
| 01.443.0 | **Quarto F₁** PR Ⓚ O | 8–10 | leicht gerieft | **HR:** Ccu / Px | | X | X | sehr offene Pflanzen; kurze Internodien, 3–5 Früchte je Blattachsel; bis 2,5 Pfl./m² auf Substrat und Erde |
| 01.439.3 | **Picolino F₁** NS Ⓚ O, NS Ⓚ ● | 12–15 | glatt - leicht gerieft | **HR:** Cca / Ccu **IR:** CMV / CVYV / Px | | X | | Fruchtgewicht 130–150 g; gleichmäßiger Fruchtansatz; angenehm süßlicher Geschmack; auch für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner |
| | **Mini-Treibgurken** | | | | | | | |
| 01.430.0 | **Khassib F₁** PR Ⓚ, PR Ⓚ ● | 16–18 | leicht gerieft | **HR:** Ccu / Px; **IR:** CMV / CVYV **IR:** PRSV / WMV / ZYMV | | X | X | dunkelgrüner Beth-Alpha-Typ; parthenokarp |
| 01.427.0 | **Katrina F₁** NS Ⓚ, NS Ⓚ ● | 16–18 | leicht gerieft | **HR:** Ccu **IR:** CMV / Px / CVYV / CGMMV | X | X | X | robuste Pflanzen mit gutem Regenerationsvermögen; für Anbau auf Substrat und Erde |

## Sorten für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

01.447.8 **Saladin F₁** NS Ⓚ O
Frühe Sorte für Erdkultur. Fruchtlänge ca. 32–38 cm.

01.060.9 **Kalunga F₁** NS Ⓚ O
Robuste Sorte für Pflanzung von Frühjahr bis Herbst. Fruchtlänge ca. 32–34 cm, leicht geriefte Früchte; 400-500 g. Resistenzen: **HR:** Cca / Ccu; **IR:** Px.

## Veredelungsunterlage

01.535.2 **Cucurbita moschata Ancora F₁** NS Ⓚ O
Gurkenunterlage mit generativem Charakter. Gute Kältetoleranz im Frühjahr und Herbst. In Erdkulturen bildet sich kein Silicium-Belag auf den Früchten.
Resistenzen: **R**: Foc, **IR**: Foc

**Resistenzen:**

**HR: hohe Resistenz**
**IR: intermediäre (mittlere Resistenz)**

**CMV** = **Gurkenmosaikvirus** (Cucumber Mosaic Virus)
**Cca** = **Blattbrand** (Corynespora cassiicola)
**Ccu** = **Gurkenkrätze** (Cladosporium cucumerinum)
**CGMMV** = **Gurkengrünscheckenvirus**
**CVYV** = **Ipomovirus** (Cucumber Vein Yellowing Virus)
**Foc** = **Fusarium** (Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum)
**Px** = **Echter Mehltau** (Podosphaera xanthii)
**Pcu** = **Falscher Mehltau**
**PRSV** = **Papaya Ringspot Virus**
**WMV** = **Wassermelonenvirus**
**ZYMV** = **Zucchinigelbmosaikvirus**



**01.439.3 Snack-Gurke Picolino F₁**



**01.060.9 Treibgurke Kalunga F₁**



**01.447.8 Treibgurke Saladin F₁**




**03.383.7 Karotte Calibra F1**



**03.478.0 Karotte Speedo F1**



**03.368.4 Karotte Bolero F1**



**03.407.0 Karotte Maestro F1**



**03.381.3 Karotte Orchestro F1**



**03.464.3 Karotte Octavo F1**



**03.370.7 Karotte Bangor F1**



**03.520.6 Karotte Anina**



**03.526.8 Möhre Yellowstone**



**03.387.5 Möhre Gold Nugget F1**



**03.468.1 Karotte Rainbow F1**



**03.356.1 Karotte Bengala F1**



**03.491.9 Karotte Deep Purple F1**



**03.466.7 Karotte Purple Haze F1**



**Karottenversuch Niederösterreich**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# KAROTTEN und MÖHREN *Daucus carota L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Reihenabstand in cm | Ernte-termin | Ertrag pro ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8-1,2 g | siehe unten | Fr. Bund: Feb.-März<br>Sommer u. Herbst: März-Juli | 25-30<br>bei Dammkultur: 75 cm<br>30-60 | Juni-Juli<br>Juli-Okt. | 40-50 t<br>70-80 t |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife-tage nach Aufgang | Wurzel Länge | Wurzel Form | Wurzel Schale | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nantaiser-Typen** Hybridsorten | **) auch 25.000 Korn-Packungen bzw. in Kleinmengen verfügbar* | | | | | |
| 03.383.7 | **Calibra $F_1$** KS Ⓚ, KS Ⓚ O | 70 | kurz - mittel | zylindrisch, A | glatt | Bundkarotte, intensiv orange Farbe; Wurzellänge 19–22 cm; bei hoher Aussaatstärke (ca. 7 Mio.K/ha) als Minikarotte verwendbar |
| 03.478.0 | **Speedo $F_1$** PR Ⓚ *gepr.*)*, PR Ⓚ O*) | 100 | mittel | mittel | sehr glatt | sehr schnelle Frühkarotte; auch für Vlieskultur; mittel resistent gegen Alternaria und Cercospora |
| 03.368.4 | **Bolero $F_1$** KS Ⓚ *), KS Ⓚ O*) | 115 | lang | zylindrisch, A | sehr glatt | gesundes Laub, bruchfest, gut lagerfähig; resistent gegen Alternaria und Echten Mehltau |
| 03.407.0 | **Maestro $F_1$** KS Ⓚ *), KS Ⓚ ●*) | 125 | mittel | zylindrisch, A | sehr glatt | gesundes Laub, bruchfest; gute Toleranz gegen Alternaria, Echten Mehltau u. Cavity Spot; Anbau Mitte April - Mitte Juni |
| 03.381.3 | **Orchestro $F_1$** Ⓢ *NEU* KS Ⓚ | 125 | lang | zylindrisch, A | sehr glatt | kräftiges, aufrechtes Laub; starkwüchsig; hohe Resistenz gegen Alternaria, Echten Mehltau und Xanthomonas |
| 03.464.3 | **Octavo $F_1$** KS Ⓚ, KS Ⓚ O | 125 | mittel | zylindrisch - leicht konisch, A/B | sehr glatt | Maestro Typ; tolerant gg. Alternaria u. Echten Mehltau; speziell für Packware/Kiloware; kräftiges, gesundes Laub; bruchfest |
| 03.424.7 | **Miami $F_1$** PR Ⓚ ●*) | 135 | mittel | zylindrisch, A | glatt | widerstandsfähige Sorte; gute Lagereignung; nur in Bio-Saat |
| **Berlikumer-, Flakkeer- und Mischtypen** Hybridsorten | **) auch 25.000 Korn-Packungen bzw. in Kleinmengen verfügbar* | | | | | |
| 03.370.7 | **Bangor $F_1$** PR Ⓚ, PR Ⓚ ●*) | 105 | mittel | konisch, C | glatt | früher Berlikumer-Typ für Frischmarkt und Industrie; großfallende, walzenförmige Ware |
| **Nantaiser und Berlikumer** samenfeste Sorten | **) auch 25.000 Korn-Packungen bzw. in Kleinmengen verfügbar* | | | | | |
| 03.390.5 | **Nantes 2/Topfix** NS 🛆 O*) | 120 | mittel | zylindrisch, A | glatt | mittellange Nantaiser mit guter Lagereignung |
| 03.356.1 | **Bengala $F_1$** PR Ⓚ, PR Ⓚ O, PR Ⓚ ● | 120 | mittel | zylindrisch, A | glatt | Wasch/Industriekarotte, gleichmäßiges Wachstum; stark gegen Alternaria; hoher Ertrag; Wurzellänge 19–21 cm |
| 03.520.6 | **Anina** PR Ⓚ O | 125 | mittel | zylindrisch, A | glatt | mittelfrühe Nantaiser, Wurzellänge ca. 20–25 cm; mit starkem Laub; für Frischmarkt und Lagerung |

Ⓢ = zum Sortenschutz angemeldet - Versuchssaatgutgerelung

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife-tage nach Aufgang | Wurzel Länge | Wurzel Form | Wurzel Schale | Wurzel Farbe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gelbe Möhren** | **) auch 25.000 Korn-Packungen bzw. in Kleinmengen verfügbar* | | | | | | |
| 03.387.5 | **Gold Nugget $F_1$** KS Ⓚ O | 135 | mittel | konisch, E | glatt - leicht geringelt | hellgelb | gleichmäßige Hybride, für Suppengrün und Industrie |
| 03.526.8 | **Yellowstone** PR Ⓚ *), PR Ⓚ ●*) | 140 | lang - sehr lang | kegelförmig, E | leicht geringelt | gelb | für Suppengemüse und Industrie, sehr ertrag-reich, leichte grüne Kappe |
| **Spezialsorten** | **) auch 25.000 Korn-Packungen bzw. in Kleinmengen verfügbar* | | | | | | |
| 03.468.1 | **Rainbow $F_1$** PR Ⓚ O*) | 110 | lang | konisch, E | leicht geringelt | weiß-gelb, orange-rot | Naintaiser-Typ mit weiß-gelben und orange-roten Tönen; für Frischmarkt und Industrie |
| 03.466.7 | **Purple Haze $F_1$** PR Ⓚ *), PR Ⓚ O*) | 100 | lang | konisch spitz, D | leicht geringelt | violett | spätere Reife; für Frischmarkt und Industrie (auch Farbstoffgewinnung) |
| 03.491.9 | **Deep Purple $F_1$** PR Ⓚ O*) | 150 | lang | konisch, E | leicht geringelt | intensiv tief violett | ideal für die industrielle Verwertung (auch Farbstoff-gewinnung; nicht zu früh säen; starkes Laub |

**Berechnung des Saatgutbedarfes** (Mittelwerte) **F1-Hybriden**

1. Gewünschte Anzahl **Karotten pro Laufmeter** (Band):
**Bundkarotte** (Folie).....**100** Wurzeln/lfm  **Berlikumer** .....**40–60** Wurzeln/lfm
**Nantaiser**.....**70–90** Wurzeln/lfm  **Flakkeer** .....**30–50** Wurzeln/lfm

2. Berechnung des **Saatgutbedarfes pro Laufmeter:**
Anzahl Samen pro lfm = gewünschte Anzahl Möhren : 0,66

Die Zahl 0,66 ergibt sich aus Keimfähigkeit (ø 80–90 %), Aufgang des Saatgutes auf dem Felde und Verlust während der Wachstumszeit.

**Berechnung des Saatgutbedarfes** (Mittelwerte) **offen bestäubte Sorten**
**Nantaiser** .....**2,2–2,5 kg oder 2,2–2,5 Mio. Korn / Hektar**
**Berlikumer** .....**1,0–1,5 kg oder 1,0–1,5 Mio. Korn / Hektar**
**Flakkeer und Gelbe Möhren** .....**0,8–1,2 kg oder 0,8–1,2 Mio. Korn / Hektar**

## KAROTTENFORMEN:




🛆 = Verkauf nach Gewicht  Ⓚ = Verkauf nach Korn  O = ungebeiztes Saatgut  ● = Biosaatgut



02.236.7 Brokkoli Batavia $F_1$



02.234.3 Brokkoli Quinta $F_1$



02.235.0 Brokkoli Green Belt $F_1$



02.250.3 Brokkoli Parthenon $F_1$





Unsere Verkaufsmitarbeiter im Außendienst beraten Sie gerne!




02.240.4 Brokkoli Covina $F_1$



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# BROKKOLI *Brassica oleracea L. (convar. botrytis var. cymosa)*



| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro 1000 m² | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4–6 g | 5.000 – 8.000 K | Februar – Juli | Anfang April – August | 50–60 x 40–50 | Juni – Oktober | 100 – 150 kg |




Wird der Haupttrieb herausgeschnitten, so bilden sich mehrere Seitentriebe, die ebenfalls verwertet werden können. Kultur wie bei Karfiol. Bei Frühkultur warme Jungpflanzenanzucht (25°C) wegen Schossergefahr.Die Entwicklungszeit ist abhängig vom Pflanztermin, den Boden- und Witterungsverhältnissen.

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | | ca. Reife-tage | Pflanzung | Ernte | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.236.7 | **Batavia F₁** | PR Ⓚ | 65 | Anf. April - Ende Juli | Anfang Juni - Ende Oktober | schnellwachsende Sorte; geringe Neigung zur Seitentriebbildung, schön geformte, hochrunde Köpfe; Resistenzen: HR: Foc, IR: Ac |
| 02.237.4 | **Ares F₁** | PR Ⓚ O | 65-70 | Mai - Mitte Juli | Mitte Juli - Ende September | schnellwachsend; kompakte Pflanzen mit dunkelgrünen Knospen und niedriger Kopfposition; gute Hitzetoleranz; schöne halbrunde Kopfform |
| 02.240.4 | **Covina F₁** | PR Ⓚ, PR Ⓚ ● | 75-80 | Anf. April - Ende Juli | Mitte Juni - Ende Oktober | feingekörnte Blumen mit hohen Kopfgewichten (Rosengewicht ca. 500 g); Resistenzen: HR: Foc |
| 02.243.5 | **Naxos F₁** (CMS) | NS Ⓚ O, PR Ⓚ O | 75-80 | Mitte Mai - Mitte Juni | Ende Juli - Ende August | dunkel blaugrüne Sorte mit halbrunder Kopfform; für den Sommeranbau, sehr hitzetolerant; für Frischmarkt |
| 02.231.2 | **Triton F₁** (CMS) | NS Ⓚ O | 75-80 | Anf. Juni - Anf. August | September - Ende Okt./Anf. Nov. | wüchsige Sorte mit dunkelgrünen, hochrunden, sehr feinen Rosen; stark gegen Herzlosigkeit; Gewicht: 400-600 g; für Frischmarkt und Industrie |
| 02.250.3 | **Parthenon F₁** (CMS) | PR Ⓚ O | 80-85 | Anf. Juni - Ende Juli | Ende August - Ende Okt./Anf. Nov. | dunkelgrüne, kleine, halbrunde Knospen; wenig anfällig für Seitentriebe; widerstandsfähig gegen Stress (heiss/kalt), tolerant gg. hohle Strünke und Anthocyan-Verfärbung |

**Foc = Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans, Acc = Albugo candida, Xcc = Xanthomonas campestris = Adernschwärze**

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**

## Sorten für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

| | | |
|---|---|---|
| 02.235.0 | **Green Belt F₁ :** für Pflanzung Anfang Juni bis Ende Juli und Ernte Ende August bis Ende Oktober/Anfang November; produziert Seitentriebe mit sehr guter Qualität; mittelspät reifend; halbrunde Kopfform; Gewicht 350–500 g. | NS Ⓚ O |
| 02.249.7 | **Marathon F₁:** wüchsige Sorte mit dunkelgrünen, feinen Kospen; für Ernten im späten Frühjahr, Spätsommer und Herbst | PR Ⓚ O |
| 02.234.3 | **Quinta F₁:** robuste, ertragreiche Sorte mit dunkelgrünen Knospen; für Pflanzung Anfang April bis Ende Juli bzw. Ernten von Mitte Juli bis Mitte Oktober | TP O |

**SPROUTING-BROKKOLI** . . . . . *siehe Seite 44*



**02.249.7 Brokkoli Marathon F₁**



**02.237.4 Brokkoli Ares F₁**



**02.231.2 Brokkoli Triton F₁**



**02.243.5 Brokkoli Naxos F₁**



**02.051.6 Karfiol Alston F1**



**02.080.6 Karfiol Flamenco F1**



**02.050.9 Karfiol Locris F1**



**02.025.7 Karfiol Faston F1**



**02.052.3 Karfiol Telergy F1**



**Karfiol Sortensichtung**



**02.021.9 Karfiol White Magic F1**



**Bunter Karfiol in Mix Tassen**



**02.033.2 Karfiol Lisboa F1**



**02.032.5 Karfiol Parmac F1**



**02.149.0 Karfiol Susana F1**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# KARFIOL *Brassica oleracea L. (convar. botrytis var. botrytis)*



| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 g | ca. 1.200 Korn | Frühkultur: Jän.-Febr. | März-April | 50 x 40 | Mai-Juli | 450 Stk. |
| | | Sommerk.: März-Mai | Mai-Juni | 60 x 40 | Juni-Sept. | 320 Stk. |
| | | Herbstk.: Juni | Juli | 60 x 40 | Sept.-Okt. | 250 Stk. |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Pflanzung | Ernte von - bis | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| **Weiße Sorten** | | | | |
| 02.051.6 | **Alston F₁** NS Ⓚ O | Mitte - Ende März | Ende Mai - Mitte Juni | schnelle Sorte für frühe Pflanzungen; sehr gute Selbstdeckung; Kopfgewicht ca. 1 kg (kann bei entsprechendem Pflanzabstand höher sein); schöner, weißer Kopf; für Frischmarkt |
| 02.080.6 | **Flamenco F₁** PR Ⓚ ● | Anfang April - Ende Juli | Mitte Juni - Ende Oktober | CMS-freie Sorte; mittelfrühe Hybride mit aufrechtem Wuchs; für Frühsommer- bis Herbsternten; sehr gute Selbstdeckung |
| 02.050.9 | **Locris F₁ (CMS)** PR Ⓚ | Anfang/Mitte April - Ende Juli | Ende Juni - Ende Oktober | Hybride mit bester Selbstdeckung; die runden, nicht zu Haarigkeit neigenden Rosen bleiben reinweiß |
| 02.025.7 | **Faston F₁** NS Ⓚ | Mai - Mitte Juli | Mitte Juli - Ende September | sehr schnelle Sorte mit hochgewölbtem, reinweißem Kopf mit guter Selbstdeckung; gute Hitzeverträglichkeit |
| **Bunte Sorten** | | | | |
| 02.032.5 | **Parmac F₁** PR Ⓚ O | Anfang April - Ende Mai | Anfang Juli - Ende September | CMS-freie Sorte; attraktiver Karfiol mit hellviolettem, rund geformtem Kopf; kräftige, aufrechte Pflanzen |
| 02.033.2 | **Lisboa F₁** *NEU* (CMS) Ⓢ NS Ⓚ O | Anfang April - Mitte Juli | Mitte Juni - Ende September | sehr schneller, gelb-oranger Karfiol; Ernte als ganze Blume oder als Einzelröschen; unempfindlich gegen Haarigkeit; Gewicht 0,4–1,5 kg; 65-75 Reifetage |
| 02.149.0 | **Susana F₁** PR Ⓚ O | Anfang Juni - Mitte Juni | Anfang September - Ende Oktober | grüner Karfiol mit gleichmäßigem Wachstum; für Herbsternten |
| 02.194.0 | **Veronica F₁** PR Ⓚ O, PR Ⓚ ● | Mitte Juni - Mitte Juli | Anfang September - Ende Oktober | grüner Romanesco-Typ für Spätsommer- und Herbsternten; gute Standfestigkeit und unempfindlich gegen Haarigkeit |

Ⓢ = zum Sortenschutz angemeldet - Versuchssaatgutgerelung

## Sorten für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02.052.3 | **Telergy F₁ (CMS)** | Reifezeit ca. 75 Tage nach Pflanzung; Pflanzung Anfang März bis Anfang August; Ernte Mitte Juni bis Anfang November; sicherer Ansatz, selbstdeckend, dicht gefüllt | TP O |
| 02.021.9 | **White Magic F₁** | Sehr einheitliche Sorte für Herbsternte. Die Pflanzen haben einen aufrechten Wuchs und gut gewölbte, große, weiße Rosen. Feste Innenblätter sorgen für gute Selbstdeckung. | NS Ⓚ O |
| 02.030.1 | **Ottobrino** | **Romanesco-Typ** mit kegelförmigem, gelblich-grünem Kopf und früher Reife; 75–80 Reifetage | NS Ⓚ O |

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**

**SPROUTING-KARFIOL** . . . . . *siehe Seite 44*



**02.030.1 Karfiol Ottobrino**



**02.194.0 Karfiol Veronica F₁**



02.974.8 Chinakohl Natsuki $F_1$



02.980.9 Chinakohl Scarnade $F_1$



02.986.1 Chinakohl Green Rocket $F_1$



02.957.1 Chinakohl Bilko $F_1$



02.975.5 Chinakohl Kiseki $F_1$



02.955.7 Chinakohl Scansie $F_1$



02.954.0 Chinakohl Scarvita $F_1$



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# CHINAKOHL *Brassica rapa [vorm. Brassica pekinensis]*



| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 g | siehe unten | Treibkultur: Mitte Februar | Ende März | 35 x 35 | Mitte Juni | 350-400 kg |
| | | Frühkultur: (warm): April | Mai | 50 x 30 | Juli | 400-500 kg |
| | | Herbstkult.: Ende Juli-5. August | E. August bis Anf. Sept. | 50 x 40 | Ende Sept. bis Anf. Nov. | 600-700 kg |




**Saatgutbedarf:** Vorkultur: ca. 10.000 Korn/1000 m², Direktsaat: ca. 75.000 Korn/ha bzw. 150.000 Korn/ha bei halbem Endabstand.

**Bei zu früher Aussaat, bzw. bei Verwendung einer ungeeigneten Sorte – Schossgefahr. Bei Treib- und Frühkultur: Jungpflanzenanzucht bei 25°C. Frühkultur ist eine Risikokultur! Bei Kulturführung von Chinakohl ist besonders auf Erdflöhe, Erdraupen, Mehlige Kohlblattlaus bzw. auf Innenblattnekrose (Kalkversorgung während der Kopfbildung) zu achten.**

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | | ca. Reife in Tagen nach Pflanzung | Kopf Form | Kopf Größe | Kopf Gewicht/kg | Lager-fähigkeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hohe Sorten** (Granaat-Typen): | | | | | | | | |
| 02.986.1 | **Green Rocket F₁** | *NS* Ⓚ O | 70 | hoch | groß | 1,75–2,25 | sehr gut | früher Granaat-Typ, auch Lagerung, Standardsorte |
| 02.980.9 | **Scarnade F₁ (CMS)** *NEU* | *NS* Ⓚ O | 65–70 | hoch | mittel-groß | 1–2 | gering | roter, schosstoleranter Granaat-Typ; schöne, violette Färbung; hohe Innenbrandtoleranz; für geschnittene Mix-Salate; Frischmarkt |
| **Niedrige Sorten** (Zylindrische Typen): | | | | | | | | |
| 02.998.4 | **Yuki F₁** | *NS* Ⓚ O, *PR* Ⓚ, *PR* Ⓚ O | 55–60 | breit | mittel | 1,5–2 | sehr gut | stark gegen Kohlhernie, auch für Frühkultur; Lagersorte |
| 02.988.5 | **Enduro F₁** | *PR* Ⓚ O, *TP* O | 60–65 | breit | mittel | 1–1,5 | sehr gut | zylindrische Köpfe mit flacher Unterseite |
| 02.975.5 | **Kiseki F₁** | *PR* Ⓚ O | 63–68 | breit | mittel | 1,2–1,8 | sehr gut | gelbe Innenblätter, die dunkelgrünen Außenblätter behalten auch bei der Lagerung die attraktive Farbe; **hohe Kohlhernietoleranz** |
| 02.957.1 | **Bilko F₁** | *PR* Ⓚ, *PR* Ⓚ ● | 68 | breit | mittel | 1,5–2 | sehr gut | sehr gute Lagereignung; **hohe Resistenz gegen Kohlhernie** |
| 02.955.7 | **Scansie F₁ (CMS)** | *NS* Ⓚ O | 60–65 | breit | mittel | 1,2–1,5 | gering | schosstolerante, gut geschlossene Köpfe; intensive rot-violette Innenfärbung, dunkelrot-violette Außenfärbung; für geschnittene Mix-Salate; Frischmarkt |
| 02.954.0 | **Scarvita F₁ (CMS)** | *NS* Ⓚ O | 60–65 | breit | klein–mittel | 0,75–0,8 | gering | kompakter Kopf, rote Innenblätter, grün-rote Außenblätter; für geschnittene Mix-Salate (blutet nach dem Schnitt nicht aus); Pflanzung Anfang Juni - Ende August |
| **Mini-Chinakohl**: | | | | | | | | |
| 02.974.8 | **Natsuki F₁** | *NS* Ⓚ, *PR* Ⓚ O | 40–60 | hoch | klein | 0,2–1,0 | sehr gering | Single (Mini) Chinakohl mit kompaktem Kopf und gelb gefülltem Herz; auch für Engpflanzung bis 15 x 15 cm; Kopfgewicht je nach Pflanzabstand bis max. 1 kg |

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**

**PAK CHOI** *siehe Seite 85*



**02.988.5 Chinakohl Enduro F₁**



**02.998.4 Chinakohl Yuki F₁**



**02.711.9 Wirsingkohl Convoy $F_1$**



**02.701.0 Wirsingkohl Estoril $F_1$**



**02.703.4 Wirsingkohl Savonarch $F_1$**



**02.705.8 Wirsingkohl Savoy King $F_1$**



**02.868.0 Wirsingkohl Wirosa $F_1$**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# KOHL, WIRSINGKOHL *Brassica oleracea L. (convar. capitata var. sabauda)*



| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 g | Bei Jungpflan-zenanzucht: 5–6 g bzw. 1.200 Korn Direktsaat: 500 g/ha oder 100.000 Korn | Frühkultur: Jän.-Feb. | März-April | 40 x 30–40 | Mai–A. Juni | 350-450 kg |
| | | Sommerkul.: Anf. April | Anf. Mai | 50 x 50 | E.Juni–Juli | 500-600 kg |
| | | Herbstkul.: Mai-Juni | Juni-Juli | 60 x 50 | Sept.-Nov. | 400-600 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reife in Tagen nach Pflanzung | Kopf Farbe | Kopf Größe | Kopf Gewicht/kg | Lager-fähigkeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Runde Sorten für Frühkultur** | | | | | | |
| 02.701.0 | **Estoril $F_1$** NS Ⓚ | 65–70 | dunkelgrün | groß | 1,5–2 | gering | für Frühjahrs- und Frühsommerernte; schöne, runde, große, gut gefärbte Köpfe mit **guter Feldhaltbarkeit; HR**: Foc:1 |
| | **Runde Sorten für Sommer- und Herbstkultur** | | | | | | |
| 02.732.4 | **Famosa $F_1$** PR Ⓚ ● | 60 | dunkelgrün | mittel | 1–1,5 | gering | für Sommer- und Frühherbsternten |
| 02.711.9 | **Convoy $F_1$ (CMS)** PR Ⓚ O, TP O | 80 | dunkelgrün | groß | 2–3 | gering | Frischmarktkohl für Ernte Juli–Oktober; runde, gut gefüllte Köpfe mit kräftigem Umblatt |
| 02.705.8 | **Savoy King $F_1$** PR Ⓚ O | 85–90 | dunkelgrün | groß | 1,5–2 | gut | stark gegen Innenbrand; Herbsternte; für Frischmarkt und Feld-Lagerung |
| 02.703.4 | **Savonarch $F_1$** NS Ⓚ O | 90–95 | dunkelgrün | groß | 1,5–2,5 | gut | etwas später als Savoy King $F_1$; gute Feldhaltbarkeit |
| | **Runde Sorten für Herbsternten und Lagerung** | | | | | | |
| 02.868.0 | **Wirosa $F_1$** PR Ⓚ O | 105 | dunkelgrün | mittel | 0,9–1,4 | sehr gut | Lagersorte, graugrünes Umblatt |

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reife in Tagen nach Pflanzung | Kopf Farbe | Wuchs | Frost-toleranz | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Grünkohl, Blätterkohl** *auch in Kleinmengen (250 Korn) verfügbar* | | | | | |
| 19.372.2 | **Winterbor $F_1$** PR Ⓚ O | 110 | dunkel blaugrün | halbhoher Wuchs | mittel - gut | feingekrauste, bewährte Grünkohl-Hybride mit sehr dunkler, blaugrüner Blattfärbung und etwas aufrechtem Blattstand |
| 19.373.9 | **Sunbor $F_1$ (CMS)** PR Ⓚ | 130 | grün/ violett | hoher Wuchs | mittel | dunkelroter bis dunkelvioletter, feingekrauster Blätterkohl mit mittlerer Frosttoleranz |

**Ac = Albugo candida, Foc:1 = Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans, Xcc = Xanthomonas campestris = Adernschwärze**

## Grünkohl für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

19.374.6 **Nero di Toscana:** palmenartiger, halbhoher Wuchs; dunkelgrünes Blatt; Aussaat ab März; vor starken Frösten schützen NS ● 

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**



**19.374.6 Blätterkohl Nero di Toscana**



**19.373.9 Blätterkohl Sunbor $F_1$**



**19.372.2 Blätterkohl Winterbor $F_1$**



**03.021.8 Kohlrabi Runa $F_1$**



**03.034.8 Kohlrabi Quickstar $F_1$**



**03.017.1 Kohlrabi $F_1$ Korist**



**03.027.0 Kohlrabi Keyah $F_1$**



**03.035.5 Kohlrabi Avaya $F_1$**



**03.029.4 Kohlrabi Vikora $F_1$**



**03.028.7 Kohlrabi Kossak $F_1$**



**03.038.6 Kohlrabi Oasis $F_1$**



**03.036.2 Kohlrabi Blaro**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# KOHLRABI *Brassica oleracea L. (convar. acephala var. gongylodes)*



| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 g | ca. 5–8 g bzw. ca. 1.200 K bzw. ca. 1.200 TP | Treibkultur: Nov.-Jän. | Jän.-Feb. | 25 x 25 | März-Mai | 1.400 Stk. |
| | | Freiland: | | | | |
| | | Frühkultur: Feb.-März | April-Mai | 30 x 25 | Juni-Juli | 1.200 Stk. |
| | | Sommerkultur: April-Mai | Mai-Juni | 30 x 30 | Juli | 900 Stk. |
| | | Herbstkultur: Juni-Juli | Juli-Aug. | 30 x 30 | Aug.-Okt. | 900 Stk. |




**HERZLOSIGKEIT BEI KOHLRABI**: Bei der Anzucht von Kohlrabi-Jungpflanzen kann es bei ungünstigen Verhältnissen zur Herzlosigkeit und Flaschenbildung kommen. Die Ursache ist Bodenkälte in Verbindung mit Lichtmangel, wie es im Winter öfter vorkommen kann. Bei warmem Fuß – Bodenheizung – kommt es erfahrungsgemäß nicht zur Herzlosigkeit.

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Tage nach Auspflanzung: Treib 50-70 | Vlies 45-50 | Freiland 60-100 | Reife | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hellgrüne Sorten** | | | | | | |
| 03.017.1 | **Korist $F_1$** PR Ⓚ O, PR Ⓚ ● | X | X | X | früh | flachrunde Knollen, neigt nicht zu Herzlosigkeit |
| 03.027.0 | **Keyah $F_1$** (CMS) PR Ⓚ O | X | X | X | früh | hohe Widerstandsfähigkeit gegen Falschen Mehltau; für Frischmarkt; für Pflanzungen KW 9–17 und KW 28–33 |
| 03.034.8 | **Quickstar $F_1$** PR Ⓚ O | X | X | X | früh | gute Allroundsorte mit geringer Neigung zur Holzigkeit und hellgrünen Knollen |
| 03.029.4 | **Vikora $F_1$** PR Ⓚ ● | | X | X | früh | schnellwüchsig; halbaufrechtes Laub; generell für den ganzjährigen Anbau geeignet (Pflanzung KW 9–34), insbesonders jedoch für Frühjahr und Herbst |
| 03.035.5 | **Avaya $F_1$** (CMS) PR Ⓚ O | | | X | mittel | langes Erntefenster; robust gegen Hitze und Trockenheit; gute Widerstandsfähigkeit gegen Falschen Mehltau; für Frühsommer und Sommer; Pflanzung KW 14–30 |
| 03.021.8 | **Runa $F_1$** (CMS) PR Ⓚ O | | | X | mittel-spät | inzuchtfreie Hybride; widerstandsfähig gegen Falschen Mehltau und Hitze; das kräftige, aufrechte Laub ermöglicht einfache Ernte; ideal für Sommer- und Herbstanbau |
| 03.028.7 | **Kossak $F_1$** PR Ⓚ O, PR Ⓚ ● | | | X | mittel-spät | lange Ernteperiode; sehr platzfest; zartes Fleisch; bei industriellem Anbau bis zu 3 kg Durchschnittsgewicht |
| **Violette Sorten** | | | | | | |
| 03.023.2 | **Kolibri $F_1$** PR Ⓚ ● | | X | X | früh-mittel | platzfest, einheitlich im Bestand, gut durchgefärbt |
| 03.013.3 | **Ukza $F_1$** (CMS) PR Ⓚ O | | | X | mittel | wuchskräftig; widerstandsfähiges Laub; gute Feldhaltbarkeit; flachrunde, gleichmäßig ausgefärbte Knolle; gute Innenqualität; für Pflanzung KW 14–34 |

**Foc1 = Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans, Xcc = Xanthomonas campestris = Adernschwärze**

## Sorten für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

| | | |
|---|---|---|
| 03.036.2 | **Blaro:** Violette Sorte für Treib- und Freilandkultur, auch für Kultur unter Vlies; samenfest. | NS O, PR Ⓚ O, TP O |
| 03.038.6 | **Oasis $F_1$:** Freilandsorte mit hellgrünen Knollen; auch für Kultur unter Vlies. | TP O |
| 03.070.6 | **Superschmelz:** altbewährte Freilandsorte mit großen, hellgrünen Knollen mit dickerer, fester Schale; bei guter Kultur auch bei größeren Knollen nicht holzig; samenfest. | PR O |

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**



**03.013.3 Kohlrabi Ukza $F_1$**



**03.023.2 Kohlrabi Kolibri $F_1$**

# SPROSSENKOHL *Brassica oleracea L. (convar. oleracea var. gemmifera)*



| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 g | ca. 1.200 Korn | Herbstkultur: März–April | April–Mai | 70 x 50 | Mitte Aug. – November | 130-160 kg |
| | | Winterkultur: Ende April – Mitte Mai | Mai-Juni | 70 x 50 | Dezember–Februar | 120-150 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Erntetermin (je nach Klima) Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Feb. | März | Frostwider-stands-fähigkeit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.914.4 | **Marte F1** PR K O | | | ■ | ■ | | | | | gering | frühe Sorte; sehr produktiv mit hohem Anteil an gleichmäßig abreifenden Röschen bis an die Spitze der Pflanzen; gute Standfestigkeit |
| 02.888.8 | **Dagan F1** PR K ● | | | ■ | ■ | | | | | gut | mittelfrühe, absolut standfeste Sorte mit sehr glatten, dunkelgrünen Rosen |
| 02.886.4 | **Steadia F1** PR K O | | | | ■ | ■ | | | | sehr gut | sehr uniforme Rosen; gute Standfestigkeit; gut geeignet für die Maschinenernte; Pflanzung Anfang bis Ende Mai; (210 Tg.) |
| 02.887.1 | **Hemera F1** PR K ● | | | | | | ■ | ■ | | sehr gut | sehr späte Sorte (ca. 255 Tg.); mittelhohe Pflanzen mit sehr guter Standfestigkeit; Pflanzung Anfang April bis Anfang Mai |

## Sorte für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

02.912.0 **Igor F1:** Runde, feste, dunkelgrüne Rosen; sehr gute Frostwiderstandsfähigkeit; für Ernten von Ende Oktober bis Mitte Jänner. TP O

02.883.3 **Danet F1:** Mittelfrüh reifend; hohe Toleranz gegen Verholzung; gute Kältetoleranz; Aussaat April, Pflanzung Mai bis Juni. PR K O

02.884.0 **Groninger:** Alte Landsorte; Aussaat April, Pflanzung Mai, Ernte Ende Oktober bis Ende Februar. Die Blätter der teilweise lockeren Röschen können sehr gut für die Zubereitung von Wok-Gerichten verwendet werden. NS ●

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**



**02.914.4 Sprossenkohl Marte F1**



**02.888.8 Sprossenkohl Dagan F1**



**02.886.4 Sprossenkohl Steadia F1**



**02.884.0 Sprossenkohl Groninger**



**02.883.3 Sprossenkohl Danet F1**



**02.912.0 Sprossenkohl Igor F1**



**02.887.1 Sprossenkohl Hemera F1**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# WEISSKRAUT *Brassica oleracea L. (convar. capitata var. alba)*

## Sorten für den Frischmarkt - Frühsorten

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 g | Pflanzkultur: 60.000–85.700 K. | Jänner–Februar | März–Mitte April | 40 x 35 bis 50 x 40 | Ende Mai–Juni | 300–500 kg |




**A C H T U N G !** Bei allen frühen Brassica-Arten: Weißkraut, Rotkraut, Kohl, Kohlrabi etc. besteht bei früher Auspflanzung und ungünstiger kalter Frühjahrswitterung die Gefahr des vorzeitigen Schossens. Das Schossen hängt von der Größe der Jungpflanze, der Temperatur und der Dauer der Temperatureinwirkung ab. Je größer die Jungpflanze ist und je länger die Kälteeinwirkung anhält, umso größer ist die Gefahr des Schossens. Misserfolge aus diesen Gründen sind daher ausschließlich der Witterung zuzuschreiben.




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reifezeit in Tagen nach Auspflanzung | Kopf Form | Kopf Gewicht/kg | Kopf Farbe | Umblatt | Für Vlies-abdeckung geeignet | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.207.1 | **Elisa $F_1$** PR Ⓚ O | 50 | rund | ca. 1 | dunkelgrün | wenig | X | attraktive Sorte mit ausgezeichnetem Geschmack; auch für die Produktion von "Miniweißkraut" geeignet |
| 02.299.2 | **Nozomi $F_1$** PR Ⓚ O | 60 | rund | 1–1,5 | grün | wenig | X | sehr schnell und einheitlich reifend; kompakte Größe; Frühjahressorte |
| 02.385.2 | **Farao $F_1$** PR Ⓚ ● | 64 | rund | 1–3 | dunkelgrün | mittel | X | sehr platzfest und uniform; lange Feldhaltbarkeit |

### Sorte für Direktvermarktung (z.B. Marktgärtner) und Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

02.328.9 **Golden Acre:** Erprobte Frühsorte mit wenig Umblatt. Reifezeit ca. 58 Tage nach Auspflanzung. Kopfgewicht 1–1½ kg; Kopfform: rund. PR O

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**



**02.385.2 Weißkraut $F_1$ Farao**



**02.299.2 Weißkraut Nozomi $F_1$**



**02.207.1 Weißkraut Elisa $F_1$**



**02.328.9 Weißkraut Golden Acre**

= Verkauf nach Gewicht Ⓚ = Verkauf nach Korn O = ungebeiztes Saatgut ● = Biosaatgut



02.272.5 Weißkraut Accord $F_1$



02.255.8 Weißkraut Antonio $F_1$



02.267.1 Weißkraut Cape Horn $F_1$



02.426.2 Weißkraut Ippon $F_1$



02.394.4 Weißkraut Felicity $F_1$



02.530.6 Weiß-/Sarmakraut Saturn 45 $F_1$



02.470.5 Weißkraut Monalisa $F_1$



02.324.1 Weißkraut Pronca $F_1$



02.546.7 Weißkraut Sweety $F_1$



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# Sorten für den Frischmarkt - Folgesorten

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 g | Pflanzkultur: 60.000–85.700 K. | Frühjahrs-Sommerkultur: Mitte-Ende Februar<br>Sommerkultur: März<br>Herbstkultur.: März –Anfang Juni | Anf. April<br>April<br>April – Ende Juni | 50 x 28 bis 50 x 40 | Juni<br>Juli – Mitte Aug.<br>Mitte Aug. – Ende Okt. | 400-600 kg<br>400-600 kg<br>500-800 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reifezeit in Tagen nach Auspflanzung | Kopf Form | Kopf Gewicht/kg | Kopf Farbe | Umblatt | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Spitzkraut** | | | | | | | | |
| 02.267.1 | **Cape Horn F$_1$** *NEU* PR Ⓚ O | 55-65 | spitz | 0,8–1,4 | grün | mittel | HR: Foc:1 | raschwüchsig, schossfest, kältetolerant; bildet kurzen Strunk; relativ langes Erntefenster |
| 02.255.8 | **Antonio F$_1$ (CMS)** PR Ⓚ O | 80 | spitz | 0,8–2 | grün | mittel | HR: Foc:1, Ac | kompaktes, ausgeprägt spitzes Kraut mit Eignung für Folierung bei etwa 1–1,2 kg;bis Mitte Februar lagerfähig |
| **Sarmakraut** (Flachkraut, zum Einlegen von ganzen Köpfen) | | | | | | | | |
| 02.394.4 | **Felicity F$_1$** NS Ⓚ O, PR Ⓚ O | 80 | flach | 1–2 | grün | mittel | HR: Foc:1 | süßer Geschmack, feine Struktur; für die gesamte Anbausaison |
| 02.530.6 | **Saturn 45 F$_1$** NS Ⓚ, NS Ⓚ O | 82 | flach | 1,2–2 | grün | mittel | HR: Foc:1 | längeres Erntefenster, für Sommer- und Herbsternte |
| 02.426.2 | **Ippon F$_1$** PR Ⓚ, PR Ⓚ O | 85 | flach | 1–2 | grün | mittel | HR: Foc:1 | kleines Sarmakraut für die frühe Ernte und satzweisen Anbau |
| 02.546.7 | **Sweety F$_1$** PR Ⓚ O | 85-90 | flach | 2–3 | grün | mittel | IR: Xcc | bestens geeignet für die Kultur unter kühlen, feuchten Bedingungen im Frühjahr |
| **Runde Sorten** | | | | | | | | |
| 02.385.2 | **Farao F$_1$** PR Ⓚ ● | 67 | rund | 1,2–1,5 | dunkelgrün | mittel | | Juni- bis Oktoberernte, sehr platzfest, Standardsorte |
| 02.470.5 | **Monalisa F$_1$ (CMS)** NS Ⓚ O, PR Ⓚ O | 70–75 | rund | 1–1,5 | dunkelgrün | mittel | HR: Foc:1 | schnelles, kompaktes, Stückkraut mit sehr gutem Geschmack; gute Hitzetoleranz und Platzfestigkeit |
| 02.364.7 | **Amazon F$_1$** PR Ⓚ ● | 80 | rund | 1–3 | grün | mittel | HR: Foc:1 | für Sommer- und Herbsternte; längeres Erntefenster |
| 02.272.5 | **Accord F$_1$** (CMS) Ⓢ *NEU* PR Ⓚ O | 110-120 | rund | 3–5 | dunkelgrün | stark | HR: Foc:1 | hoher Ertrag; lange Feldhaltbarkeit, ansprechend grüne Farbe nach der Lagerung |
| 02.324.1 | **Pronca F$_1$** *NEU* PR Ⓚ O | 120 | rund-hochrund | 2,5–4 | dunkelgrün | mittel | HR: Foc:1 | kompakt, wenig Taschenbildung; milder Geschmack; September- bis Oktoberernte, auch für Lagerung |
| 02.380.7 | **Expect F$_1$** PR Ⓚ ● | 120-140 | hochrund | 2,5–4,5 | grün | viel | HR: Foc:1 | auch für Lagerung; achöne grüne Farbe auch nach der Lagerung |

Ⓢ = zum Sortenschutz angemeldet - Versuchssaatgutgerelung

**HR = hoch resistent, Ac = Albugo candida / Foc:1 = Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans / Pb = Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie) Xcc = Xanthomonas campestris pv. campestris**

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**

## Kraut-Kopfformen:




## Sorte für Direktvermarktung (z.B. Marktgärtner) und Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

02.531.3 **Shelta F$_1$:** Mittelgroßes, sehr platzfestes Kraut mit kurzer Lagerfähigkeit. Pflanzung März bis Juni. Reifezeit ab Pflanzung ca. 70 Tage. Kopfform: rund. Gewicht 1,5–2 kg. *TPO*



**02.531.3 Weißkraut F$_1$ Shelta**

# WEISSKRAUT Fortsetzung

## Lagersorten

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 g | Pflanzkultur: 32.000–60.000 K. | für Lagerung: März – Mai | April – Mitte Juni | 45 x 40 bis 75 x 50 | Ende Okt. – Mitte Nov. | 500-800 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reifezeit in Tagen nach Auspflanzung | Kopf Form | Kopf Gewicht/kg | Kopf Farbe | Umblatt | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.324.1 | **Pronca $F_1$** NEU PR K O | 120 | rund-hochrund | 2,5–4 | dunkelgrün | mittel | HR: Foc:1 | kompakt, wenig Taschenbildung; milder Geschmack; September- bis Oktoberernte, auch für Frischmarkt |
| 02.380.7 | **Expect $F_1$** PR K ● | 120-140 | hochrund | 2,5–4,5 | grün | viel | HR: Foc:1 | schöne grüne Farbe auch nach der Lagerung; auch für Frischmarkt; Ernte Anfang Nov., Lager bis Ende Mai |
| 02.279.4 | **Expectation $F_1$ (CMS)** PR K O | 140 | hochrund | 2,5–4,5 | grün | viel | HR: Foc:1 | hohe Feldgesundheit; sehr schöne Farbe nach der Lagerung; Ernte Anfang November, Lager bis Ende Juni |

**Foc:1 = Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans, HR = hoch resistent**

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**

### Sorte für Direktvermarktung (z.B. Marktgärtner) und Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

02.438.5 **Kärntner Steirisches Gebirgskraut:** Runde Sorte für kurzfristige Lagerung. Kopfform: rund. PR O

## Industriesorten

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 g | Pflanzkultur: 28.000–40.000 K. | Jungpflanzenanzucht: Ende April<br>Direktanbau: März/April | April – Mitte Juni | 60 x 50 bis 75 x 50 | August – November | 800 – 1500 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reifezeit in Tagen nach Auspflanzung | Kopf Form | Kopf Gewicht/kg | Lager-fähigkeit | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.469.9 | **Megaton $F_1$** PR K O | 100 | rund | 4–9 | mittel | HR: Foc:1 | sehr platzfest, kurzer Innenstrunk; Qualitätssorte |
| 02.256.5 | **Report $F_1$** PR K O | 120 | rund | 4–7 | sehr gering | HR: Ac / Foc:1 Pb:0,1,3 | kohlhernieresistent; sehr gesundes Kraut für Ernte Sept./Okt.; feine Innenstruktur; lange Feldhaltbarkeit |
| 02.558.0 | **Typhoon $F_1$** PR K ● | 130 | rund | 4–7 | mittel | HR: Foc:1 | stabile, aufrecht stehende Pflanzen mit Eignung für die Maschinenernte; Lager Anfang November – Ende März |

**HR = hoch resistent, Ac = Albugo candida / Foc:1 = Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans / Pb = Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie)**

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**

### Sorte für Direktvermarktung (z.B. Marktgärtner) und Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

02.506.1 **Premstättner Schnitt:** Steirische Lokalsorte. Kopfform: flach. PR O



**02.279.4Weißkraut Expectation $F_1$**



**02.558.0 Weißkraut Typhoon $F_1$**



**02.256.5 Weißkraut Report $F_1$**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# ROTKRAUT

*Brassica oleraceae L. (convar. capitata var. rubra)*

## Sämtliche Anbaubedingungen wie bei Weißkraut

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reifezeit in Tagen nach Auspflanzung | Kopf Form | Kopf Gewicht/kg | Kopf Farbe | Lager-fähigkeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Frühe + mittelfrühe Sorten** | | | | | | | |
| 02.613.6 | **Red Jewel $F_1$** PR Ⓚ O | 70–80 | rund | 1–1,2 | dunkelrot | gering | besonders für den Anbau als Minikraut geeignet; Sorte für Direktvermarktung und Jungpflanzen-Wiederverkauf |
| 02.611.2 | **Davaro $F_1$ (CMS)** PR Ⓚ O | 95 | rund | 2–2,5 | dunkelrot | gering | gute Wachsschicht; sehr gute Feldhaltbarkeit; vielseitig einsetzbar; bei später Pflanzung kurz lagerfähig |
| 02.643.3 | **Integro $F_1$** PR Ⓚ ● | 95 | rund | 1–2 | dunkelrot | gering | runder, platzfester Kopf mit guter Wachsschicht, auch als Zweitfrucht und für Engpflanzung |
| **Späte Sorten** | | | | | | | |
| 02.641.9 | **Klimaro $F_1$** PR Ⓚ ● | 125 | hochrund-rund | 2,5–4,5 | dunkelrot | sehr gut | Frischmarkt und Industrie; Pflanzung Mitte April bis Mai; für Maschinenernte; Lagerung bis Mitte April |
| 02.609.9 | **Bandolero $F_1$** PR Ⓚ O | 120–130 | hochrund | 3,5–5 | dunkelrot | mittel | für Industrie; Lagerung bis Jänner |
| 02.702.7 | **Travero $F_1$** PR Ⓚ O, PR Ⓚ ● | 130 | hochrund | 1–2,5 | dunkelrot | sehr gut | Frischmarktsorte für Pflanzung von Mitte April bis Mai; Lagerfähigkeit von Oktober bis Mitte Juni |
| **Spitzkraut** | | | | | | | |
| 02.642.6 | **Kalibos** NS Ⓚ O | 105 | spitz | 2–2,5 | dunkelrot | mittel | rotes Spitzkraut mit schöner Innenstruktur, hohem Zuckergehalt und sehr gutem Geschmack; 30.000–40.000 Pfl./ha |

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**



**02.643.3 Rotkraut Integro $F_1$**



**02.613.6 Rotkraut Red Jewel $F_1$**



**02.641.9 Rotkraut Klimaro $F_1$**



**02.609.9 Rotkraut Bandolero $F_1$**



**02.642.6 Rotkraut Kalibos**

# Sprouting Kohlgemüse

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02.166.7 | Sprouting-Brokkoli | Limba F1 (CMS) NEU | PR Ⓚ O | wüchsiger, dunkelgrüner Sprouting-Brokkoli; süßer Geschmack; keine Hauptblume,10-15 Einzeltriebe; Stiellänge 7-15 cm; Gewicht pro Röschen 20-40 g; Pflanzung Mitte März bis Mitte September; ca. 75 Reifetage |
| 02.278.7 | Sprouting-Brokkoli | Tyrian F1 (CMS) Ⓢ NEU | NS Ⓚ O | violetter Sprouting-Brokkoli mit weicher Konsistenz und süßem Geschmack; sehr ertragreich; bildet Hauptblume und Seitenröschen; Pflanzung Mitte Mai bis Mitte August; 80–90 Reifetage |
| 02.161.2 | Sprouting-Karfiol | Fioretto Creme F1 | PR Ⓚ O | Kreuzung aus Brokkoli und Karfiol; kleine Rosen mit langen Stielen; süßer, nussiger Geschmack; bei heißen Temperaturen können sich die Rosen violett färben; für Frühjahrs- und Herbstkultur; 65–85 Reifetage |
| 02.158.2 | Sprouting-Karfiol | Fioretto Purple F1 NEU | NS Ⓚ O | Kreuzung aus Brokkoli und Karfiol; lila Röschen mit langen, grünen Stielen; süßer, nussiger Geschmack; Pflanzung Anfang April bis Ende August, Ernte Mitte Juni bis Mitte November; 70-75 Reifetage |
| 02.165.0 | Sprouting-Flower | Kalettes® Autumn Star F1 NEU | PR Ⓚ O | Kreuzung aus Sprossenkohl und Grünkohl; gekrausteRöschen mit violetten Blattrippen; Ernte der Röschen bei einer Größe von ca. 5 cm; Aussaat Februar bis März, Ernte Oktober bis November ca. 110 Reifetage |

Ⓢ = zum Sortenschutz angemeldet - Versuchssaatgutgerelung

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**



**02.278.7 Brokkoli Tyrian F1**



**02.166.7 Brokkoli Limba F1**





**02.165.0 Kalettes® Autumn Star F1**



**02.161.2 Karfiol Fioretto Creme F1**



**02.158.2 Karfiol Fioretto Purple F1**

## KRESSE *Lepidium sativum L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro m² | Saattermin | Pflanztermin | Standweite in cm | Erntetermin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 g | 60–80 g | ganzjährig, Winter: im Glashaus | - | - | ganzjährig | 50–100 kg |

Vorzügliches, vitaminreiches Wintergemüse. Anbau dicht in Kistchen oder Frühbeet, ergibt Gartenkresse in wenigen Tagen. Der Anbau kann fortlaufend alle 5–10 Tage erfolgen.

03.115.4 **Cressida** *NS*
Einfache, sehr schnell und gleichmäßig wachsende Spitzensorte.

03.120.8 **Gartenkresse einfache** *NS* O, *NS*



**03.120.8 Gartenkresse einfache**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# KÜRBIS UND ZUCCHINI

Riesenkürbis | Moschuskürbis | Gartenkürbis | Zierkürbis





03.104.8 Kürbis Flexi Kuri F1



03.204.5 Kürbis Tractor F1



03.185.7 Kürbis Uchiki Kuri



03.178.9 Kürbis Red Kuri



03.133.8 Kürbis Amoro F1



03.181.9 Kürbis Solor



03.087.4 Kürbis Leckør F1



03.167.3 Kürbis Fictor



03.377.6 Kürbis Grey Queen F1



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# KÜRBIS

| Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| ca. 20.000 Korn (ca. 10.000 bis 15.000 Pflanzen/ha) | ab Anfang April in Töpfe, ab Anfang Mai ins Freiland | ab Anfang Mai | Rankenlose 100– 150 x 60 Rankende 150–200 x 100 | ab Juni (Reifetage nach Aufgang) | 500 – 1.000 kg |




## Riesenkürbis *Cucurbita Maxima Duchesne*

### Hokkaido-Kürbis

03.133.8 **Amoro F1** (85-90 T) *NS* Ⓚ ●
Ertragsstarke Sorte im Hokkaido Typ. Diese Sorte rankt nicht, sondern bildet buschige Pflanzen aus. Das durchschnittliche Fruchtgewicht liegt bei ca. 1,2 kg. Die leicht flachrunden, orangen Früchte haben eine dicke Fruchtwand. Bei einer empfohlenen Pflanzenzahl von ca. 15.000 Pflanzen pro Hektar ist ein Ertrag von 30–40 t/ha möglich. Gute Lagerfähigkeit.

03.185.7 **Uchiki Kuri** (90-100 T) *NS* Ⓚ O, *NS* Ⓚ ●
Hokkaido-Typ mit oranger Schale, relativ glatt und rankend. Früchte sind rund bis hochrund, Gewicht 0,8–1,8 kg. Sehr süßschmeckend. Auch für kühlere Anbaugebiete. Geringe Lagerfähigkeit.

03.178.9 **Red Kuri** (90-100 T) *NS* Ⓚ O
Red Kuri ist im Gegensatz zu Uchiki Kuri deutlich größer und schwerer (1,0–2,5 kg). Die Schale ist orange und nicht dunkelorange-rot. Das gut schmeckende Fruchtfleisch ist orange und in Hokkaido-Qualität. Stark rankend.

03.104.8 **Flexi Kuri F1** *NEU* *NS* Ⓚ O, *NS* Ⓚ ●
Flachrunder Hokkaido-Kürbis mit orangeroter Schale. Durchmesser 14–17 cm, Fruchtgewicht 1,2–1,8 kg. Auch für die Direktsaat, früher Bestandsschluss. Lagerung bis Jänner ist möglich.
Resistenzen: IR: ZYMV / WMV / PRSV.

03.204.5 **Tractor F1** (90-100 T) *NS* Ⓚ ●
Hokkaido-Typ mit kurzen Ranken (Buschtyp). 1 bis 2 große Früchte mit 2,0–4,5 kg pro Pflanze; hoher Ertrag von 30–35 t/ha; Haltbarkeit 3–4 Monate. 10.000–15.000 Pflanzen/ha.

03.181.9 **Solor** (90-100 T) *NS* Ⓚ ●
Samenfester, ertragreicher Hokkaido-Kürbis mit orange-roter, glatter Schale und schönen, uniformen Früchten mit orangem Fruchtfleisch. Fruchtgewicht 0,9–1,1 kg. Sehr gute Lagerfähigkeit. Rankend. Pflanzdichte 11.000-13.000 Pflanzen/ha.

03.167.3 **Fictor** (90-100 T) *NS* Ⓚ ●
Samenfester, rankender, ertragreicher Hokkaido-Kürbis mit uniformen Früchten. Orange-rote, glatte Schale und oranges Fruchtfleisch. Fruchtgewicht 1,0–1,2 kg. Pflanzdichte 11.000-13.000 Pflanzen/ha. Sehr gute Lagerfähigkeit.

03.087.4 **Leckør F1** (100 T) *NEU* *NS* Ⓚ ●
Rankender Hokkaido-Typ mit silber-graublauer Schale. Tief oranges Fruchtfleisch mit süßem Geschmack. Fruchtgewicht ca. 1-1,5 kg. Bei einer empfohlenen Pflanzenanzahl von 13.000-15.000 /ha ist ein Ertrag von 30-40 t/ha möglich. Sehr gute Lagerfähigkeit (4-6 Monate).




### Kabocha-Kürbis

03.377.6 **Grey Queen F1** (ca. 100 T) *NS* Ⓚ O
Stark rankender Kabochakürbis mit hellgrauer Schale und tief-orangem Fleisch mit hohem Carotingehalt. Fruchtgewicht 2,5–3,5 kg. Unter optimalen Bedingungen (trocken, gut belüftet) geeignet für eine lange Lagerung. Resistent (IR) gegen ZYMV. Pflanzdichte 8.000-10.000 Pflanzen/ha

### Diverse Riesen-Kürbisse

03.367.7 **Goliáš** (ca. 150 T) *NS* Ⓚ O
Stark rankender Riesenkürbis mit 20–30 kg schweren Früchten und 3–5 cm dickem, orangem Fleisch und oranger Schale. Goliáš eignet sich besonders für die verarbeitende Industrie, insbesondere für die Verarbeitung zu süßem, gewürfeltem Kompott. Seine fleischigen Würfel bleiben auch nach der Verarbeitung fest.

03.100.0 **Mini Hubbard Blue Ballet** (85 T) *NS* Ⓚ O, *NS* Ⓚ ●
Hochrunder Kürbis mit graublauer, glatter Schale und orangem, festem Fruchtfleisch. Fruchtgewicht 1,5–2,5 kg. Mäßig rankend, die Pflanze bildet praktisch nur eine Hauptranke mit durchschnittlich zwei Früchten. Sehr gute Lagerfähigkeit. Ausgezeichnet geeignet für Suppen und Kuchen.

03.180.2 **Rouge vif d' Etampes** (90–110 T) *NS* Ⓚ O
Ein 5–8 kg schwerer, flachrunder Speisekürbis. Die Schale ist orangefarben und das Fleisch gelborange. Auch lagerfähig. Rankend.

03.136.9 **Atlantic Giant** (150–170 T) *NS* Ⓚ O
Ein sehr stark rankender Riesenkürbis mit ockerfarbener, gerippter Schale und orangem Fruchtfleisch. Gewichte bis ca. 500 kg sind möglich. Saatgutbedarf ca. 5.000 Korn/ha.



**03.367.7 Kürbis Goliáš**



**03.180.2 Kürbis Rouge vif d' Etampes**



**03.100.0 Kürbis Blue Ballet**



**03.136.9 Kürbis Atlantic Giant**



03.301.1 Kürbis Frisco F1



03.165.9 Kürbis Tiana F1



03.137.6 Kürbis Avalon F1



03.140.6 Kürbis Butternut



03.208.3 Kürbis Maxim F1



03.298.4 Kürbis Atlas F1



03.144.4 Barbara F1



03.130.7 Kürbis Ariel F1



03.299.1 Kürbis Mieluna F1



03.172.7 Kürbis Langer von Neapel



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

## Butternuß-Kürbis

03.144.4 **Barbara F1** (85-95 T) NS K O
Butternuß mit attraktiv grünen Streifen und orangem Fruchtfleisch mit süßlichem Geschmack. Die Früchte werden ca. 1,5–2 kg schwer; Fruchtlänge ca. 25 cm. Die Kürbisse sind sehr einheitlich in Größe und Fruchtform.

03.140.6 **Butternut** (82 T) NS K ●
Glockenförmige, länglich schlanke Frucht mit orangem Fruchtfleisch und nußartigem Aroma. Das Fruchtgewicht beträgt ca. 1,2 kg.

03.137.6 **Avalon F1** (82 T) NS K O
Glockenförmige Frucht (Typ Butternut). Ernte, wenn die Schale blassgelb verfärbt ist. Das tieforange Fleisch hat ein feines, erdnußartiges Aroma. Sehr lange lagerfähig. Begrenzt rankend.

03.208.3 **Maxim F1** (78 T) NS K O
Butternuttyp mit größeren und schneller reifenden Früchten gegenüber Avalon. Maxim bildete in unserem Austrosaatversuch gleichmäßig walzenförmige, leicht birnenförmige Früchte aus. Die Kürbisse sind in Größe und Form sehr einheitlich. Sie erreichen ein Gewicht von 2,5–3 kg. Die Frucht wird 28–30 cm lang und ca. 10 cm breit. Das tieforange Fruchtfleisch hat ein erdnussartiges Aroma.

03.130.7 **Ariel F1** (90-100 T) NS K O
Butternuß-Typ. Dunkeloranges Fruchtfleisch mit hohem Zuckergehalt; kräftige Pflanzen mit Ranken; intermediäre Mehltauresistenz. Fruchtgewicht zwischen 0,8–1,5 kg.

03.165.9 **Tiana F1** (90 T) NS K O, NS K ●
Kleinfallende Butternut im 1 kg Sortiment; Frühreifend. Hoher Ertrag und Qualität. Fruchtfleisch intensiv dunkel gefärbt. Gewicht 1,0-1,2 kg. IR Resistenz gegen ZYVM (Zucchinigelbmosaikvirus).

03.299.1 **Mieluna F1** (90-95 T) NS K O
Kräftige, stark rankende Pflanzen; sehr hoher Fruchtansatz. Fruchtgewicht 1,0–1,3 kg, ideale Größe für den Frischmarkt. Dunkeloranges Fruchtfleisch mit hohem Brixgehalt. Sehr gute, lange Haltbarkeit. Resistenz (IR): Px (Echter Mehltau).

03.298.4 **Atlas F1** (ca. 90 T) NS K O
Ertragreiche Sorte mit gutem Fruchtansatz. Sehr große Früchte mit Fruchtgewicht 2–3 kg. Oranges Fruchtfleisch mit hohem Brixgehalt. Kräftige, stark rankende Pflanzen.

03.301.1 **Frisco F1** (ca. 90 T) NS K O
Stark rankender Butternuß-Kürbis mit sehr großen, 2–3 kg schweren Früchten mit leicht gerillter Haut und festem, hellorangem Fruchtfleisch.

19.270.1 **Violina** (85 T) NS K O
Ein größerer (2,5–3 kg), violinförmiger Butternuß-Typ mit gerunzelter, orangerosa Schale und süßem, leuchtend orangerotem Fruchtfleisch. Sehr hoher Ertrag. Für Frischmarkt und Industrie. Rankend.



**19.270.1 Kürbis Violina**

## Diverse Moschus-Kürbisse

03.174.1 **Long Island Cheese** (95 T) NS K O
Ein flachrunder, gerippter, mittelgroßer Moschuskürbis mit tieforangem, süßem Fruchtfleisch. Das durchschnittliche Fruchtgewicht beträgt 3–5 kg. Gut lagerfähig. Rankend.

03.223.6 **Ibiza F1** (105 T) NS K O
Long Island Cheese-Typ mit sehr schönen, etwas stärker gerippten Früchten. Gewicht: ca. 3 kg. Das Fruchtfleisch ist fein und geschmackvoll. Rankender Wuchs, 2-3 m² Platzbedarf pro Pflanze.

03.142.0 **Moschata de Provence** (90–100 T) NS K O, NS K ●
Ein flachrunder, gerippter Kürbis mit einer im reifen Zustand grauorangen Schale und intensiv orangerotem Fruchtfleisch. Reift von dunkelgrün auf grauorange ab. Intensiver Geschmack. Fruchtgewicht 4–8 kg. Sehr gute Lagerfähigkeit. Stark rankend.

03.226.7 **Mini Musk** (105 T) NS K O
Kleiner ausfallende Variante von Moschata de Provence. Die gerippten, flachrunden Früchte färben von grün nach ocker ab. Dunkeloranges (carotinhaltiges) Fruchtfleisch. Fruchtgewicht 3–5 kg. Guter Fruchtansatz, mäßig rankender Wuchs, ca. 2 m² Platzbedarf pro Pflanze.

03.227.4 **Butterkin F1** (95–100 T) NS K O
Handlicher, ertragreicher Muskatkürbis mit hochwertigem Fruchtfleisch und hellbraunen, flachrunden Früchten. Gewicht: ca. 1,5 kg. Kleine Samenhöhle. Das Fruchtfleisch ist kräftig dunkelorange (carotinhaltig). Kompakt rankender Wuchs.

03.172.7 **Langer von Neapel** (100–110 T) NS K O
Ein Moschuskürbis mit 75 cm bis 1 m langen, 15–20 cm dicken, dunkelgrünen, leicht gesprenkelten Früchten. Die hellgrüne Sprenkelung verfärbt sich im Reifestadium verwaschen orangegelb. Das Fruchtfleisch ist tieforange mit sehr wenigen Kernen. Aufgrund der späten Reife kann eine Vorkultur sinnvoll sein.







**03.142.0 Kürbis Moschata de Provence**



**03.223.6 Kürbis Ibiza F1**



**03.226.7 Kürbis Mini Musk**



**03.227.4 Kürbis Butterkin F1**



**03.174.1 Kürbis Long Island Cheese**



**03.171.0 Kürbis Howden**



**03.217.5 Kürbis Boomer F1**



**03.179.6 Kürbis Rocket F1**



**03.332.5 Kürbis Yellowgirls F1**



**03.321.9 Kürbis Yellowboys F1**



**03.203.8 Kürbis Spyro F1**



**03.320.2 Patisson Snowdisc F1**



**03.081.2 Kürbis Baby Pam**



**19.254.1 Kürbis Lumina**



**03.225.0 Patison Sunseance F1**



**03.103.1 Kürbis Celebration**



**03.093.5 Kürbis Tuffy**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

## Halloween-Kürbis

03.081.2 **Baby Pam** *NEU* (90 T) NS K O
Halloweenkürbis mit oranger, leicht gerippter Schale und orangem Fruchtfleisch. Der Durchmesser beträgt 10–15 cm, Fruchtgewicht 1,2–2,5 kg. Platzbedarf pro Pflanze 1–2 m². Leicht rankend.

03.179.6 **Rocket F1** (70 T) NS K O
Ein orangeroter, leicht gerippter, hochrunder Halloween-Kürbis zur Dekoration bzw. zum Schnitzen. Fruchtgewicht 6–9 kg. Relativ früh. Rankend.

19.254.1 **Lumina** (70 T) NS K O
Ein runder, weißer Halloween-Kürbis, der sich ideal zum Schnitzen oder Bemalen eignet. Das Fleisch ist sehr dick. Fruchtgewicht 5–8 kg. Idealer Farbkontrast zu orangen Typen. Durch sehr wechselhafte Witterungsbedingungen kann Lumina einen zarten, sehr interessanten Blaustich erhalten. Rankend.

03.171.0 **Howden** (80 T) NS K O
Ein tieforanger, leicht gerippter Halloween-Kürbis. Fruchtgewicht ca. 5–8 kg. Fruchtform hochrund. Rankend.

03.217.5 **Boomer F1** (95 T) NS K O
Perfekter Laternen Kürbis mit einem Durchmesser von 23–26 cm und einem Gewicht von 4,5 bis 6 kg. Flachrunde dunkelorange Früchte mit Rippen. Resistenz: IR: Px (Echter Mehltau).

03.332.5 **Yellowgirls F1** (80-85 T) NS K O
Stark rankender Kürbis mit runden, orangen, leicht gerippten Früchten. Fruchtgewicht 4–6 kg.

03.321.9 **Yellowboys F1** (80-85 T) NS K O
Stark rankender Kürbis mit runden, orangen, leicht gerippten Früchten. Fruchtgewicht 6-8 kg. Großfallende Partnersorte zu Yellowgirls F1.

03.203.8 **Spyro F1** (85–90 T) NS K O
Mini-Halloween-Kürbis mit halbaufrechten, stark rankenden Pflanzen und orangen, runden, leicht gerippten Früchten. Fruchtgewicht 0,7–1,5 kg, Größe 12–15 cm. Intermediäre Resistenz gegen Px (Echter Mehltau).

## Patisson-Kürbis

03.320.2 **Patisson Snowdisc F1** (65 T) NS K O
Leuchtend weißer Ufo-Kürbis mit typisch flachen, sehr einheitlichen Früchten. Kräftige Pflanzen mit buschigem Wuchs, keine Ranken. Auch für Kleinernte geeignet.

03.225.0 **Patisson Sunseance F1** (60 T) NS K O
Flacher, sonnengelber, ertragreicher Patisson-Kürbis mit typischer, flacher Scheibenform. Auch für Kleinernte geeignet. Gute Feld- und Lagerhaltbarkeit.



**03.080.5 Kürbis Ugly Dumpling F1**



**03.182.6 Spaghetti-Kürbis Stripetti F1**

## Spaghetti-Kürbis

03.182.6 **Stripetti F1** (95 T) NS K O
Dieser lagerfähige **Spaghetti-Kürbis** bildet länglich-ovale Früchte (ca. 25 x 12 cm) aus. Die Schalenfarbe ist zuerst lichtgrün/cremefarben mit dunkelgrünen Streifen. Im ausgereiften Stadium verfärbt sich die Grundfarbe auf gelb und die Streifen färben auf orange um. Die cremegelben "Nudeln" haben nach dem Kochen einen süßen, nußigen Geschmack. Rankend.

03.195.6 **Primavera F1** (85-90 T) NS K O
**Spaghetti-Kürbis** mit in Form und Größe einheitlichen Früchten. Ertragreiche Hybride mit hervorragender Fruchtfleischqualität für lange Spagetti. Zur Reife ist die Fruchtschale kanarienvogelgelb.

03.318.9 **Baby Spaghetti F1** (85-90 T) NS K O
Früher Mini-Spaghettikürbis mit 400–600 g schweren, eiförmigen Früchten, oranger, glatter Schale und blass-gelborangem Fruchtfleisch. Bei voller Reife hat das Fruchtfleisch eine feine Spaghettitextur und feinen, nussigen Geschmack. Ertragreiche Sorte mit 15–20 Früchten pro Pflanze. Gute Lagerfähigkeit. Stark rankend.

## Diverse-Gartenkürbisse

03.093.5 **Tuffy** *NEU* NS K O
Dunkelgrüner **Eichelkürbis** mit kurzen Ranken. Fruchtgewicht ca. 900 g. Zum Garen und Füllen geeignet, bestes Aroma ca. 2 Wochen nach der Ernte.

03.103.1 **Celebration** (90 T) NS K O
Bunter **Eichelkürbis** mit spitzem Fruchtende und tiefgelber Schale mit dekorativer, grüner und oranger Zeichnung. Sehr gute, gelbe Fruchtfleischqualität. Die Früchte werden ca. 0,8 bis 1 kg schwer und sind besonders zum Füllen geeignet. Starke Resistenz gegen Mehltau. Celebration wächst buschförmig und benötigt ca. 1 m² Fläche je Pflanze.

03.080.5 **Ugly Dumpling F1** *NEU* (100 T) NS K O
Schön gefärbter Sweet Dumpling-Typ mit grünen Streifen und sehr gutem Geschmack, sehr gut zum Füllen geeignet. Fruchtgewicht ca. 600 g. Kompakter Wuchs.

03.101.7 Busch **Delicata** (90-95 T) NS K O
Die zylindrischen Früchte dieses Delicata-Kürbis sind cremegelb mit grünen Streifen und grüner Sprenkelung. Buschiger Wuchs. Die Früchte wiegen ca. 0,5–1,0 kg und sind ideal zum Füllen. Das gelbe Fruchtfleisch hat einen süßlich feinen Geschmack; am Lager nachreifen lassen!



**03.318.9 Spaghetti-Kürbis Baby Spaghetti F1**



**03.195.6 Spaghetti-Kürbis Primavera F1**



**03.101.7 Kürbis Busch Delicata**

# ZIERKÜRBIS (nicht zum Verzehr geeignet)



**19.252.7 Kleinfrüchtige Prachtmischung**



**19.243.5 Zierkürbis Dornenkrone Mischung**



**19.271.8 Warzige kleinfrüchtige Mischung**




**19.267.1 Zierkürbis Patison Strié Mix**



**19.203.9 Zierkürbis Galaxy of Stars**




**19.245.9 Zierkürbis Großfrüchtige Prachtmischung (Bischofsmütze)**

19.252.7 **Kleinfrüchtige Prachtmischung** (70 T) *NS* Ⓚ O
Eine **erweiterte Mischung**, in der mehrfärbige, warzige, birnenförmige, weiße Nesteier, oranger Wendehals usw. enthalten sind. Eine Sorte mit reicher Verschiedenheit bei kleinfrüchtigen Zierkürbissen für Dekorationszwecke. Rankend. Früchte nicht zum Verzehr geeignet.

19.271.8 **Warzige kleinfrüchtige Mischung** (70 T) *NS* Ⓚ O
Eine Mischung in verschiedenen Farben und Formen. Ideale Ergänzung zur "Kleinfrüchtigen Prachtmischung" zu Dekorationszwecken. Rankend. Früchte nicht zum Verzehr geeignet.

19.245.9 **Großfrüchtige Prachtmischung (Bischofsmütze)** (90 T) *NS* Ⓚ O
Ein orangeroter, größerer Türkenbundkürbis mit unterschiedlicher Streifung. In dieser Mischung sind 5–8 % Kalebassen enthalten. Rankend. Nicht zum Verzehr geeignet.

19.269.5 **Türkenbundkürbis** (90 T) *NS* Ⓚ O
Ein kleinerer Türkenbundkürbis in den Farben Gelb, Orange, Rot und Grün gestreift. Sehr schöner Dekorationskürbis. Rankend. Nicht zum Verzehr geeignet.

19.243.5 **Dornenkrone Mischung** (70 T) *NS* Ⓚ O
Die dornenkronenähnlichen Kürbisse haben einen Durchmesser von ca. 10 cm. Die interessante Form und das Farbenspiel ergeben den idealen, kleinfrüchtigen Dekorationskürbis. Wenig rankend. Früchte nicht zum Verzehr geeignet.

19.267.1 **Patisson Strié Mix** (75 T) *NS* Ⓚ O
Ein dekorativ gestreifter Typ in verschiedenen Farben und Fruchtformtypen. Der Fruchtdurchmesser beträgt 15–20 cm. Bringt je nach Kulturführung 6–12 Früchte pro Pflanze. Buschtyp mit leichten Ranken. Früchte nicht zum Verzehr geeignet.

19.203.9 **Galaxy of Stars** (100–110 T) *NS* Ⓚ O
Attraktive Mischung aus sternförmigen Zierkürbissen in dekorativen Farben und zweifärbigen Mustern. Die Pflanzen wachsen stark rankend und werden im Durchschnitt ca. 8 cm groß. Nicht zum Verzehr geeignet.

19.253.4 **Little Indian Mix** (70 T) *NS* Ⓚ O
Eine vielfältige Mischung in Form und Farbe im kleinfrüchtigen Indian Mix-Bereich. Neben verschiedenen warzigen Typen sind auch kleinfrüchtige Dornenkronen und Autumn Wings enthalten. Fruchtdurchmesser 3–8 cm. Pro Pflanze kann je nach Kultur und Art mit 8–15 Früchten pro Pflanze gerechnet werden. Dekorationskürbis, nicht zum Verzehr geeignet. Rankend.



**19.269.5 Zierkürbis Türkenbundkürbis**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# ZIERKÜRBIS (nicht zum Verzehr geeignet)

19.247.3 **Indy Mix** (70 T) NS Ⓚ O
Variable Prachtmischung von kleinen, vielfärbigen Früchten. Unter anderem sind Autumn Wings- und Dornenkronen-Typen dabei. Kleiner Dekorationskürbis. Nicht zum Verzehr geeignet. Rankend.

19.246.6 **Mini Dekor weiß** (65 T) NS Ⓚ O
Die weißen, flachrunden, gerippten Kürbisse sind etwas kleiner als die von Mini Dekor Orange. Die Ernte soll schon am Ende des Sommers erfolgen, da die Farbe bedingt durch herbstliche Witterungseinflüsse ins Gelbliche spielt. Begrenzt rankend.

19.266.4 **Mini Dekor orange** (70 T) NS Ⓚ O
Kleiner, oranger Mandarin-Kürbis mit ca. 10 cm Durchmesser. Flachrund und gerippt. Begrenzt rankend. Früchte nicht zum Verzehr geeignet.

19.264.0 **Mini Dekor Mischung** (65–70 T) NS Ⓚ O
Eine Mischung aus Mini Dekor weiß und Mini Dekor orange. Begrenzt rankend. Früchte nicht zum Verzehr geeignet.

19.272.5 **Wendehals (Crookneck)** (55-75 T) NS Ⓚ O
Keulenförmige, stark gewarzte Früchte mit gebogenem Hals. Die Schalenfarbe ist leuchtend gelborange. Die Früchte haben einen Durchmesser von 5–10 cm und eine Länge von 15–25 cm. Begrenzt rankend. Nicht zum Verzehr geeignet.

19.268.8 **Schwanenhals** (75 T) NS Ⓚ O
Ein grüner, hellgrün gesprenkelter Dekorationskürbis mit geschwungenem Schwanenhals. Leicht rankend, optimal auf Spalier zu kultivieren. Früchte nicht zum Verzehr geeignet.

19.251.0 **Kalebassen (Lagenaria)** (75–80 T) NS Ⓚ O
Eine Mischung aus grünen Kalebassen in flachrunder bis Castagnettenform. Sehr gut geeignet zur Trocknung. Rankend. Früchte nicht zum Verzehr geeignet.




**19.266.4 Zierkürbis Mini Dekor orange**



**19.246.6 Zierkürbis Mini Dekor weiß**



**19.264.0 Zierkürbis Mini Dekor Mischung**



**19.251.0 Kalebasse** (z.B. getrocknet und bemalt)



**19.247.3 Zierkürbis Indy Mix**



**19.247.3 Zierkürbis Indy Mix**



**19.272.5 Zierkürbis Wendehals (Crookneck)**



**19.268.8 Zierkürbis Schwanenhals**



**03.107.9 Zucchini Ismalia F1**



**03.220.5 Zucchini Tempra F1**



**03.134.5 Zucchini Tendor F1**



03.222.9 **Zucchini Ola Escaladora**



**03.124.6 Zucchini Fenna F1**



**03.228.1 Zucchini Keesha F1**



**03.196.3 Zucchini Gold Rush F1**



**03.102.4 Zucchini Lingodor F1**



**03.108.6 Zucchini Yellowfin F1**



**03.119.2 Zucchini Luneor F1**



**03.229.8 Zucchini Satelite F1**



**03.147.5 Zucchini Géode F1**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# KÜRBIS - ZUCCHINI *Cucurbita pepo L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro 1000 m² | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 1.000 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| siehe Sorten-hinweise | 1.500–1.750 Korn / 1.250–1.450 Pflanzen | GW kalt: Anf. März<br>Vlies: Anf. April<br>Freiland: ca. 20. April<br>ca. 20. Mai Direkts. | Anf. April<br>ca. 25. April<br>ca. 15-20. Mai | 100 x 70–80 | Mitte Mai<br>E. Mai/A. Juni<br>Mitte Juni | ca. 3.000 - 3.500 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Farbe | Resistenzen **(IR)** | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| **Zylindrische Sorten** | | | | |
| 03.107.9 | **Ismalia F$_1$** *NS* Ⓚ O | hellgrün | ZYMV / WMV / Px / PRSV | früh reifende Sorte mit schöner zylindrischer Fruchtform; für alle Anbautermine im Freiland |
| 03.220.5 | **Tempra F$_1$** *PR* Ⓚ O, *PR* Ⓚ ● | mittelgrün | | sehr früher Buschtyp mit kompaktem und doch kräftigem Wuchs; sehr frühe Ernte; sehr hoher Ertrag; widerstandsfähig gegen Viruserkrankungen; auch für Treibkulturen |
| 03.134.5 | **Tendor F$_1$** *PR* Ⓚ O | mittel - dunkelgrün | ZYMV / WMV / CMV / Px | frühe Zucchini mit schöner Fruchtform und übersichtlichem Pflanzenaufbau; leichte Erntearbeit; hält sehr gut durch; geeignet für Kulturen im Folientunnel und Freiland |
| 03.124.6 | **Fenna F$_1$** *NS* Ⓚ O, *NS* Ⓚ ● | dunkelgrün | ZYMV / WMV / Px / PRSV | stachelarme, leicht zu bearbeitende Pflanzen mit aufrechtem, offenem Wuchs; sehr standfest; sehr gute Fruchtqualität; für Sommerpflanzungen; hoher Ertrag; gutes Shelf-life |
| 03.228.1 | **Keesha F$_1$** *NS* Ⓚ O, *NS* Ⓚ ● | dunkelgrün | ZYMV / WMV / CMV / Px / PRSV | die stachelarme Pflanze lässt sich besonders leicht bearbeiten und ernten; stabile Produktion mit hohem Prozentsatz an Klasse I Früchten |
| 03.222.9 | **Ola Escaladora** *NS* Ⓚ ● | dunkelgrün | | **Kletter-Zucchini** mit 20–25 cm langen Früchten; schön gezeichnetes Laub; die Ranken können eine Länge von 5 m erreichen und müssen regelmäßig angebunden werden |
| 03.108.6 | **Yellowfin F$_1$** *NS* Ⓚ ● | leuchtend gelb | CMV / Px | zylindrische Frucht; für die gesamte Anbausaison im Freiland |
| 03.102.4 | **Lingodor F$_1$** *NS* Ⓚ O, *NS* Ⓚ ● | hellgelb | ZYMV / WMV / CMV / Px / PRSV | generative Pflanze; für die gesamte Anbauperiode im Freiland und unter Folie geeignet |
| **Runde Sorten** | | | | |
| 03.147.5 | **Géode F$_1$** *PR* Ⓚ O | hellgrün | | Buschtyp mit sehr kurzen Ranken; Ernte mit 10–12 cm Durchmesser, ø Gewicht 400–700 g; sehr produktiv; Qualitätssorte für Marktfahrer und Lebensmittelketten |
| 03.229.8 | **Satelite F$_1$** *NS* Ⓚ O, *NS* Ⓚ ● | dunkelgrün | | hohes Durchschnittsgewicht; hervorragende Haltbarkeit; ziemlich früh und produktiv; die Ernte wird durch den mittellangen Stiel erleichtert; für geschützten Anbau und Freiland |
| 03.119.2 | **Luneor F$_1$** *PR* Ⓚ O | leuchtend gelb | ZYMV / WMV / CMV / Px | ertragreiche Sorte mit aufrechtem, offenem Wuchs; für geschützten Anbau und Freiland |
| **Sorte speziell für die Topfkultur** | | | | ***für Terrasse und Balkon*** |
| 03.128.4 | **Midnight F$_1$** *NS* Ⓚ O | dunkelgrün | | sehr kompakte Pflanzen mit offenem Wuchs; optimal für die Kultur im Container; die Früchte können als Baby-Zucchini oder in Standardgröße geerntet werden |
| 03.215.1 | **Easy Pick Gold** *NS* Ⓚ O | gelb | | kompakter Wuchs; offener Pflanzenaufbau; Höhe 90–100 cm, Breite 70–100 cm; für den Verkauf im 12 cm-Topf, trägt dabei schon Früchte; Kulturdauer ab Auspflanzung ca. 35 Tage |

**IR = intermediäre (mittlere) Resistenz**
**Px = Echter Mehltau** (Podosphaera xanthii); **ZYMV = Zucchini-Gelbmosaikvirus** (Zucchini yellow mosaic virus); **WMV = Wassermelonenvirus** (Watermelon mosaic virus); **PRSV = Papaya ringspot virus; CMV = Gurkenmosaikvirus** (Cucumber mosaic virus)



**03.128.4 Zucchini Midnight F$_1$**



**03.118.5 Zucchini Flaminio F$_1$**



**03.127.7 Zucchini Safari F$_1$**



**03.215.1 Zucchini Easy Pick Gold**

## Sorten für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

| | | |
|---|---|---|
| 03.138.3 | **Ambassador F$_1$**: Die Früchte sind schlank und gut geformt. Die Farbe ist mittel- bis dunkelgrün. Nicht rankende, kompakte Pflanzen. Sehr gesund und wenig anfällig für Echten Mehltau. Für Pflanzenwiederverkauf. TKG ca. 160 g. | *NS* Ⓚ O |
| 03.196.3 | **Gold Rush F$_1$**: Goldgelbe, schöne, gleichmäßige Früchte mit weißem Fleisch. Bildet sehr große Blüten aus, sehr gut geeignet für die Ernte von Zucchiniblüten. Buschtyp. | *NS* Ⓚ O |
| 03.127.7 | **Safari F$_1$**: Eine optisch interessante dunkelgrüne Zucchini mit hellen Streifen. Die Pflanzen sind leicht zu beernten. | *NS* Ⓚ O |
| 03.118.5 | **Flaminio F$_1$**: Buschige, wüchsige Pflanzen; hellgrün-dunkelgrün gestreifte, leicht geriefte Früchte; sehr große Blüten. | *NS* Ⓚ O |
| 03.197.0 | **Black Forest F$_1$**: Sehr frühe, dunkelgrüne Zucchini mit kurzen Internodien. Zur Aufleitung, auch im Gewächshaus. | *NS* Ⓚ O |

# MAIS - ZUCKERMAIS *Zea mays var. saccharata*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro 1000 m² | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 – 200 g | 1 – 1,5 kg bzw. ca. 7.500–8.500 K | April – Mai | – | 70 x 20 bis 75 x 24 | Juli – Sept. | 580 – 1.100 Kolben |




**Hinweis für konventionellen Anbau: Bei ungebeiztem Saatgut – wegen gleichmäßigem Aufgang – unbedingt Fungizidbeizung durchführen.**



03.244.1 **Noa F1** (ca. 80 T) *NS* K O
Eine mittelfrühe, gelbe Hybridsorte im Sh2-Typ mit großen, schweren Kolben und sehr süßem Geschmack. Die Kolben haben im Durchschnitt 16–18 Kornreihen bei einer Länge von ca. 20 cm. Die Pflanzenhöhe beträgt ca. 195 cm und die Kolbenansatzhöhe ca. 70 cm. Hohe Resistenz gegen Maydis-Blattflecken (Bipolaris maydis, Helminthosporium maydos) intermediäre Resistenz gegen Bakterienwelke (Pantoea stewartii, Erwinia stewartii) und Turcicum-Blattflecken (Exserohilum turcicum, Helminthosporium turcicum). Auch für frühe, speziell aber für mittlere und spätere Sätze.
Verkauf nach Korn in Einheiten (1 EH = 25.000 Korn).
Auch in Kleinmengen (1.000 Korn) verfügbar



03.409.4 **Takeoff F1** ***NEU*** *NS* K O
Eine mittelfrühe Zuckermais Sorte im Sh2 Typ. Die Kolben haben durchschnittlich 18 Kornreihen bei einer Länge von ca. 20–25 cm. Das Korn ist mittelgrob und sehr süß, die Pflanzhöhe beträgt 2,0–2,20 m und die Kolbenansatzhöhe ca. 50–70 cm. Resistenzen: HR: Maisrost (Puccinia sorghi) und MDMV (maize dwarf mosaic virus). Für Frischmarkt. Verkauf nach Korn. Nur in Einheiten (1 EH = 25.000 Korn).



03.258.8 **Arelia F1** (ca. 73 T) *NS* K O
Eine mittelfrüher Zuckermais im Sh2-Typ. Die Kolben haben bei einer Länge von ca. 21-23 cm im Durchschnitt 18–20 Kornreihen. Die Pflanzenhöhe beträgt ca. 193 cm und die Kolbenansatzhöhe ca. 61 cm. Gutes Erntefenster. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Maisrost (Puccinia sorghi) und PSt Stewarts Welke (Pantoea stewartii). Mittlere Widerstandsfähigkeit gegen (Et) Turcicum-Blattdürre (Exserohilum turcicum). Saatgutbedarf: 75.000-85.000 K/ha.
Verkauf nach Korn. Nur in Einheiten (1 EH = 25.000 Korn).



03.116.1 **Popcornmais R400MR** (ca. 103 T) *NS* K O
„Mushroom-Typ". Gelbkörnige Sorte mit großen Kolben und sehr guter Popcornqualität. Hohe Widerstandsfähit gegen Maisrost (Puccinia sorghi) und GLS Graue Blattfleckenkrankheit (Cercospora zeae-maydis, mittlere Widerstandsfähigkeit gegen (GW) Bakterienwelke (Clavibacter michiganensis ssp. nebraskensis). Saatgutbedarf: 80.000 Korn/ha.
Verkauf nach Korn (Min. = 1.000 Korn).

03.257.1 **Popcornmais Pop 997** (ca. 103 T) *NS* K O
„Butterfly-Typ".Gelb-oranger Popcornmais mit großen Körnern. Verbesserte Standfestigkeit und Körner, die leicht aus der Schale platzen. Mittelfrühe Sorte mit hohem Ertrag. Resistenzen: HR: Blattfleckenkrankheit, IR: Maisrost und Dürre.
Verkauf nach Korn (Min. = 1.000 Korn).

**Sh2 = Super sweet**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# MANGOLD *Beta vulgaris L. var. vulgaris*

| 1 g enthält ca. | Saatgutbedarf pro 100 m² | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60–80 Knäuel | 100-150 g f. Stielmangold 300 g f. Blattmangold | (Mitte März) Mitte April bis Juli | ab Mitte April bei Stiel-mangold | 30 x 35 bei Stielmangold | Stielmangold: 10-12 Wo., Blattmangold 8–10 Wo. nach Saat | Stielmang. 600 kg Blattmang. ca. 150 kg |






03.276.2 **Sibilla** *NS* O
Mittelstarkwüchsige Sorte mit aufrechtem Wuchs, leicht blasigen, intensiv grünen Blättern und kräftigen weißen Blattstielen. Geeignet für die Frühjahrs- und Sommerproduktion. Gute Schossfestigkeit.



03.274.8 **Bright Lights F1** *NS* O
Sorte mit vielfärbigen Stängeln und Blättern in verschiedenen Grüntönen. Geeignet für die ganzjährige Produktion, Verwendung als Jungblatt, sowie Bündel. Je kühler die Temperaturen, umso intensiver färben die Stiele. Geringere Frosthärte.



03.272.4 **Barese** *NS* O
Kompakte Pflanzen mit aufrechtem Wuchs und dunkelgrünen, glatten, weißrippigen Blättern.



03.261.8 **Verde da taglio (Grüner Schnitt)** *NS* O
Starkwüchsiger Sommer-Schnittmangold.



03.273.1 **White silver 2** *NS* O
Dunkelgrün mit weißen Rippen. Vorwiegend Pflanzkultur.



03.275.5 **Rhubarb Chard** *NS* O, *NS* ●
Rotstieliger, dekorativer Mangold. Für Aussaat Ende Mai im Freiland. Auch für Baby-leaf Produktion

**Baby-Leaf-Sorten siehe Seite 98**



**03.328.8 Zuckermelone Galia F1**



**03.325.7 Honigmelone Eliodoro F1**



**03.331.8 Zuckermelone Exelor F1**



**03.337.0 Zuckermelone Wrangler F1**



**03.338.7 Zuckermelone Bari F1**



**03.380.6 Zuckermelone Melgic F1**



**03.288.5 Wassermelone Gatinho F1**



**03.281.6 Wassermelone Ketty F1**



**03.314.1 Wassermelone Primaorange F1**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# MELONEN

| 1.000 Korn Gewicht ca. | ca. Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–40 g | 50–100 g je nach Sorte bzw. 1.200 K. | April – Mai warm | Mitte Mai | Zucker/Honigmel. 150 x 50 Wassermelonen 120–250 x 60–80 | August – Sept. | 200 – 400 kg |




## Honig- und Zuckermelonen *Cucumis melo L.*

Bestandsdichte 100 Pflanzen/100 m². Alle Sorten sind für Freilandkultur, Kultur im Folientunnel und für Treibkultur als Schnurkultur geeignet. Anbau ca. Anfang April, Pflanzung Anfang Mai. Standweite als Doppelreihe: Reihenabstand 120 cm, Abstand in der Doppelreihe 50 cm x 50 cm.

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Form | ca. Frucht Gewicht | Schale | Frucht Fleisch | Resistenzen bzw. Toleranzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Honigmelonen** | | | | | | | |
| 03.325.7 | **Eliodoro F₁** NS Ⓚ O | oval | 2 kg | intensiv gelb, gerippt | weiß | **HR:** Fom:0,1 **IR:** Px / Gc | **Amarillo-Typ**; sehr hohe Pflanze; gute Blattabdeckung; aromatisches, sehr süßes Fruchtfleisch (14-16° Brix) |
| **Zuckermelonen** | | | | | | | |
| 03.328.8 | **Galia F₁** NS Ⓚ O | rund | 1–1,5 kg | gelblich, fein genetzt | weiß-grün | | sehr süßes Fruchtfleisch; in der Reife sind die anfangs grünen Früchte gelblich |
| 03.331.8 | **Exelor F₁** NS Ⓚ O | rund | 1–1,8 kg | gelblich, fein genetzt | weiß-grün | **HR:** MNSV **IR:** Fom:0,1,2 / Gc:1 / Px:1,2,5 | **Galia-Typ**; süßes, festes Fruchtfleisch; die Früchte bleiben auch während des Transports fest |
| 03.337.0 | **Wrangler F₁** NS Ⓚ O | rund-oval | 2 kg | gelblich, genetzt, gestreift | orange | **T:** Fom:0,1,2 | **Cantaloupe-Typ**; relativ früh reifend, unempfindlich gegen Echten Mehltau |
| 03.338.7 | **Bari F₁** NS Ⓚ O | rund-oval | 1,2–1,5 kg | gelblich, genetzt | orange | **HR:** Fom:0,1,2 **IR:** Px:2,5 / Gc:1 | **Cantaloupe-Typ**; mittelfrühe Sorte mit gleichmäßigen Früchten mit mittlerer Haltbarkeit |
| 03.380.6 | **Melgic F₁** NS Ⓚ O | rund | 0,9–1,2 kg | gelblich, genetzt, gestreift | orange | **HR:** Fom:0,1,2 **IR:** Px:1,2 / Gc:1 | **Charentais-Typ**; breitere Netzung; gleichmäßiger Bestand; gute Haltbarkeit; tolerant gegen Glasigkeit |

**HR = Hohe Resistenz, IR = intermediäre (mittlere) Resistenz, T = Toleranz**
**Fom = Fusarium-Welke (Fusarium oxysporum f. sp. melonis); Px = Echter Mehltau (Podosphaera xanthii)**
**Gc = Golovinomyces cichoracearum; MNSV = Melon Necrotic Spot Virus**

## Wassermelonen *Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai*

Bestandsdichte 60–90 Pflanzen/100 m². Alle Sorten sind für Freilandkultur, Kultur im Folientunnel und Treibkultur geeignet.

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Form | ca. Frucht Gewicht | Schale | Frucht Fleisch | Resistenzen bzw. Toleranzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.281.6 | **Ketty F₁** NS Ⓚ O | rund | ca. 2 kg | hellgrün, dunkelgrün gestreift | rot | | **Mini-Crimson-Typ** mit dunkelrotem, süßem, knackigem Fruchtfleisch mit **Mikro-Samen**; sehr ertragreich auch bei hohen Temperaturen; Bestäubersorte |
| 03.288.5 | **Gatinho F₁** PR Ⓚ O | rund | 2–3 kg | hellgrün, dunkelgrün gestreift | rot | | **rote Mini-Wassermelone** mit **Mikro-Samen**; süßes, knackiges Fruchtfleisch, als Bestäubersorte und für den Frischmarkt geeignet |
| 03.310.3 | **Verona F₁** NS Ⓚ O | walzenförmig | 12–14 kg | dunkelgrün, hellgrün gestreift | rot | **IR:** Fom:1 \| Co:1 | **Crimson-Typ**; kräftige Pflanzen mit hohem Fruchtansatz und ausgezeichneter Qualität |
| 03.287.8 | **Luteo F₁** NS Ⓚ O | rund | 1,5–2 kg | hellgrün, dunkelgrün gestreift | gelb | | **gelbe Mini-Wassermelone**; sehr guter Fruchtansatz; schmackhaft-süße Früchte mit knackiger Innenstruktur und geringem Samenansatz |
| 03.311.0 | **Primagold F₁** PR Ⓚ O | rund | 3–4 kg | grün, dunkelgrün gestreift | gelb | | sehr attraktives, **gelbes Fruchtfleisch**; sehr ertragreich, benötigt daher bei ca. 8 cm Fruchtgröße zusätzliche Stickstoffgabe; Selbstbestäuber |
| 03.314.1 | **Primaorange F₁** PR Ⓚ O | rund | 3 kg | grün, dunkelgrün gestreift | lachsorange | | leuchtend **lachsoranges**, sehr süßes Fruchtfleisch mit wenig Samen; runde, grüne Früchte mit dunkelgrünen Streifen; Selbstbestäuber |

**HR = Hohe Resistenz, IR = intermediäre (mittlere) Resistenz**
**Fom = Fusarium-Welke (Fusarium oxysporum f. sp. melonis); Co = Anthracnose (Colletotrichum orbiculare)**



**03.311.0 Wassermelone Primagold F₁**



**03.287.8 Wassermelone Luteo F₁**



**03.310.3 Wassermelone Verona F₁**

# PAPRIKA

## Sortenvergleichsanbau praxisnah in Österreich



# PAPRIKA

Paprika | Pfefferoni | Chili | Habañero | Jalapeño





**03.572.5 Paprika Gialte F1**



**03.573.2 Paprika Fiesta F1**



**03.655.5 Paprika Rubika F1**



**03.586.2 Paprika Lozorno F1**



**03.654.8 Paprika Tequila F1**



**03.563.3 Paprika Bendigo F1**



**03.630.2 Paprika Saskia F1**



**03.597.8 Paprika Mavera F1**



**03.598.5 Paprika Mavras F1**



**03.501.5 Paprika Milena F1**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# PAPRIKA *Capsicum annuum L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–7 g | ca. 1.250 Korn **Direktsaat:** (Feldanbau) 60.000 Korn/ha | Treibkultur: Jän.-Feb. Freilandk.: Feb.-März | März -April<br>Mitte Mai | 90 x 30<br>50 x 30 | ab Mai<br>ab Juli | 4.000 Stk.<br>150-350 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Farbe/Abreife | Frucht Größe | Frucht Fleisch | Verwendung | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GELBE, blockige F1-Hybriden** für Gewächshauskultur | | | | | | | |
| 03.613.5 | **Elsa F1** NS Ⓚ ● | dunkelgrün/ gelb | sehr groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-3 | für Erd- und Treibkultur; frühe, kompakte Sorte; rascher Farbwechsel; Fruchtgewicht 200-220 g, süßer Geschmack |
| 03.573.2 | **Fiesta F1** NS Ⓚ O, NS Ⓚ ● | dunkelgrün/ goldgelb | groß | dick | Frischmarkt, auch Tricolore | HR: Tm:0-2 | offener Pflanzenaufbau; gute Haltbarkeit, Treibkultur |
| 03.572.5 | **Gialte F1** NS Ⓚ O, NS Ⓚ ● | grün/ hellgelb | groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-3 | sehr früh; offener, kräftiger Wuchs; für leicht geheizten und geheizten Tunnel; 2022 gute Erfolge auch im kalten Tunnel |
| **GRÜNE, blockige F1-Hybriden** für Gewächshauskultur – rot abreifend | | | | | | | |
| 03.586.2 | **Lozorno F1** PR Ⓚ O *geprimt* | hell-mittel-grün/ rot | sehr groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-2 | Treibkultur; große, schwere Früchte; hoher Stückertrag |
| 03.611.1 | **Olly F1** NS Ⓚ ● | dunkelgrün/rot | groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-2 | für Erd- und Treibkultur; sehr früh, rascher Farbwechsel; kräftiger Wuchs; Fruchtgewicht 180-200 g, süßer Geschmack |
| 03.630.2 | **Saskia F1** PR Ⓚ O | helles Apfel-grün/rot | sehr groß | dick | Frischmarkt | | früh reifend, mittelstarker Wuchs; Fruchtgewicht von ca. 120-140 g; für kaltes Folienhaus und Freiland |
| 03.655.5 | **Rubika F1** NS Ⓚ O | mittel-dkl.grün/ dunkelrot | sehr groß | dick | Frischmarkt | | Fruchtgewicht von ø 230 g; offener Pflanzenaufbau; für kaltes Folienhaus und Freiland |
| **BUNTE, blockige F1-Hybriden** für Gewächshauskultur | | | | | | | |
| 03.599.2 | **Waldo F1** NS Ⓚ ● | **Ernte:** wachsgelb | mittel | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0 | für Erd- und Treibkultur; frühe, kompakte Sorte; Fruchtgewicht 160–170 g |
| 03.597.8 | **Mavera F1** NS Ⓚ O | **Ernte:** rot | groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-2<br>IR: TSWV:0 | kontinuierlicher Fruchtansatz, überzeugt auch unter sich ändernden Wetterbedingungen, frühe, rot abreifende Sorte |
| 03.563.3 | **Bendigo F1** NS Ⓚ O, NS Ⓚ ● | **Ernte:** grün/rot | groß | mittel | Frischmarkt | HR: Tm:0 | sehr früh; auch für Grünernte; robust; für kalte Kultur und Freiland; für Marktfahrer und Jungpflanzenproduktion |
| 03.598.5 | **Mavras F1** NS Ⓚ O | **Ernte:** dkl.violett/ dunkelrot | sehr groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-2 | Treibkultur, frühe und ertragreiche Sorte |
| 03.617.3 | **Lilo F1** NS Ⓚ ● | **Ernte:** dkl.violett/ dunkelrot | groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-2 | für Erd- und Treibkultur; späte, kompakte Sorte, kurzes Erntefenster; Fruchtgewicht 170–190 g; grünes Fleisch |
| 03.654.8 | **Tequila F1** NS Ⓚ O | **Ernte:** lila/rot | mittel | mittel-dick | Frischmarkt | HR: Tm:0 | Treibkultur, etwas längere Frucht mit attraktiver Farbe |
| 03.501.5 | **Milena F1** PR Ⓚ O | **Ernte:** orange | sehr groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-3 / PVY: 0-1<br>IR: TSWV:0, TEV | früher, kompakter Pflanzenwuchs, orange abreifender Blockpaprika mit guter Qualität; Fruchtgröße 85-90 mm |
| 03.614.2 | **Ilyn F1** NS Ⓚ ● | **Ernte:** orange | groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-2 | für Erd- und Treibkultur; frühe Sorte; kräftiger Wuchs; rascher Farbwechsel; Fruchtgewicht ø 230 g |
| 03.516.9 | **Delirio F1** NS Ⓚ O | **Ernte:** orange | groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-3, TSWV | guter Geschmack; früh; Durchmesser ca. 10 cm; für kalte Kultur und Freiland; für Pflanzenwiederverkauf |

**HR = Hohe Resistenz, IR = intermediäre (mittlere) Resistenz**
**Tm = Tabakmosaikvirus, Lt = Leveillula taurica, MNSV = Melon Necrotic Spot Virus,**
**Fom = Fusarium-Welke (Fusarium oxysporum f. sp. melonis), Px = Echter Mehltau (Podosphaera xanthii), TSWV = Tomatenbronzefleckenvirus**



**03.516.9 Paprika Delirio F1**



**Bio-Paprika (von links nach rechts):**
**03.611.1 Olly F1, 03.614.2 Ilyn F1, 03.613.5 Elsa F1, 03.599.2 Waldo F1, 03.617.3 Lilo F1**



**03.584.8 Dulce Italiano Paprika Mattadores F1**



**Paprika- & Pfefferoni-Sortensichtung im Seewinkel**



**Paprika Theos F1, Gaon F1, Red Bull F1**



**03.500.8 Lamuyo Paprika Lake F1**



**03.624.1 Dulce Italiano Paprika Red Bull F1**



**03.580.0 Lamuyo Paprika Gaon F1**



**03.653.1 Lamuyo Paprika Theos F1**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# PAPRIKA Fortsetzung

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Form | Frucht Farbe | Ernte Farbe | Frucht Größe | Frucht Fleisch | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DULCE ITALIANO-TYPEN - für Frischmarkt** | | | | | | | | |
| 03.624.1 | **Red Bull $F_1$** NS Ⓚ O | sehr lang, spitz | dunkelgrün/ rot | rot | sehr groß | mittel | HR: Tm:0 | ca. 22–24 cm lange, 5–6 cm breite Früchte; ø Gewicht ca. 150 g; offener Wuchs |
| 03.584.8 | **Mattadores $F_1$** NS Ⓚ O | sehr lang, spitz | dunkelgrün/ rot | rot | sehr groß | mittel | HR: Tm:0-2 | 23–25 cm lange, 5–7 cm breite Früchte; für Glashaus, Tunnel und Freiland |
| 03.553.4 | **Giubileo $F_1$** PR Ⓚ O | sehr lang, spitz | dunkelgrün/ gelborange | gelb-orange | sehr groß | dick | | ca. 22–25 cm lange, 6–7 cm breite Früchte; starkwüchsig; für Aufleitung im Folientunnel |
| 03.657.9 | **Xaro** NS Ⓚ ● | lang, spitz | grün/rot | rot | groß | mittel | HR: Tm:0 | lange, schlanke, filigrane Pflanzen; hellrote, gerade Früchte (ø 100-120 g; Länge 18–22 cm); für Folientunnel und unter Glas |
| 03.649.4 | **Zazu** NS Ⓚ ● | lang, spitz | grün/gelb | gelb | groß | mittel | HR: Tm:0-2 | leicht verzweigte Pflanzen; relativ spät; etwas gerippte Früchte (ø 100-120 g; Länge 18–22 cm); für Folientunnel und unter Glas |
| 03.616.6 | **Kyra** NS Ⓚ ● | lang, spitz | grün/ orange | orange | groß | mittel | HR: Tm:0 | starke Pflanzen; lockerer, offener Wuchs; etwas gerippte Früchte (ø 100-120 g; Länge 20–22 cm); für Folientunnel und unter Glas |
| **LAMUYO-TYPEN - für Frischmarkt** | | | | | | | | |
| 03.580.0 | **Gaon $F_1$** PR Ⓚ O | 3-4 blockig | dunkelgrün/ rot | rot | sehr groß | mittel | HR: Tm:0 | ca. 18 cm lange und 10–12 cm breite Früchte; erreicht im Folienhaus Gewichte von 300 bis 350 g |
| 03.653.1 | **Theos $F_1$** PR Ⓚ O | 3-4 blockig | dunkelgrün/ gelb | gelb | sehr groß | mittel | HR: Tm:0 | ca. 18–20 cm lange und 12 cm breite Früchte; erreicht im Folienhaus Gewichte von 350 bis 400 g |
| 03.500.8 | **Lake $F_1$** NS Ⓚ O | 3-4 blockig | wachsgelb/ hellrot | wachs-gelb | sehr groß | dick | HR: Xcv:3 IR: TSWV:0 | ertragreiche Sorte für geschützten Anbau und Freiland; sehr guter Fruchtansatz auch unter heißen Anbaubedingungen |

**HR = Hohe Resistenz, IR = intermediäre (mittlere Resistenz), Tm = Tabakmosaikvirus, TSWV = Bronzefleckenvirus, Xcv = Xanthomonas campestris pv. vesicatoria**



**03.616.6 Dulce Italiano Paprika Kyra**



**03.649.4 Dulce Italiano Paprika Zazu**



**03.657.9 Dulce Italiano Paprika Xaro**



**03.553.4 Dulce Italiano Paprika Giubileo $F_1$**



**03.585.5 Paprika Mórahalom $F_1$**



**03.524.4 Paprika Antal $F_1$**



**03.529.9 Paprika Austrocapi**



**03.307.7 Paprika Zentus $F_1$**



**03.554.1 Paprika Kapitány $F_1$**



**03.517.6 Paprika Eszter $F_1$**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *HQS* = High Quality Seed *TP* = Topfpillen

# PAPRIKA Fortsetzung

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Form | Frucht Farbe/Abreife | Ernte Farbe | Frucht Größe | Frucht Fleisch | Verwendung | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HUNGARIAN WAX-TYPE** | | | | | | | | | |
| 03.585.5 | **Mórahalom $F_1$** NS Ⓚ | konisch, spitz | wachsgelb/ rot | gelb | groß | mittel-dick | Frischmarkt | HR: Tm:0 | großer, schwerer Hungarian Wax-Typ für Treibkultur; auch für Aufleitung |
| 03.524.4 | **Antal $F_1$** NS Ⓚ | konisch, spitz | wachsgelb/ rot | gelb | groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:3 IR: TSWV, Ma,Mi,Mj | für Freiland und ungeheizte Kultur; Fruchtgewicht 110–150 g |
| 03.307.7 | **Zentus $F_1$** *NEU* NS Ⓚ | konisch, spitz | wachsgelb/ rot | gelb | groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:2 IR: TSWV, Lt, CMV | Fruchtgewicht 140–170 g; Länge 16–18 cm; Fruchtdurchmesser 6,5–7 vm |
| 03.643.2 | **Amy** PR Ⓚ O | kegelförmig, spitz | wachsgelb/ hellrot | wachsgelb | mittel-groß | dick | Frischmarkt | | Hungarian Wax-Typ; Fruchtgewicht 100–120 g; Länge ca. 14 cm, Breite ca. 7 cm |
| **SONDERFORMEN** | | | | | | | | | |
| 03.529.9 | **Austrocapi** NS Ⓚ O, NS Ⓚ ● | konisch, spitz | grün/rot | rot | mittel-groß | mittel | Frischmarkt Industrie | | Freilandkultur, sehr hohe Ertragsleistung |
| 03.554.1 | **Kapitány $F_1$** NS Ⓚ O | konisch, spitz | grün/rot | grün oder rot | groß | dick | Frischmarkt | HR: Tm:2 IR: TSWV | flacher Capia Typ; meist zweikämmrig; sehr früh; stark gegen Mikrorisse; für Freiland und Folientunnel |
| 03.537.4 | **Paradeisfrüchtig Frührot** NS Ⓚ O | paradeis-förmig | grün/rot | rot | mittel | dick | Industrie | | Freilandkultur |
| 03.517.6 | **Eszter $F_1$** NS Ⓚ | apfelförmig | wachsgelb/ orange/rot | gelb, orange, rot | mittel-groß | dick | Frischmarkt | | sehr großer, **süßer Apfel-Paprika**; Kräftige Pflanzen mit starkem Wurzelsystem; für Freiland und Folientunnel |
| 03.544.2 | **Friggitello** NS Ⓚ O | konisch abgestumpft | dunkelgrün/ rot | grün oder rot | klein-mittel | mittel | Frischmarkt | | früher, ertragreicher **Bratpaprika**; mittelkräftige Pflanzen; Fruchtlänge ca. 6–7 cm, Breite 2,5 cm; Tunnel & Freiland |

**CMV = Cucumber mosaic virus, Lt = Pepper powdery mildew, Tm = Tabakmosaikvirus, TSWV = Bronzefleckenvirus, Ma/Mi/Mj = Nematoden (Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica); HR = Hohe Resistenz, IR = intermediäre (mittlere Resistenz)**



**Paprika Saatgutgewinnung im Seewinkel**



**03.537.4 Paprika Paradeisfrüchtig Frührot**



**03.643.2 Paprika Amy**



**03.544.2 Paprika Friggitello**

# PAPRIKA Fortsetzung

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Form | Frucht Farbe/Reife | Frucht Größe | Frucht Fleisch | Verwendung | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GRÜNE FREILANDSORTEN** - rot abreifend | | | | | | | |
| 03.538.1 | **WE 880** NS K O, NS K ● | meist 4 blockig | hell - mittel-grün/rot | mittel | mittel | Frischmarkt | für Freiland und geschützte Kultur; auch zum Füllen geeignet |
| 03.536.7 | **Neusiedler Ideal®** NS K O*, NS K ● | meist 4 blockig | hell - mittel-grün/rot | mittel | mittel | Frischmarkt | für Freiland und geschützte Kultur; auch zum Füllen geeignet; Fruchtgwicht ø 110 g |
| 03.549.7 | **Yolo Wonder** NS K O | 3-4 blockig | mittel - dkl. grün/rot | mittel | mittel | Frischmarkt | für Freiland und geschützte Kultur |
| **WACHSGELBE FREILANDSORTEN** - hellrot abreifend | | | | | | | |
| 03.533.6 | **Gelber Block** NS K O, NS K ● | 3-4 blockig | wachsgelb/ hellrot | mittel | mittel | Frischmarkt | für Freiland und geschützte Kultur; nur für Gelbpflücke |
| 03.543.5 | **Spartaco $F_1$** NS K O | 3-4 blockig | wachsgelb/ hellrot | mittel | dick | Frischmarkt | Fruchtgewicht 160–170 g; ausgewogene Pflanze; für Freiland und geschützte Kultur; nur für Gelbpflücke: Resistenzen: HR: Tm:0; IR: TSWV:0 |

*** = geprimt**



**03.538.1 Paprika WE 880**



**03.536.7 Paprika Neusiedler Ideal®**




**03.533.6 Paprika Gelber Block**



**03.543.5 Paprika Spartaco $F_1$**



**03.778.1 Paprika Sunakko Yuzu $F_1$**



**03.779.8 Paprika Sunakko Mikan $F_1$**



**03.777.4 Paprika Sunakko Ichigo F1**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *HQS* = High Quality Seed *TP* = Topfpillen

# PAPRIKA Fortsetzung

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Form | Frucht Farbe/Abreife | Ernte Farbe | Frucht Größe | Frucht Fleisch | Verwendung | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SNACKPAPRIKA - auch für Topfkultur** | | | | | | | | | |
| 03.545.9 | **Cuccino Gelb** NS K O | konisch abgestumpft | grün/ goldgelb | gelb | klein | mittel | Frischmarkt Industrie | | **Snackpaprika** mit ca. 30 g Gewicht; Fruchtlänge ca. 7 cm, Breite ca. 3,8 cm |
| 03.595.4 | **Cuccino Orange** NS K O, NS K ● | konisch abgestumpft | grün/ orange | orange | klein | mittel | Frischmarkt Industrie | | **Snackpaprika** mit ca. 30 g Gewicht; Fruchtlänge ca. 7 cm, Breite ca. 3,8 cm |
| 03.581.7 | **Hamík®** PR K O | konisch abgestumpft | dunkelgrün/ orange | orange | klein | mittel | Frischmarkt Industrie | | **Snackpaprika** mit ca. 33 g Gewicht; Fruchtlänge ca. 7,5 cm; Fruchtbreite ca. 3,7 cm |
| 03.638.8 | **Radja** NS K ● | konisch abgestumpft | grün/ gelb | gelb | klein | mittel-dick | Frischmarkt | HR: Tm:0 | früher, ertragreicher, gelber **Snackpaprika**; Fruchtgewicht 30 – 40 g; kräftige, kompakte Pflanze |
| 03.639.5 | **Flynn** NS K ● | konisch abgestumpft | grün/ orange | orange | klein | mittel-dick | Frischmarkt | HR: Tm:0, PVY:0 | früher, ertragreicher, oranger **Snackpaprika**; Fruchtgewicht 30 – 40 g; kräftige, kompakte Pflanze |
| 03.637.1 | **Arwen** NS K ● | konisch abgestumpft | grün/ rot | rot | klein | mittel-dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-2 | früher, ertragreicher, roter **Snackpaprika**; Fruchtgewicht 30 – 40 g; kräftige, relativ kompakte Pflanze |
| 03.778.1 | **Sunakko Yuzu $F_1$** *NEU* NS K O | konisch abgestumpft | grün/ gelb | gelb | mittel | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0, PVY:0 | **Snackpaprika** mit kurzen Internodien; offener Wuchs, leicht zu ernten; langes Erntefenster |
| 03.779.8 | **Sunakko Mikan $F_1$** *NEU* NS K O | konisch abgestumpft | grün/ orange | orange | mittel | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0 | **Snackpaprika** mit kurzen Internodien und kompakten Pflanzen; gleichmäßige, sehr gut haltbare Früchte |
| 03.777.4 | **Sunakko Ichigo $F_1$** *NEU* NS K O | konisch abgestumpft | grün/ rot | rot | mittel | dick | Frischmarkt | HR: Tm:0-2 | ertragreicher **Snackpaprika** mit gutem Fruchtansatz; wüchsig, starke Pflanze, offener Wuchs |
| **BLOCKPAPRIKA - speziell für die Topfkultur** | | | | | | | | | ***für Terrasse und Balkon*** |
| 03.627.2 | **Redskin $F_1$** NS K O | länglich blockig | mittelgrün/ rot | rot | mittel | mittel | Frischmarkt | | länglich blockige, mittelgroße Früchte |

**Tm = Tabakmosaikvirus, TSWV = Bronzefleckenvirus; HR = Hohe Resistenz, IR = intermediäre (mittlere Resistenz)**



**03.595.4 Paprika Cuccino Orange**



**03.545.9 Paprika Cuccino Gelb**



**03.581.7 Paprika Hamik®**



**03.638.8 Paprika Radja**



**03.637.1 Paprika Arwen**



**03.639.5 Paprika Flynn**



**03.691.3 Pfefferoni Griff F1**



**03.693.7 Pfefferoni Palóc F1**



**03.722.4 Pfefferoni Grisù F1**



**03.701.9 Pfefferoni Koh Tao F1**



**03.687.6 Pfefferoni Koh Chang**



**03.721.7 Pfefferoni Tuono F1**



**03.720.0 Pfefferoni Koral**



**03.719.4 Pfefferoni Orange Koral**



**03.660.9 Pfefferoni Apache F1**



**03.748.4 Pfeff. Sigaretta Biondo Lombardo**





**03.505.3 Pfefferoni Maya F1**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *HQS* = High Quality Seed *TP* = Topfpillen

# PFEFFERONI *Capsicum annuum L.* Kulturdaten siehe Paprika

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Form | Frucht Farbe/Abreife | Ernte Farbe | Frucht Größe | Frucht Fleisch | Schärfe-grad | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.667.8 | **Milder Spiral** NS K O, NS K O*, NS K ● * | sehr lang, spitz, spiralförmig | gelbgrün/rot | grün | groß | mittel | 1 | | für Industrie und Frischmarkt; ø Gewicht 20 g; Fruchtlänge ca. 18 cm, Breite ca. 1,7 cm |
| 03.669.2 | **Ziegenhorn Bello** NS K O, NS K ● | sehr lang, spitz | mittelgrün/rot | grün | groß | mittel - dick | 5 | | für Frischmarkt; ø Gewicht 35 g; Fruchtlänge ca. 17–22 cm, Breite ca. 2,3 cm |
| 03.693.7 | **Palóc F1** NS K | sehr lang, spitz | mittelgrün/rot | grün | groß | mittel - dick | 6 | | für Frischmarkt; ø Gewicht 60 g; Fruchtlänge ca. 17–20 cm, Breite ca. 3,5 cm |
| 03.691.3 | **Griff F1** NS K | sehr lang, spitz | mittelgrün/rot | grün | groß | mittel | 6 | HR: Tm:2 IR: TSWV; Ma,Mi,Mj | für Frischmarkt; ø Gewicht 90 g; Fruchtlänge ca. 18–24 cm, Breite ca. 4 cm |
| 03.661.6 | **De Cayenne** NS K O | lang, spitz | dunkelgrün/rot | rot | mittel - groß | dünn | 8 | | für Industrie und Frischmarkt; Fruchtlänge 10–12 cm |
| 03.687.6 | **Koh Chang** NS K ● | lang, spitz | mittelgrün/gelb | gelb | mittel | mittel | 6 | HR: Tm:0 | ø Gewicht 25 g, Fruchtlänge ca. 13 cm; niedrige Pflanzen; sehr frühe Reife |
| 03.701.9 | **Koh Tao F1** NS K ● | lang, spitz | mittelgrün/ orange | orange | mittel | dünn - mittel | 5 | HR: Tm:0-2 | ø Gewicht 25 g, Fruchtlänge ca. 14 cm; große, kräftige Pflanzen |
| 03.721.7 | **Tuono F1** *NEU* NS K O | lang, spitz | mittelgrün/ dunkelrot | rot | mittel | dünn | 6 | IR: Pc | wüchsiger Cheyenne-Typ mit hohem Ertrag; Länge 12–15 cm; für Folientunnel und Freiland |
| 03.722.4 | **Grisù F1** NS K O | hornförmig | dunkelgrün/rot | grün/ rot | mittel | mittel | 7 | HR: Tm:0-2 | 12–15 cm lange, ca. 3 cm breite Früchte; ø Gewicht 25–30 g; für Glashaus und Freiland |
| 03.663.0 | **Halblanger Vulkan** NS K O, NS K ● | mittellang, spitz | dunkelgrün/rot | rot | klein - mittel | mittel | 7 | | für Industrie und Frischmarkt; ø Gewicht 18 g; Fruchtlänge ca. 10 cm, Breite ca. 1,8 cm |
| 03.748.4 | **Sigaretta Biondo Lombardo** NS K O | zylindrisch, spitz | mittelgrün/rot | grün | klein | dünn | 1 | | aufrechte, gut verzweigte Pflanzen; ca. 10–12 cm lange Früchte |
| 03.720.0 | **Koral** PR K O | kirschförmig | dunkelgrün/rot | rot | klein | mittel | 8 | | Durchmesser ca. 2 cm; Gewicht 15–20 g; ca. 2 mm dickes Fleisch |
| 03.719.4 | **Orange Koral** PR K O | kirschförmig | dunkelgrün/ orange | orange | klein | mittel | 8 | | Durchmesser 2–2,5 cm; Gewicht 15–20 g; ca. 2 mm dickes Fleisch |
| | **PFEFFERONI - für die Topfkultur** | | | | | | | | ***für Terrasse und Balkon*** |
| 03.660.9 | **Apache F1** NS K O | kurz, schlank, spitz | dunkelgrün/rot | rot | klein | dünn | 9 | | kompakte Pflanzen, sehr reichtragend |
| 03.505.3 | **Maya F1** *NEU* NS K O | kurz, spitz | grün/rot | rot | klein | dünn | 4 | | buschige Pflanzen, die 5–6 cm langen Früchte wachsen in Büscheln; für Topf und Freiland |

*** = geprimt**

**Tm = Tabakmosaikvirus, TSWV = Bronzefleckenvirus, M = Nematoden; HR = Hohe Resistenz, IR = intermediäre (mittlere Resistenz)**



**03.669.2 Pfefferoni Ziegenhorn Bello**



**03.667.8 Pfefferoni Milder Spiral**



**03.663.0 Pfefferoni Halblanger Vulkan**



Pfefferoni 03.671.5 Chili-AS Gelb und 03.659.3 Chili-AS Rot



Chili-AS Saatgutvermehrung | Burgenland



03.664.7 Chili Damián



03.666.1 Chili Kristián



03.665.4 Chili Kilián



03.700.2 Chili Carolina Reaper



03.689.0 Chili Naga Morich



03.685.2 Chili Chilibell



03.673.9 Jalapeño Japo $F_1$



03.763.7 Chili Etna



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# CHILI & HABAÑERO & JALAPEÑO

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Frucht Form | Frucht Farbe/Abreife | Ernte Farbe | Frucht Größe | Frucht Fleisch | Schärfe-grad | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Chili** *Capsicum annuum* | | | | | | | | |
| 03.659.3 | **Chili-AS Rot** NS Ⓚ O*, NS Ⓚ ● | kurz-kegelförmig | dunkelgrün/ rot | rot | klein | dick | 6 | für Industrie und Frischmarkt; Länge ca. 6 cm, ø ca. 3 cm, Fruchtgewicht ca. 17 g |
| 03.671.5 | **Chili-AS Gelb** NS Ⓚ O | kurz-kegelförmig | gelb/ orangerot | gelb | klein | dick | 8 | für Industrie und Frischmarkt; Länge ca. 7 cm, ø ca. 3 cm, Fruchtgewicht ca. 20 g |
| 03.664.7 | **Damián** PR Ⓚ O | schlank, spitz | grün/rot | rot | klein | dünn | 8 | ca. 8 cm lange Früchte; stärkerer Wuchs; für Treibkultur und Freiland; **auch für Topfkultur** |
| 03.665.4 | **Kilián** PR Ⓚ O | schlank, spitz | grün/orange | orange | klein | dünn | 8 | ca. 8 cm lange Früchte; kompakter Wuchs; für Treibkultur und Freiland; **auch für Topfkultur** |
| 03.666.1 | **Kristián** PR Ⓚ O | schlank, spitz | grün/gelb | gelb | klein | dünn | 8 | ca. 8 cm lange Früchte; kompakter Wuchs; für Treibkultur und Freiland; **auch für Topfkultur** |
| **Chili** *Capsicum chinense bzw. Capsicum bacatum* | | | | | | | | |
| 03.685.2 | **Chilibell (Typ Pozvo)** NS Ⓚ O | glockenförmig | grün/rot | rot | klein | mittel | 7 | **Glockenchili**; starkwüchsig; etwas später abreifend; für geschützten Anbau und Freiland |
| 03.689.0 | **Naga Morich** NS Ⓚ O | kurz | hellgrün/ hellrot | hellrot | klein | dünn | 10+ | die Früchte sind 3–4 cm lang und 1–1,5 cm breit und unregelmäßig geformt |
| 03.700.2 | **Carolina Reaper** NS Ⓚ O | kurz, warzig-faltig | grün/rot | rot | klein | dünn | 10++ | **Achtung! schärfster Chili der Welt**; 3–4 cm breite, 6–8 cm lange Früchte mit charakteristischem Spitz; bis zu 2.200.000 SHU |
| **Chili - für die Topfkultur** *Capsicum annuum* | | | | | | | | ***für Terrasse und Balkon*** |
| 03.763.7 | **Etna** NS Ⓚ O | sehr kurz, schlank, spitz | dunkelgrün/ rot | rot | sehr klein | mittel | 6 | **Tabasco-Typ** mit kompakten Pflanzen und sehr vielen 3–4 cm langen, ca. 1 cm breiten Früchten; **HR**: Tm:0, **IR**: Ma, Mi, Mj |
| **Habañero *)** *Capsicum chinense* | | | | | | | | |
| 03.676.0 | **Habañero Orange** NS Ⓚ O | kurz | grün/orange | orange | klein | dünn | 10 | die Früchte sind 4–5 cm lang und 2–3 cm breit |
| 03.677.7 | **Habañero Red caribbean** NS Ⓚ O | kurz | grün/rot | rot | klein | dünn | 10 | die Früchte sind 4–5 cm lang und 2–3 cm breit |
| 03.678.4 | **Habañero Chocolate** NS Ⓚ O | kurz | grün/braun | braun | klein | dünn | 10 | die Früchte sind 4–5 cm lang und 2–3 cm breit |
| **Jalapeño** *Capsicum annuum* | | | | | | | | |
| 03.673.9 | **Japo $F_1$** NS Ⓚ O | kurz, schlank, zylindrisch | dunkelgrün/ rot | grün, rot | klein | mittel | 9 | die Früchte sind 7–8 cm lang und ca. 2,5 cm breit und schmecken auch im unreifen, grünen Zustand sehr gut |

*) Relativ kleine Jungpflanzen; bei mehr Licht und Wärme (bei den Wurzeln) setzt ein starkes, buschiges Pflanzenwachstum ein. Keimtemperatur 25°C einhalten!
*** = geprimt**

**HR** = hohe Resistenz; **IR** = intermediäre Resistenz, **TM** = Tabakmosaikvirus; **Ma** = Nematoden (Meloidogyne arenaria); **Mi** = Nematoden (Meloidogyne incognita); **Mj** =Nematoden (Meloidogyne javanica)

# Scoville-Schärfegrade

hip & hot

1912 entdeckte und veröffentlichte der Pharmazeut Wilbur Scoville eine Methode, um die Schärfe von Chili messen zu können. Aus diesem Grund entstand auch die Einteilung in Scoville-Graden auf der Scoville-Scala. Damals war der Test noch eine rein subjektive Geschmacksprüfung, bei der verschiedene Verdünnungen hergestellt und dann durch Testpersonen verkostet wurden. Heute wird mittels der Flüssigkeits-Hochdruck-Chromatographie (HPLC) der Gehalt der Capsaicinoide ermittelt.

| Schärfegrad | Scoville | Schärfegrad | Scoville |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 5.000–15.000 |
| 1 | 10–100 | 7 | 15.000–30.000 |
| 2 | 500–1.000 | 8 | 30.000–50.000 |
| 3 | 1.000–1.500 | 9 | 50.000–100.000 |
| 4 | 1.500–2.500 | 10 | 100.000–500.000 |
| 5 | 2.500–5.000 | 10+ | 500.000–15.000.000 |



**03.678.4 Habañero Chocolate**



**03.677.7 Habañero Red caribbean**



**03.676.0 Habañero Orange**



03.714.9 Pastinak Bielas



03.743.9 Pastinak Javelin $F_1$



03.712.5 Pastinak Palace $F_1$



03.784.2 Wurzelpetersilie Lange Oberlaaer



03.780.4 Wurzelpetersilie Efez



03.752.1 Wurzelpetersilie Jadran



03.758.3 Wurzelpetersilie Halflange / Comanche



03.796.5 Petersilie Einfache Schnitt 3



03.764.4 Petersilie Sioux



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *FP* = Freilandpillen

# PASTINAK *Pastinaca sativa L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro 1000 m² | Saat-termin | Reihenabst. in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5–4 g | siehe Sorten | März – Mai | 40–50, in der Reihe 10 cm | September – November | 300 kg |




03.712.5 **Palace F1** *KS* Ⓚ *geprimt* O, *FP*O
Mittelfrühe, wüchsige, breit-keilförmige, gut gefüllte Sorte für Schalenverpackung und Verarbeitung (auch für Trocknung). Ertragreiche Sorte mit stabilem Laub. Geeignet für mittellange Lagerung. Für Aussaaten von früh bis spät. Reifezeit ca. 140 Tage nach Aussaat. Saatgutbedarf 300.000–500.000 Korn/ha.

03.743.9 **Javelin F1** *NS* Ⓚ O
Die schlanken, keilförmigen, ca. 24 cm langen Wurzeln eignen sich sehr gut für abgepackte Ware. Für Ernten von September bis November.

03.714.9 **Bielas** (180 T) *NS* Ⓚ O
Mittelspäte Sorte; Wurzellänge ca. 20 - 25 cm, breitere Wurzel als Standard OP-Sorten; sehr glatte, weiße Wurzel; gute Gesundheit; hoher Ertrag; geeignet zur Überwinterung; ausgezeichnete Haltbarkeit. Saatgutbedarf 400.000–500.000 Korn/ha.



**03.799.6 Petersilie Afrodite**



**03.801.6 Petersilie Wega**

# PETERSILIE *Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex. A. W. Hill*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro 1000 m² | Saat-termin | Reihenabst. in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–1,5 g | Schnittsorten: ca. 1 kg<br>Wurzelsorten: 300–500 g | Ende Okt./Nov. bzw. Februar/März | 25–40 | Schnittsorten: ab Juli<br>Wurzelsorten: Sept.-Nov. | 200-250 kg<br>250-400 kg |




## Wurzelpetersilie

03.784.2 **Lange Oberlaaer** (180 T) *KS* 🖂 O
Petersilie mit sehr langen, feinen Wurzeln. Das für eine Wurzelpetersilie zarte Laub ist einer gröberen Schnittpetersilie sehr ähnlich. Ideal für Suppengrün und Verkauf im Bund.

03.752.1 **Jadran** (160 T) *NS* 🖂 O, *PR* Ⓚ O *geprimt*
Mittelfrühe Sorte mit einer Wurzellänge von 25–30 cm (auf Damm) und einer breiten Schulter. Gute Lagerfähigkeit und hohe Ertragsleistung.

03.758.3 **Halflange / Comanche** *PR* Ⓚ O *geprimt*
Typ Halblange. Glatte Rübe mit schöner Farbe und robustem grünem Laub. Für Frischmarkt und Industrie.

03.780.4 **Efez** *NS* 🖂 O, *PR* Ⓚ O *geprimt*
Mittelspäte Sorte mit hohem Ertrag; gute Haltbarkeit, tolerant gegen Echten Mehltau (PM Powdery Mildew), Rost und Fäule. Sehr breite Schulter, gegen Wurzelende hin sehr spitz zulaufend. Wurzellänge 20–22 cm. Geeignet für Bündelung und längere Lagerung.

## Schnittpetersilie

03.796.5 **Einfache Schnitt 3** *KS* 🖂 O
Dichtlaubig, dunkelgrün, aromatisch, glattblättrig.

03.797.2 **Gigante D'Italia** *KS* 🖂 O, *NS* 🖂 ●
Besonders ertragreiche Sorte. Großes, glattes Blatt. Standard im glattblättrigen Segment.

03.753.8 **Gigante d`Italia / Apache** *PR* 🖂 O *geprimt*
Ein Typ Gigante d'Italia mit sehr dunkelgrünen Blättern. Verbesserte Sorte mit größeren Blättern. Robuster Wuchs, hoher Ertrag.

03.764.4 **Amsterdamse Snij / Sioux** *PR* 🖂 O *geprimt*
Selektion mit einheitlichem, kräftigen Wuchs; verbesserte Blattgröße als vergleichbarer Standardtyp; sehr dunkelgrüne, dicke Blätter; hohes Ertragspotential, sehr gute Regeneration

03.799.6 **Afrodite** *NS* 🖂 O
Mittelfrühe, dunkelgrüne, sehr stark gekrauste Blattpetersilie mit sehr guter Standkraft. Für Treib- und Freilandkulturen. Besonders gute Eignung für Topfkultur.

03.801.6 **Wega** *PR* Ⓚ O *geprimt*
Ertragreicher, dunkelgrüner, schneller Mooskrause-Typ mit aufrechtem Wuchs und mittelfeiner Krause. Geeignet für Topfanbau, Frischmarkt und Industrie. Für ganzjährigen Anbau.

03.754.5 **Moss Curled 2 / Cherokee** *PR* 🖂 O *geprimt*
Dunkelgrüne Mooskrause-Typ mit einer schnellen Entwicklung und kompaktem Wuchs. Die Blätter sind bereits im jungen Stadium uniform gekraust. Ideal für den Ganzjahresanbau im Topf.



**03.819.1 Porree Impala $F_1$** (NOV2649)



**03.818.4 Porree Riga**



**Porreekultur**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# PORREE *Allium porrum L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro 1000 m² | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5–4 g | Bei Direktsaat: 250–300 g<br>Bei Pflanzung: ca. 150 g | Vlieskultur: Dezember | März | 42 x 12 | Juni-Juli | 200-250 kg |
| | | Sommerkultur: März | Mai | 50 x 15 | Juli-Aug. | 200-250 kg |
| | | Herbst- und Winterkultur: April | Juni | 50 x 15 | Okt.-März | 250-400 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Erntezeit | Schaft Länge *) | Schaft Dicke | Winter-härte | Laub | Resistenzen IR: | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Porree Hybriden** | | | | | | | | |
| 03.819.1 | **Impala $F_1$** Ⓢ (NOV2649) PR Ⓚ O*, TPO*, PR Ⓚ ●*, TP●* | Sommer - Herbst | mittel | mittel-dick | gering | dunkel-grün | | aufrechter Pflanzentyp; gesundes Laub, sehr uniform; sehr gute und hohe Putzleistung; für Frischmarkt und Industrie |
| **Porree samenfeste Sorten** | | | | | | | | |
| 03.817.7 | Blauwgroene Herfst/ **Gent** PR Ⓚ O, TPO*, PR Ⓚ ●, TP●* | Herbst - Anfang Winter | 25–30 | dick | gut | dunkel-grün | Ap/Pa | gesundes, aufrechtes Laub; lange Feldhaltbarkeit, keine Zwiebelbildung; gute Putzleistung; für Frischmarkt und Industrie |
| 03.818.4 | Blauwgroene Winter/ **Riga** PR Ⓚ O, TPO* | Spätherbst - Frühjahr | 20–25 | dick | sehr gut | dunkel-grün | Ap/Pa | sehr robust in der Überwinterung; aufrechtes, sehr dunkelgrünes Laub, sehr gesund; keine Zwiebelbildung |
| 03.815.3 | Blugaarse Reuzen/ **Sofia** PR Ⓚ O, TPO* | Sommer - Herbst | 45–55 | mittel | gering | mittel-grün | Ap/Pa | sehr wüchsig; sehr gute Putzbarkeit; hohes, sicheres Ertragspotential, für Frischmarkt und Industrie |

*** = geprimt** *) Die Schaftlänge ist abhängig von der Saatstärke bzw. von der Standweite.

Ⓢ **= zum Sortenschutz angemeldet - Versuchssaatgutgerelung**

Resistenzen: IR = intermediäre Resistenz:
Ap = Alternaria porri (Purpurfleckenkrankheit) | Pa = Puccinia allii (Porree-Rost)



**03.817.7 Porree Gent**



**03.815.3 Porree Sofia**

= Verkauf nach Gewicht Ⓚ = Verkauf nach Korn O = ungebeiztes Saatgut ● = Biosaatgut



03.994.5 Radies Tinto $F_1$



03.955.6 Radies Wiener Rotes Treib®



03.916.7 Radies Celesta $F_1$



03.957.0 Radies Rosetta $F_1$



03.989.1 Radies Riesen von Aspern®



03.970.0 Radies Vienna $F_1$



03.901.3 Radies Belsay $F_1$



03.988.4 Radies Rapid Red 2



Radieschen Saatgutvermehrung



03.996.9 Radies Ladenbeet (verb. Eiszapfen)



03.924.2 Radies Diablus $F_1$



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# RADIES, RADIESCHEN *Raphanus sativus L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro 1000 m² | Saat-termin | Reihenabst. in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 8–12 g | 1,5–2,5 kg bzw. 150.000–250.000 K. | Treibkultur: Oktober-Jänner | 10-12 | Jänner-April | 1.500 – 2.000 Bund |
| | | Freiland: Februar–Mitte September | 10-15 | Mai-Oktober | 1.250 Bund |




**Bei Kornverkauf: 100.000 Korn = ca. 1 kg (je nach Kalibrierung)**

ACHTUNG: Zu enger Stand und Lichtmangel führen zu frühzeitigem Schossen und schlechter Knollenbildung. Radies dürfen nicht zu tief gesät werden, da es sonst zu Missbildungen kommt. Richtige Saattiefe: 0,5–1 cm. Sorgfältige Saatbettvorbereitung ist Voraussetzung für gleichmäßigen Aufgang.
**Bei Anbau von Ende Oktober bis Ende November kann es aufgrund der langen Kulturdauer zu Problemen kommen.**

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Anbau | Reife 28-40 Tage nach Aufgang | Laub | Knollen Farbe | Knollen Größe | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Radies - mittelgroße bis große Knollen** (Durchmesser 3–5 cm) für Vermarktung als 6-er Bund. | | | | | | | |
| 03.957.0 | **Rosetta F1** PR Ⓚ, PR Ⓚ O | KW 7–13 KW 31–37 | früh | mittel | leuchtend rot | mittel | für Vlies- und Freilandkultur; mittel resistent gegen Falschen Mehltau |
| 03.988.4 | **Rapid Red 2** KS 🛍 O | KW 7–37 | früh | kurz - mittel | leuchtend rot | mittel | Sora-Typ, sehr feine Wurzel, für Vliesabdeckung und alle Freilandkulturen, auch für kalte Kulturen im Folientunnel |
| 03.995.2 | **Sora** NS 🛍 O | KW 7–37 | früh | mittel | leuchtend rot | mittel | für Vliesabdeckung und Freilandkultur |
| 03.955.6 | **Wiener Rotes Treib®** KS 🛍 O, KS 🛍 ● | KW 7–37 | früh-mittel | mittel | scharlach | groß | für Treib-, Vlies- und Freilandkultur; Widerstandsvermögen gegen Pelzigkeit |
| 03.989.1 | **Riesen von Aspern®** KS 🛍 O | KW 7–37 | mittel | kurz - mittel | karminrot | groß | für Vlies- und Freilandkultur; Widerstandsvermögen gegen Pelzigkeit |
| 03.916.7 | **Celesta F1** PR Ⓚ O | KW 7–37 | mittel | kurz | leuchtend rot | klein - mittel | platzfest bei kalten und nassen Bedingungen; pelzfest bei hohen Sommertemperaturen; hohe Widerstandskraft gegen Falschen Mehltau |
| 03.970.0 | **Vienna F1** PR Ⓚ O | KW 9–37 | mittel | kurz | leuchtend rot | groß | beste Qualität bis 5 cm Durchmesser; Aussaat unter Glas und Tunnel Februar – Anfang März und die gesamte Freilandsaison |
| 03.994.5 | **Tinto F1** KS Ⓚ | KW 12–38 | früh | mittel | leuchtend rot | mittel | gut gefärbtes, rundes Radieschen; stabiles Laub; leicht zu bündeln |
| 03.901.3 | **Belsay F1** PR Ⓚ, PR Ⓚ O | KW 18–34 | früh | mittel | leuchtend rot | mittel | Freilandsorte für späte Vliessätze und Sommeranbau; fein abgesetzte Wurzel, stabiles Laub; gutes Shelf Life, stark gegen Falschen Mehltau |
| **Radies - Sonderformen & Sonderfarben** | | | | | | | |
| 03.996.9 | **Ladenbeet** (verb. Eiszapfen) KS 🛍 O | KW 7–37 | mittel-spät | hoch | weiß | sehr lang | Freilandsorte; nicht zu spät ernten |
| 03.924.2 | **Diablus F1** (Typ French Breakfast) PR Ⓚ O | KW 7–13; KW 31–37 | mittel | mittel | rot mit 1/3 weiß | mittel-lang | Freilandsorte, auch für geschützten Anbau im Frühling und Frühherbst; widerstandsfähig gegen Pelzigkeit und Falschen Mehltau |
| 03.927.3 | **Horus** NS Ⓚ O | KW 7–30 | mittel | mittel - hoch | gelb | mittel | rundes, platzfestes Radieschen mit weißer Innenfarbe; für Tunnel und Freiland geeignet |
| 03.928.0 | **Bacchus F1** NS Ⓚ O | KW 7–30 | mittel | mittel - hoch | lila | mittel | knackiges, weißes Fruchtfleisch, aufrechtes, starkes Laub erleichtert die Ernte; feine Wurzel; langes Erntefenster |
| 03.929.7 | **Angelus** NS Ⓚ O | KW 7–30 | mittel | mittel - hoch | weiß | mittel | sehr uniforme, weiße Knolle mit intermediärer Resistenz gegen Falschen Mehtau; widerstandsfähig gegen Pelzigkeit |



**03.927.3 Radies Horus**



**03.929.7 Radies Angelus**



**03.928.0 Radies Bacchus F1**

🛍 = Verkauf nach Gewicht Ⓚ = Verkauf nach Korn O = ungebeiztes Saatgut ● = Biosaatgut

# RETTICH *Raphanus sativus L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1.000 m² | Saat-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–11 g<br>Japanischer Rettich:<br>8–18 g | 600–1.000 g | Treibkultur: Feb.-März<br>Vlieskultur: März<br>Freiland: Mai-Mitte Aug. | 25 x 20<br>30 x 20<br>30-40 x 20 | März-Juni<br>Juni-Juli<br>Juni-Nov. | 1.900 Stk.<br>1.500 Stk.<br>1.000-1.500 Stk. |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife in Tagen nach Aufgang | Aussaat | Knollen Farbe | Knollen Größe | Schoss-festigkeit | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.060.6 | **April Cross F₁** *NS* O | 60 | ab Mai | weiß | lang-sehr lang | mittel | früh zu kultivierender, langer Rettich |
| 04.020.0 | **Lindegger Sommer** *KS* O | 45 / 60 | Mai - Mitte August | weiß | mittel | sehr gut | Stückrettich, neigt nicht zum Pelzigwerden, würziger Geschmack; für Treibkultur Aussaat ab Februar (ca. 45 Reifetage) |
| 03.998.3 | **Minowase Summer Cross Nr. 3 F₁** *NS* O | 50 | ab Juni | weiß | sehr lang | mittel | Standardsorte für Frühherbst-Herbsternte |
| 04.112.2 | **Münchner Bier** *NS* O | 80 | Juni - Mitte August | weiß | kurz | sehr gut | weißer, wenig scharfer Rettich mit festem Fleisch; rübenförmig; kann gut mit Trockenheit umgehen |
| 04.122.1 | **Wiener Runder Kohlschwarzer** *KS* O, *KS* ● | 80 | Juli - Anf. August | schwarz | mittel | sehr gut | Herbsternte, sehr gut lagerfähig |
| 04.002.6 | **Misato Rose Flesh** *NS* O | 50–60 | ab Mitte Mai | weiß/grün innen pink | mittel | wenig | zartes Fruchtfleisch; uniforme runde Wurzeln mit bis zu 700 g; ab Tennisballgröße erntbar; für die Sommer- und Herbsternte |

**Zum Schutz Ihrer Rettich-Kulturen empfehlen wir Insektenschutznetze von *Glaesergrow*!**
**Unsere Mitarbeiter im Außendienst beraten Sie gerne.**



**04.020.0 Rettich Lindegger Sommer**



**04.122.1 Rettich Wiener Runder Kohlschwarzer**



**04.060.6 Rettich April Cross F₁**



**04.112.2 Rettich Münchner Bier**



**04.002.6 Rettich Misato Rose Flash**



**03.998.3 Rettich Minowase Summer Cross Nr. 3 F₁**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# RHABARBER *Rheum rhabarbarum*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1.000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25–35 g | 200–300 g Endbestand | März – Ende April | Oktober | 100 x 100 | Ende Mai – Juli | – |

Aussaat in vertiefte Reihen mit 25 cm Abstand. Spätere Pflanzen verziehen auf 10–15 cm, im Oktober an Ort und Stelle pflanzen.

04.156.6 **Victoria** *NS* O
Früh, raschwüchsig, rotstielig.





**04.156.6 Rhabarber Victoria**

# RÜBEN - **MAIRÜBEN (Navets)** *Brassica rapa L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf per ha | Saattermin | Reihenabst. in cm | Ernte-termin | Ertrag pro ha |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–4 g | Frühkultur: 0,5–1,0 kg Herbstkultur: 0,5–2,0 kg | (April–Mai) Mitte-Ende Juni für Herbsternte: Juli–August | 30–40 cm, in der Reihe 6–20 cm (je nach gewünschter Rübengröße) | je nach Sorte | ca. 30 t |




**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**



04.290.7 **Di Milano a colletto viola (Mailänderin)** (60 T) *NS* O
Rotköpfig, gelblich weiß mit roter Kappe, flachrund. Entwicklungszeit ca. 2 Monate.



04.292.1 **Royal Crown F1** *NS* O
Uniforme lila-weiße Hybride; halbrund, glattschalig und gute innere Qualität. Optimale Erntegröße mit ca. 10 cm Durchmesser und 300–400 g.



04.296.9 **Oasis F1** (60 T) *PR* K O
Für Frühjahrs- und Herbstanbau. Rübendurchmesser 10–12 cm. Reinweisse, runde Knollen von hoher Qualität auch bei größerem Durchmesser. Kräftiges, mittel- bis dunkelgrünes Laub. Widerstandsfähig gegen Virus.



04.291.4 **Tokyo Top F1** (35–40 T) *NS* O
Eine sehr schossfeste Hybride mit runden Rüben. Sie ist sehr anbausicher und eignet sich für alle Anbauperioden. Das Laub ist kräftig und kompakt. Die optimale Erntegröße liegt bei 5–7,5 cm. Tokyo Top F1 hat eine gute Innenqualität und einen süßen Geschmack.



**04.205.1 Rote Rübe Jolie $F_1$**



**04.182.5 Rote Rübe BE10317 $F_1$**



**04.209.9 Rote Rübe Aurora $F_1$**



**04.200.0 Rote Rübe Cardeal $F_1$**



**04.262.5 Rote Rübe RedVal $F_1$**



**04.180.1 Rote Rübe Kestrel $F_1$**



**04.193.1 Rote Rübe Boro $F_1$**



**04.181.8 Rote Rübe Red Hawk $F_1$**



**04.207.5 Rote Rübe Rodina $F_1$**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# ROTE RÜBEN *Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| **Normalsaatgut:** 1.000 Knäuel 10–13 g<br>**Präzisionssaatgut:** Kal. 3,0–3,5: ca. 10–12 g<br>Kal. 3,5–4,0: ca. 14–16 g<br>Kal. 4,0–4,5: ca. 18 g | ca. 28–58 Pfl./m² abhängig vom Reihenabstand und Ablage in der Reihe<br>***Normalsaatgut (NS)***: 4–10 kg/ha (abhängig von Reihenabstand und TKG)<br>***Präzisionssaatgut (PR)***: 280.000–580.000 K/ha | Frühkultur: März - Mitte April | 25–50 | Juni-Juli | 200-250 kg |
| | | Normalkultur: Mitte April - Mitte Juni | 25–50 | Sept.-Okt. | 400-500 kg |
| | | Spätkultur: Mitte Juni - Mitte/Ende Juli | 25–50 | Okt.-Nov. | 350-450 kg |




**Achtung: Bei zu früher Aussaat Gefahr des Schossens!**

**Saatabstand in der Reihe, abhängig von der gewünschten Rübengröße:**
**Knäuelsaatgut: 7–15 cm, Präzisionssaatgut: 7–12 cm. Bei normaler Kultur wird auf 7–8 cm in der Reihe abgelegt.**

**Für Produktion von Baby-Rote Rübe: Aussaatstärke 1,5 bis 2 Mio. Korn/ha bzw. 18–25 kg/ha. Ablage ca. 12 x 4 cm, vorzugsweise Beetkultur.**

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reife 100-150 Tage nach Aufgang | Laub | Rübe Form | Rübe Fleisch | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.181.8 | **Red Hawk F$_1$** *NS* Ⓚ O | früh | stark | rund | dunkelrot | einheitliche Rüben, hoher Zuckergehalt, für „Mini-Beets“ geeignet; Frischmarkt und Industrie, für maschinelle Ernte geeignet; für Bio-Anbau zu empfehlen |
| 04.182.5 | **BE10317 F$_1$** *PR* Ⓚ O | früh | mittel - stark | rund | dunkelrot | wüchsig und gute Schossfestigkeit; aufrechter Wuchs mit einheitlichen Rüben und feiner Wurzel, auch für „Mini-Beets“ geeignet, hoher Betanin Gehalt |
| 04.209.9 | **Aurora F$_1$** *NEU* *NS* Ⓚ O | früh | mittel - stark | rund | dunkelrot | mittelschneller Wuchs; auch für Lagerung gut geeignet; Brix: 10-14°; rhizomaniatolerant |
| 04.200.0 | **Cardeal F$_1$** *PR* Ⓚ O | mittel | mittel | rund | dunkelrot | aufrechte Blätter; hoher Zuckergehalt, besonders zur Herstellung von „Mini Beets“ und zur Safterzeugung geeignet; gute Lagereignung |
| 04.193.1 | **Boro F$_1$** *PR* Ⓚ ● | mittel | mittel - stark | rund | dunkelrot | für Aussaaten von April bis Juni; sehr glatte, runde Rüben mit intensiver Innenfarbe; gute Cercospora-Toleranz; gute Lagereignung |
| 04.205.1 | **Jolie F$_1$** *NS* Ⓚ, *NS* Ⓚ O | mittel | mittel - stark | rund | dunkelrot | Brix 11-13°; Trockensubstanz: 13 %, hoher Betain-Gehalt, für Frischmarkt und Lagerung, gute Lagerfähigkeit; nicht für den Spätsommer Anbau geeignet |
| 04.262.5 | **RedVal F$_1$** *NEU* *PR* Ⓚ O | mittel | mittel - stark | rund | dunkelrot | hoher Zuckergehalt; tiefrote Innenfarbe; halbaufrechter Blattwuchs; feine Wurzel; Anbau von Anfang April bis Ende Juni; Resitenz: IR: Rhizomania |
| 04.180.1 | **Kestrel F$_1$** *PR* Ⓚ O | mittel-spät | stark | rund | dunkelrot | einheitliche Rüben mit feiner Krone und feiner Wurzel; aufrechtes, gesundes Laub; hoher Zuckergehalt und gute Lagerfähigkeit; für „Mini-Beets“ geeignet |
| 04.207.5 | **Rodina F$_1$** *NS* Ⓚ O | mittel | stark | zylindrisch | dunkelrot | Zylindrische Rote Rübe, wüchsig und ertragreich; sehr gute Industriesorte, gut zum Schneiden geeignet; gute Lagerfähigkeit |
| | **Sonderfarben** | | | | | |
| 04.189.4 | **Avalanche** *PR* Ⓚ O | mittel | mittel | rund | weiß | weiß durchgefärbte, runde Rübe für Aussaat Mai–Juni, Saatgutbedarf: 0,5–0,8 Mio. Korn/ha |
| 04.201.3 | **Golden eye F$_1$** *NS* Ⓚ O | mittel | mittel | hochrund | goldgelb | gleichmäßige, glatte Knollen mit leuchtender Innenfärbung; hellgrünes Laub; mild-süßer Geschmack; Spezialität für Frischmarkt und Hobbymarkt |
| 04.198.6 | **Chioggia** *NS* Ⓚ O | mittel - spät | mittel - stark | rund | rot-weiß geringelt | “Ringelrübe” mit sehr gutem Geschmack und sehr gleichmäßigen Knollen; ideal für Frischmarkt und Direktvermarktung |



**04.189.4 Rote Rübe Avalanche**



**04.201.3 Rote Rübe Golden eye F$_1$**



**04.198.6 Rote Rübe Chioggia**

# FELDSALAT (Rapunzel, Vogerlsalat, Nüsslisalat) *Valerianella locusta (L.) Laterr.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1.000 m² | Saat-termin | Pflanz-termin | Reihenabst. in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | ca. 1 Mio. K. | siehe unten | – | 8–10<br>100 Würfel/m² | Sept. – April | 100 – 200 kg |




**Aussaat: Freiland: Juli – Mitte September, Glas- od. Folienhaus: Ende September – Februar. Kulturdauer ca. 50 Tage.**



03.880.1 **Clara** (NOV 2398) *PR* Ⓚ, *PR* Ⓚ ●
Schnellwüchsige, dunkelgrüne Selektion. Dickblättriger, aufrechter Typ mit sehr hohem Ertragspotential und weitem Erntefenster. Ideal für den Anbau im Herbst und im Frühjahr. Sehr gute Haltbarkeit, stabil in der Verarbeitung und Verpackung.



03.882.5 **Melissa** *PR* Ⓚ, *PR* Ⓚ O
Dunkelgrüne, aufrecht wachsende Selektion. Wüchsiger, dickblättriger Typ. Sehr hohes Ertragspotential, weites Erntefenster. Unempfindlich gegenüber Verbrennungen. Ideal für den Anbau von Frühjahr bis Herbst im Freiland und im geschützten Anbau.



03.899.3 **Vit** *NS* ●
Eine Sorte mit runden, kurzstieligen und dunklen Blättern in Rosetten für Spätherbst und Winter (frostbeständig). Widerstandsfähig gegen Falschen Mehltau. Aussaat im Gewächshaus September-Oktober; Aussaat im Freiland Mitte Juli bis Mitte September (Freiland-Aussaat im Oktober ist zu spät). Ernte ab Mitte September bis März.



03.877.1 **Cirilla** *PR* Ⓚ O
Freilandsorte für Frühjahr, Herbst und Winter, entwickelt eine kompakte Pflanze, mit dunkelgrünem Blatt, stabilen Rosetten und kurzen Blattstielen. Ist auch für den Gewächshausanbau im Winter geeignet. Hoher Gesamtertrag (kg/m²)



03.874.0 **Vitabel** *NEU* *PR* Ⓚ O
Halbaufrechter Wuchs; leuchtend grüne, geaderte Blätter; gutes Shelf-life. Für Ende Sommer-, Herbst- und Winteranbau.

# ASIA-BLATTGEMÜSE



**06.806.8 Mustard Giant rot (geadert)**



**06.811.2 Mustard Giant gefranst rot**



**06.800.6 Mizuna grün**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# ASIA-BLATTGEMÜSE

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**

## Asia-Salate

Aussaattermin:
Freiland: Mitte März (Vlies) bis Anfang Sept.
Gewächshaus: Anfang September bis März
Schossgefahr bei Hitze im Sommer!

Direktsaat: 8–15 cm x 2,5–3 cm
oder 25–30 Samen/12 cm-Topf

Saatgutbedarf: 100–170 g/100 m²

Keimdauer: 5–8 Tage; Kulturdauer: 3–3,5 Wochen

Einmalernte oder Mehrfachernte (bei Schnitt oberhalb des Vegetationspunktes).

### Mizuna (Japanischer Senfkohl)

*(Brassica campestris var. japonica)*

06.800.6 **Mizuna grün** NS O
06.801.3 **Mizuna rot (geadert)** NS O
06.829.7 **Mizuna Mix** ***NEU*** NS O

### Mustard (Blattsenf) *(Brassica juncea)*

06.805.1 **Giant grün** NS O
06.806.8 **Giant rot** NS O
grüne Blätter mit roter Aderung
06.810.5 **Giant gewellt grün** NS O
06.811.2 **Giant gefranst rot** NS O
06.828.0 **Blattsenf Mix** ***NEU*** NS O

### Spargelsalat *(Lactuca sativa var. angustana)*

Aussaat: Februar/März. Saat nur leicht mit Erde bedecken. Keimung: 10 – 18 ° C, 5 – 8 Tage. Kultur: Nach Entwicklung der Keimblätter in Töpfchen pikieren und nach ca. 6 Wochen ins Freiland pflanzen. Standortansprüche: Humoser, lockerer Boden. Pflanzabstand: mindestens 30 x 30 cm. Regelmäßig jäten und Konkurrenz vermeiden, damit sich ein kräftiger Stängel bildet. Ernte: Juli - Oktober

06.814.3 **Chinesische Keule** NS ●

Der Chinesische Spargelsalat ist ein besonderes Salat-Erlebnis. Den eigentlichen Ertrag bildet der fleischige Stängel. Er wird vor der Knospenbildung geerntet, geschält und roh oder gekocht wie Spargel oder Kohlrabi zubereitet. Die Pflanzen benötigen ausreichend Platz und Pflege, damit sich kräftige „Spargel" bilden. Während des nur kurzen Rosettenstadiums können die äußeren Blätter wie Pflücksalat geerntet werden.

**Baby-Leaf Salate siehe Seite 98**



**06.814.3 Spargelsalat Chinesische Keule**

## Pak-Choi *(Brassica campestris var. chinensis)*

Aussaattermin:
Freiland: Mitte März (Schossgefahr) bis Anfang August
Gewächshaus: Anfang Februar bis Anfang März bzw. Ende August bis Anfang September
Über 12 Stunden Licht (Langtag), hohe Temperaturen, Wasser- und Nährstoffmangel (sowie Direktsaat) fördern die Schossgefahr. Optimalster Pflanzzeitpunkt ab Anfang Juli.

Saattiefe: ca 2 cm

Pflanzenanzahl: ca 10–25/m², je nach angestrebtem Erntegewicht, Standweite bis 25 x 25 cm

Standort: nicht zu trocken und nicht zu feucht; humoser, kohlhernie freier Boden mit pH 7.

02.950.2 **Mei Qing Choi F1** NS K O
Shanghai-Typ mit hell bis mittelgrünen Blättern und hellgrünen Stängeln. Mei Qing Choi F1 bildet uniforme, kompaktere Köpfe und kann bei einem Kopfgewicht von 100–150 g oder bei 200–400 g geerntet werden. Geeignet für den Anbau von April bis Herbst. Die Entwicklungszeit beträgt je nach Anbautermin 4–10 Wochen.

02.961.8 **You Qing Choi F1** NS K O
Kohlhernieresistente (IR) Neuzüchtung im Shanghai-Typ. Sehr uniform und sehr stark gegen Innenbrand. Ansprechende, dunkelgrüne Blattfarbe. Echter Mini-Pak Choi, der aufgrund seines langen Erntefensters auch bis zu einem Gewicht von 300–500 g erntbar ist.



**02.950.2 Pak-Choi Mei Qing Choi F1**



**02.961.8 Pak-Choi You Qing Choi F1**



**02.964.9 Mini-Pak-Choi Shun Li Choi F1**

02.964.9 **Shun Li Choi F1** NS K O
**Minityp** für hohen Ertrag. Grüner Stiel mit etwas grünerem Laub. Schnell reifend; für Dichtpflanzungen empfohlen.

02.962.5 **Yang Qing Choi F1** NS K O
Eine verbesserte, grünstielige Sorte, kleinwüchsig mit dunkelgrünen Blättern und hervorragender Feldhaltbarkeit. Die Pflanze wächst aufrecht und kompakt. Bemerkenswert ist die hervorragende Schossfestigkeit im Frühanbau. Diese Sorte kann in gemäßigtem Klima während der ganzen Anbausaison gepflanzt werden.

02.963.2 **Joi Choi F1** NS K O
Erste Pak Choi Hybride mit weißem Stiel. Sehr schossfest, für den Anbau unter Glas und im Freiland geeignet. Die dunkelgrünen Blätter stehen in attraktivem Kontrast zu seinen weißen Blattrippen. Ab 250 g erntbar, kann aber auch bedeutend größer kultiviert werden. Sehr unempfindlich, für den ganzjährigen Anbau geeignet.



**02.963.2 Pak-Choi Joi Choi F1**



**02.962.5 Pak-Choi Yang Qing Choi F1**

# RUCOLA (Rauke) *Eruca sativa & Diplotaxis tenuifolia*



04.309.6 **Rucola coltivata** *(Eruca sativa)*
**Vesuvio** *NS* O

Dieser sehr stark gefiederte coltivata Typ kommt von der Laubform schon sehr nahe an Rucola selvatica. Durch den halbaufrechten Wuchs wird der Schnitt erleichtert und die Blätter verschmutzen nicht so leicht. Vesuvio ist sowohl für die Treib- wie auch die Freilandkultur geeignet. Die mittelgrünen Blätter haben einen sehr intensiven Geschmack. TKG ca. 2 g.



04.311.9 **Rucola selvatica** *(Diplotaxis tenuifolia)* *NS* O, *NS* ●, *TP-MP*)*

Verwendung wie Coltivata. Blatt ist gezahnt und die Pflanze ist weniger raschwüchsig. Widerstandsfähig gegen Weißrost. TKG = ca. 0,25 g.
*) TP-Multipill (12–15 Korn/Pille). Pillengröße 3,75–4,5 mm.



04.300.3 **Rucola selvatica** *(Diplotaxis ten.)*
**Red Scorpion** *NS* O

Die purpurfarbene Aderung bringt Farbe ins Rucola Sortiment und ist ein Blickfang. Red Scorpion hat einen würzigen Geschmack und ist sowohl für Treibkultur als auch fürs Freiland geeignet. TKG ca. 0,25 g.



04.301.0 **Rucola Wasabi** *NS* O
*(Diplotaxis erucoides)*

Verwendung wie Coltivata. Rucola mit markant scharfem Wasabi-Geschmack. Optimal für asiatische Gerichte geeignet.



04.310.2 **Rucola coltivata** *(Eruca sativa)* *NS* O, *NS* ●

Geeignet für Treib- und Freilandkultur. Aussaat im Freiland ab März, unter Glas und Folie bei Frostfreihaltung ganzjährig möglich.
Saatgutbedarf: 30–50 g pro 100 m². TKG = ca. 2 g.

# SALATE

## Kopfsalat | Eissalat | Batavia | Bunte Salate | Romanasalat





**04.774.2 Treibsalat Grazer Eishäuptel**



**04.328.7 Treibsalat Rivalda**



**04.426.0 Treibsalat Grazer Krauthäuptel 2 Treibstamm**



**04.329.4 Treibsalat Fakto**



**04.422.2 Treibsalat Eichblatt grün Jezero**



**04.732.2 Treibsalat Lollo Bionda Jokary**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# TREIBSALATE *Lactuca sativa*

Diese Salatklasse ist vor allem für die Winterkultur im Block bestimmt. Die einzelnen Sorten sind für bestimmte Anbautermine und Temperaturverhältnisse gezüchtet, weshalb die angegebenen Kulturhinweise möglichst genau eingehalten werden sollen.

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1.000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm *) | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | 1,5 g bzw. 1.200 TP | Frühjahr: 25.10.–15.2. | 15.12.–15.3. | 25 x 25 | 15.3.–1.5. | 1.500 Stk. |
| | | Herbst: 15.8.–15.9. | 10.9.–15.10. | 25 x 25 | 20.10.–15.12. | 1.500 Stk. |
| | | Winter: 15.9.–25.10. | 15.10.–15.12. | 25 x 25 | 30.1.–15.3. | 1.500 Stk. |




*) Eissalate auf 27 x 27 cm bis 30 x 30 cm pflanzen

## TEMPERATURABHÄNGIGKEIT DER KEIMUNG BEI SALATEN

Bei Salaten kommt es im Sommer immer wieder zu Misserfolgen bei der Keimung. Bei **Bodentemperaturen** über 20° C sinkt die Keimfähigkeit bereits stark ab und beträgt **bei 25° C** – je nach Sorte – oft nur mehr **50 % oder sogar noch weniger.** Bei Bodentemperaturen über ca. 30° C sind Salatsamen nicht keimfähig.

**Für die Praxis ergibt sich daher folgende Tatsache:** Bei Anbau von Salat im Hochsommer ist die Erde möglichst kühl zu halten und es muss bis zur Keimung viel gegossen werden. Ein einmaliges Austrocknen bei hohen Temperaturen kann schon die Ursache für einen Misserfolg sein.

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Pflanzung | Kopf Farbe | Resistenz | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kopfsalate** | | | | | |
| 04.328.7 | **Rivalda** TPO | KW 1–5, KW 39–52 | hellgrün | **HR:** Bl 29-37, 39, 40 | großer Salat für Kaltanbau im Tunnel; im Gewächshaus 12–14 Pfl./m²; langsame Füllung, stark gegen Schossen und Innenbrand |
| 04.329.4 | **Fakto** TPO | KW 1–8 | hellgrün | **HR:** Bl 29-36, 38-40 | großer Salat für kalten Anbau im Frühjahr; robust; gute Kopfbildung und Füllung, langes Erntefenster; stark gegen Randen |
| **Bataviasalate** | | | | | |
| 04.774.2 | **Grazer Eishäuptel** TPO | KW 36–38 KW 5–13 | gelbgrün-rot gezeichnet | | Typ Grazer Krauthäuptel 2; mehltautolerant; kalte Kultur |
| 04.426.0 | **Grazer Krauthäuptel 2 (Treibstamm)** TPO | KW 36–38 KW 5–13 | gelbgrün-rot gezeichnet | | Österreichische Lokalsorte; mehltautolerant; kalte Kultur |
| **Lollo Bionda** | | | | | |
| 04.732.2 | **Jokary** TPO | KW 42–6 | mittelgrün | **HR:** Bl 29-36, 38-40 | kompakte Treibsorte mit feiner Krause; griffig und leicht zu ernten, für Trio Mix im Winter, 16 Pfl/m² |
| **Lollo Rossa** | | | | | |
| 04.298.3 | **Senso** TPO | KW 42–6 | intensiv rot | **HR:** Bl 29-40; Nr:0<br>**IR:** Fol:4 | Treibsalat für Gewächshaus und Tunnel; bei kaltem Anbau etwas kompakterer Kopf; schöne regelmäßige Form; 16 Pfl./m² |
| **Eichblattsalat grün** | | | | | |
| 04.422.2 | **Jezero** TPO | KW 37–40 KW 1–7 | mittelgrün | **HR:** Bl 29-40; Nr:0<br>**IR:** Fol:4 | kompakter bis mittelgroßer Eichblatt mit flachem, rundem Aufbau; stark aufrechte Unterseite; für Tunnel- und Glashausanbau. |
| **Eichblattsalat rot** | | | | | |
| 04.421.5 | **Boucan** TPO | KW 37–7 | rot | **HR:** Bl 29-40; Nr:0 | großer, flach aufgebauter Eichblatt mit schöner, roter Farbe und gesunder, starker Unterseite; geeignet für Tunnel- und Glashausanbau. 14-17 Pfl./m² |
| 04.423.9 | **Mondrian** *NEU* TPO | KW 9–35 | rot | **HR:** Bl 29-39; Nr:0 | kompakter flach aufgebauter Salat mit gesunder, starker Unterseite und glänzend roter Farbe; für Tunnel- und Glashausanbeu |

**Über die Verfügbarkeit von Kleinpackungen (1.000 TP) informieren Sie gerne unsere Außendienstmitarbeiter.**

**HR** = hohe Resistenz; **IR** = intermediäre (mittlere) Resistenz;
**Bl** = Bremia lactucae; **TBSV** = Tomato bushy stunt virus; **Pb** = Wurzellaus (Pemphigus bursarius); **Nr:0** = Grüne Salatlaus oder Große Johannisbeerlaus (Nasonovia ribisnigri)



**04.421.5 Treibsalat Eichblatt rot Boucan**



**04.423.9 Treibsalat Eichblatt rot Mondrian**



**04.298.3 Treibsalat Lollo Rossa Senso**



**04.450.5 Kopfsalat Analena**



**04.429.1 Kopfsalat Valea**



**04.760.5 Vliessalat Pia**



**04.776.6 Kopfsalat Anandra**



**04.428.4 Kopfsalat Dicata**



**04.877.0 Wintersalat Neusiedler Gelber Winter**



**04.655.4 Salat Jerrican**



**04.630.1 Salat Admiral**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# FREILANDKOPFSALAT *Lactuca sativa*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1.000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1g | 1,5 g bzw. 1.200 TP<br>(75.000–80.000 Pflanzen/ha) | Frühjahr: Jän.-Feb.<br>Frühsommer: März-April<br>Sommer: April-Juni<br>Herbst: Juli | ca. 1 Monat danach | 30 x 25<br>30 x 25<br>30 x 25–30<br>30 x 25–30 | Mai<br>Juni – A. Juli<br>Juni – August<br>Ende Aug. – Anf. Okt. | 1.250 Stk.<br>1.250 Stk.<br>1.000 – 1.250 Stk.<br>1.000 – 1.250 Stk. |




**Es kann witterungsbedingt (z. B. Ende Juli/Anfang August) bei allen Sorten zu lockerer Kopfbildung bzw. bei extremen Bedingungen zum Durchschießen kommen.**

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Pflanzung | Kopf Größe | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.450.5 | **Analena** TPO | KW 9–16, KW 31–34 | groß - sehr groß | **HR:** Bl 29-35,37,38,40; Nr:0; Pb; **IR:** LMV:1 | frischgrüner Kopf; widerstandsfähig gegen Innenbrand; für den Anbau im Frühjahr (**auch unter Vlies**) und Herbst |
| 04.429.1 | **Valea** TPO | KW 9–16, KW 31–34 | groß | **HR:** Bl 29-40; Nr:0 **IR:** LMV:1 | flacher Aufbau; gute Kopfbildung; flacher Aufbau; gute Feldhaltbarkeit, stark gegen Innenbrand und Schossen; **auch für Vlies-Kultur** |
| 04.776.6 | **Anandra** TPO | KW 12–34 | sehr groß | **HR:** Bl 29-35,37,38,40; Nr:0; **IR:** LMV:1 | langsame, lockere Füllung; glänzend grün; kurzer Strunk; üppiges Umblatt; schwere Köpfe; unempfindlich gegen Innenrand; **auch für Vlies-Kultur** |
| 04.428.4 | **Dicata** TPO, TP● | KW 14–34 | groß | **HR:** Bl 29-40; Nr:0 **IR:** LMV:1 | sichere, schnelle Kopfbildung und Füllung; stark gegen Innenrand, hohe Schossfestigkeit; starke Bremiagenetik |
| 04.330 0 | **Analotta** TPO, TP● | KW 14–34 | groß | **HR:** Bl 29-40; Nr:0 **IR:** LMV:1 | Anbau Ende März bis zum frühen Herbst; glänzend grün; mittelschneller Kopfschluss; gute Feldhaltbarkeit; hohe Schoss- und Innenrandtoleranz, |
| 04.655.4 | **Jerrican** TPO | KW 11–35 | mittel - groß | **HR:** Bl 29-37,40; Nr:0 **IR:** LMV:1 | kräftig roter Salat mit flacher, geschlossener Unterseite, leicht zu ernten; frühe Kopfbildung mit guter Füllung; Pflanzung Mitte März bis Ende August |
| 04.430.7 | **Sinisa** TPO, TP● | KW 12–34 | groß | **HR:** Bl 29-40; Nr:0 **IR:** LMV:1 | **roter Kopfsalat** mit gutem, aber spätem Kopfschluss; flache Unterseite, gut zu ernten; stark gegen Innenrand |



**04.330.0 Kopfsalat Analotta**



**04.430.7 Kopfsalat Sinisa**

## Sorten für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

04.630.1 **Admiral:** NS O, NS ●
Bewährte Sorte für Frühjahr bis Herbst.

04.728.5 **Kagraner Sommer:** NS ●
Sommersorte speziell für wärmere Regionen.

04.760.5 **Pia:** NS O, TP O
Für kalte Kultur im Folienhaus und Freilandkultur unter Vlies. Pflanzung KW 4–10.
Resistenz: HR: Pb.

### WINTERKOPFSALAT

**Aussaat Mitte September, Pflanzung Mitte Oktober, Ernte Mai**
**Für Vliesabdeckung im Frühjahr nicht geeignet.**

04.877.0 **Neusiedler Gelber Winter:** NS O, NS ●
Zarter, hellgrüner, winterharter Salat für Maiernte.

04.890.9 **Winterkönig:** NS O
Grüner, winterharter Salat mit leichtem rötlichen Anflug.

**Über die Verfügbarkeit von Kleinpackungen (1.000 TP) informieren Sie gerne unsere Außendienstmitarbeiter.**

**HR** = hohe Resistenz; **IR** = intermediäre (mittlere) Resistenz; **Bl** = Bremia lactucae; **LMV:1** = Salatmosaikvirus;
**Pb** = Wurzellaus (Pemphigus bursarius); **Me** = Macrosiphum euphorbiae; **Nr:0** = Grüne Salatlaus oder Große Johannisbeerlaus (Nasonovia ribisnigri)



**04.304.1 Bataviasalat Mareika**



**04.507.6 Eissalat Glassica**



**04.638.7 Eissalat Eduardo**



**04.669.1 Bataviasalat Eole**



**04.378.2 Eissalat Danilo**



**04.414.7 Bataviasalat Ozeka**



**04.752.0 Bataviasalat Marcord**



**04.979.1 Bataviasalat Mineral**



**04.447.5 Bataviasalat Redial**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# FREILANDEISSALATE und BATAVIEN *Lactuca sativa*

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Pflanzung | Kopf Größe | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Eisssalate** | | | | | |
| 04.638.7 | **Eduardo** *TPO, TP●* | KW 14–32 | mittel | **HR:** Bl 29-40; Nr:0<br>**IR:** LMV:1 | runder bis flachrunder Kopf; stark gegen Innenrand; für Salatverarbeitung; auch für Anbau unter Kulturschutznetzen und unter Vlies (letzter Satz) |
| 04.507.6 | **Glassica** *TPO* | KW 15–31 | groß | **HR:** Bl 29-39; Nr:0<br>**IR:** LMV:1 | mittelgrün; gut geschlossene Unterseite; mittelfester, gleichmäßig runder Kopf; stark gegen Innenbrand und Schossen; hohe Ernteausbeute |
| 04.378.2 | **Danilo** *TPO, TP●* | KW 18–30 | mittel - groß | **HR:** Bl 29-39; Nr:0 | stark gegen Innenbrand und Schossen; langsame, gleichmäßige Füllung; flache Rippen; gute Feldhaltbarkeit; für Frischmarkt und Verarbeitung |
| **Bataviasalate** | | | | | |
| 04.304.1 | **Mareika** *TPO, TP●* | KW 8–34 | mittel | | leuchtend grüner Batavia mit rotem Blattrand; **mit Kopfbildung**; schnelle Entwicklung; hohe Innenbrandtoleranz; anbausicher im heißen Sommer |
| 04.752.0 | **Marcord** *TP●* | KW 10–32 | mittel - groß | **HR:** Bl 32 | hellgrüne Blattbatavie **mit Kopfbildung**; stark gegen Innenbrand; für Ganzjahreskultur im Freiland; auch für kalte Folienkultur im Frühjahr und Herbst |
| 04.669.1 | **Eole** *TPO* | KW 10–35 | mittel - groß | **IR:** Bl 31; LMV:1 | relativ dickes, gewelltes Blatt; **sehr gute Kopfbildung**, schöne, breite Unterseite; stark gegen Randen; hell- bis mittelgrün |
| 04.774.2 | **Grazer Eishäuptel** *TPO* | KW 11–36 | groß | | mehltautolerant; Typ Grazer Krauthäuptel 2; hellgrün mit roter Zeichnung, **kopfbildend.** |
| 04.670.7 | **Grazer Krauthäuptel 2** *NS O, TPO, NS ●, TP●* | KW 11–35 | mittel - groß | | mehltautolerant; bekannte österreichische Lokalsorte; hellgrün mit roter Zeichnung und **Kopfbildung.** |
| 04.414.7 | **Ozeka** *TPO* | KW 12–34 | mittel | **HR:** Bl 29-36,38-40; Nr:0; TBSV; **IR:** LMV:1 | Blattbatavie ohne Kopfbildung im Gentile-Typ; stark gegen Innenbrand, Schossen und Vergilben der Blätter; saubere Unterseite, kleine Schnittfläche |
| 04.672.1 | **Tirolion** *TPO* | KW 14–34 | mittel | **HR:** Bl 29-37,40; Nr:0; Pb<br>**IR:** LMV:1 | mittelgroßer, kopfbildender Bataviasalat für den Ganzjahresanbau im Freiland; mittel- bis dunkelgrün; etwas langsamer als Marcord |
| 04.979.1 | **Mineral** *TPO, TP●* | KW 10–35 | mittel-groß | **HR:** Bl 29-37,39,40; Nr:0<br>**IR:** LMV:1 | leuchtend rote Blattbatavie ohne Kopfbildung im Gentile-Typ; für Ganzjahresanbau im Freiland; volle Bremia-Resistenz |
| 04.447.5 | **Redial** *TPO* | KW 10–35 | groß | **HR:** Bl 29-32, 34, 36; Nr:0 | rote Blattbatavie ohne Kopfbildung im Gentile-Typ; für Ganzjahresanbau im Freiland; robust, schossfest, stark gegen Innenbrand |



**04.670.7 Grazer Krauthäuptel 2**



**04.774.2 Grazer Eishäuptel**



**04.826.8 Eissalat Unikum-AS (jung)**

## Sorte für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

| | | |
|---|---|---|
| 04.826.8 | **Unikum-AS:** Bewährte, gefleckte, steirische Lokalsorte. | *NS O, TPO* |

**Über die Verfügbarkeit von Kleinpackungen (1.000 TP) informieren Sie gerne unsere Außendienstmitarbeiter.**

**(HR)** = hohe Resistenz; **(IR)** = intermediäre (mittlere) Resistenz
**Bl** = Bremia lactucae; **LMV:1** = Salatmosaikvirus; **Pb** = Wurzellaus (Pernphigus bursarius); **Nr:0 =** Grüne Salatlaus oder Große Johannisbeerblattlaus (Nasonovia ribisnigri)



04.730.8 Lollo Bionda Brietta



04.411.6 Lollo Bionda Babila



04.299.0 Lollo Rossa Thea



04.334.8 Eichblatt grün Admir



04.701.8 Eichblatt grün Lenir



04.939.5 Batavia Schnittsalat Grüner Eishäuptel



04.515.1 Eichblatt rot Pipeline



04.434.4 Eichblatt rot Azerix



04.410.9 Lollo Rossa Anesca



04.810.7 Eichblatt rot Alonix



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# BUNTE SALATE *Lactuca sativa*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1.000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | 1,5 g bzw. 1.200 TP | **Treibkultur:** August–Jänner | Sept.-Feb | 25 x 20 od. in Reihe | April–Mai | 1.800 Stk |
| | (75.000–80.000 Pflanzen/ha) | **Freiland:** Februar–Juli | März–Aug. | 25 x 25 | Ende April–Okt. | 1.400 Stk |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | | Pflanzung | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lollo Bionda** | | | | | |
| 04.411.6 | **Babila** Ⓢ | *TP*O, *TP*● | KW 8–34 | **HR:** Bl 29-39; Nr:0<br>**IR:** LMV:1 | runder Aufbau; etwas gröbere Blattkrause, mittel-dunkelgrüne Farbe; gute Feldhaltbarkeit, hohe Schoss- und Nekrosetoleranz; gesunde Unterseite für produktive Ernte |
| 04.730.8 | **Brietta** | *TP*O | KW 11–34 | **HR:** Bl 29-36,38-40; Nr:0; TBSV; **IR:** LMV:1; Fol:1 | mittelfeine Krause; langes Erntefenster; unempfindlich gegen Blattnekrosen und Innenbrand; auch geeignet für Vlies und Folie; passt gut zur Sorte Thea |
| **Lollo Rossa** | | | | | |
| 04.410.9 | **Anesca** | *TP*O | KW 10–34 | **HR:** Bl 29-39; Nr:0 | dunkelrot leuchtend mit festem Blatt und mittelfeiner Krause; gute Feldhaltbarkeit; aufrechte Unterseite mit feinen Rippen; geeignet für Frühling bis Herbst |
| 04.299.0 | **Thea** | *TP*O, *TP*● | KW 12–35 | **HR:** Bl 29-40; Nr:0 | gut durchgefärbter „Double-Red"-Salat mit mittelfeiner Krause, gute Schossfestigkeit und Gesundheit, leicht aufrechte Unterseite |
| **Krulsalat (Eichblatt) grün** | | | | | |
| 04.334.8 | **Admir** | *TP*O, *TP*● | KW 8–34 | **HR:** Bl 29-36,38-40; Nr:0<br>**IR:** LMV:1 | großer, mittelgrüner Eichblatt mit feinem Blatt und flachem Aufbau; schöne, saubere Unterseite mit kleiner Schnittfläche; anbausicher im Sommer, stark gegen Schossen |
| 04.701.8 | **Lenir** Ⓢ | *TP*O | KW 9–35 | **HR:** Bl 29-40; Nr:0; TBSV<br>**IR:** LMV:1 | sehr gute Größe und flacher Aufbau; aufrechte Unterseite; hohe Innenrandtoleranz und Schossfestigkeit; stark gegen Zwischenblattnekrose; für gesamte Anbausaison. |
| **Krulsalat (Eichblatt) rot** | | | | | |
| 04.810.7 | **Alonix** | *TP*O, *TP*● | KW 9–35 | **HR:** Bl 29-40; Nr:0, Pb, TBSV | roter Eichblatt mit schneller Entwicklung und gutem Volumen; idealer Partner zu Admir; empfohlen für die komplette Saison |
| 04.434.4 | **Azerix** Ⓢ | *TP*O | KW 9–35 | **HR:** Bl 29-40; Nr:0; TBSV<br>**IR:** LMV:1 | mittelschnelle Entwicklung, gute Größe, flacher Anbau; starke Innenrandtoleranz und Schossfestigkeit; homogene Abernte, hohe Ausbeute; idealer Partner zu Lenir |
| 04.515.1 | **Pipeline** | *TP*O | KW 11–35 | **HR:** Bl 29–39; Nr:0<br>**IR:** LMV:1 | großer, dunkelroter Eichblattsalat mit schneller Entwicklung |
| **Eichblattsalat löwenzahnblättrig** | | | | | |
| 04.706.3 | **Hussarde** | *TP*O | KW 10–34 | **IR:** LMV:1 | rotbrauner Freilandsalat mit löwenzahnähnlichen Blättern; sehr gut gefüllter Kopf (Rosette); ideal für "Bunte Steigen" |

**Über die Verfügbarkeit von Kleinpackungen (1.000 TP) informieren Sie gerne unsere Außendienstmitarbeiter.**

Ⓢ **= zum Sortenschutz angemeldet - Versuchssaatgutregelung**

## Batavia-Schnittsalat Sorten für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

04.939.5 **Grüner Eishäuptel** *NS* O
Krausblättriger, dunkelgrüner Batavia-Salat ohne Kopfbildung. Für früheste Kultur (30 T).

**HR** = hohe Resistenz; **IR** = intermediäre (mittlere) Resistenz; **Bl** = Bremia lactucae; **TBSV** = Tomato bushy stunt virus; **LMV:1** = Salatmosaikvirus; **Pb** = Wurzellaus (Pemphigus bursarius); **Nr:0** = Grüne Salatlaus oder Große Johannisbeerlaus (Nasonovia ribisnigri)




**04.706.3 Eichblatt löwenzahnblättrig Hussarde**

# MULTIBLATT-SALATE mit offenem Kopfaufbau

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Pflanzung | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 04.326.3 | Salanova® **Hawking** *TP*○, *TP*● | KW 12–33 | **HR:** Bl 29-37,39,40; Nr:0 | **grüner Kopfsalat** für Freiland, Gewächshaus und Hydroponik; geschlossener Kopf mit gesunder Unterseite und flexiblem Blatt; stark gegen Schossen und Doppelköpfigkeit |
| 04.958.6 | Salanova® **Barlach** *TP*○ | KW 10–35 | **HR:** Bl 29-40; Nr:0 | **roter Kopfsalat** für den Freilandanbau; schöner, rosettenartiger Aufbau, attraktive und intensive Ausfärbung; schossfest und stark gegen die Bildung von Doppelköpfen |
| 04.323.2 | Salanova® **Expertise** *TP*○, *TP*● | KW 9–35 | **HR:** Bl 29-39; Fol:4; Nr:0; Pb<br>**IR:** LMV:1; Fol:1 | **grüner Crispy-Typ** für Freiland, Gewächshaus und Hydroponik; kugeliger, kräftig grüner Kopf mit viel Volumen; knackiges Blatt mit kurzen Stiel; für Frischmarkt und Verarbeitung |
| 04.678.3 | Salanova® **Tralex** *TP*○, *TP*● | KW 10–35 | **HR:** Bl 29-37,40; Nr:0 | **roter Crispy-Typ** für Freiland; kugeliger Kopf bestehend aus tief eingeschlitzten, knackigen Blättern; für Frischmarkt als Doppelpack und Einzelkopf; stark gegen Schossen |
| 04.471.0 | Salanova® **Cousteau** *TP*○ | KW 20–30 | **HR:** Bl 29-37,39,40; Nr:0 | **dunkelgrüner Eichblatt-Salat**; flacher Wuchs; geschlossene Unterseite; sehr gute Haltbarkeit nach der Ernte; hervorragend für rot/grünen Doppelpack mit Xandra |
| 04.953.1 | Salanova® **Xandra** *TP*○ | KW 20–30 | **HR:** Bl 29-32,34,36,39,40; Nr:0 | **roter Eichblatt-Salat** mit dekorativen, kleinen Blättern; hohe Schossfestigkeit; lange Haltbarkeit nach der Ernte; hervorragend für rot/grünen Doppelpack mit Cousteau |
| 04.681.3 | Eazyleaf **Skilton** *NEU* *TP*○ | KW 10–34 | **HR:** Bl 29-36,38-40; Nr:0<br>**IR:** LMV:1 | **grüner Eazyleaf-Salat** mit spitzgekrausten mittelgroßen bis großen Köpfen mit hoher Blattausbeute, guter Schossfestigkeit und Innenrandtoleranz |



**04.681.3 Eazyleaf Salat Skilton**

**Über die Verfügbarkeit von Kleinpackungen (1.000 TP) informieren Sie gerne unsere Außendienstmitarbeiter.**

**HR** = hohe Resistenz
**IR** = intermediäre (mittlere) Resistenz;
**Bl** = Bremia lactucae, **Nr:0** = Grüne Salatlaus,
**LMV:1** = Salatmosaikvirus, **Pb** = Wurzellaus,
**Fol** = Fusarium; **TBSV** = Tomato bushy stunt virus



**04.326.3 Salanova® Kopfsalat Hawking**



**04.958.6 Salanova® Kopfsalat Barlach**



**04.323.2 Salanova® Crispy Expertise**



**04.678.3 Salanova® Crispy Tralex**



**04.471.0 Salanova® Eichblatt Cousteau**



**04.953.1 Salanova® Eichblatt Xandra**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# ROMANASALAT (Koch-, Binde-Salat) & Little Gem *Lactuca sativa var. longifolia Lam.*

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Pflanzung | Resistenzen | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| **Romanasalat** | | | | |
| 04.900.5 | **Forellenschluß** *NS* O, *NS* ● | KW 8–34 | | grüner Romanasalat mit braunroter Zeichnung; diese Sorte ist besonders im Grazer Raum gefragt; für Frischmarkt |
| 04.923.4 | **Xoana** *TP*O, *TP*● | KW 7–34 | **HR:** Bl 29-40; Nr:0; Fol: 1; TBSV; **IR:** LMV:1 | dunkelgrüner, aufrechtwachsender Mini-Romanasalat; schnell füllend; stark gegen Innenbrand und Schossen; gute Feldhaltbarkeit; bestens zur maschinellen Ernte geeignet |
| 04.903.6 | **Xalbadora** *TP*O | KW 8–34 | **HR:** Bl 29-36,38-40; Nr:0; TBSV; **IR:** LMV:1 | dunkelgrüner, anbausicherer Mini-Romanasalat mit ausgezeichneter gelber Füllung; für die Mini-Romanaherzenproduktion im Standardsegment 2-er und 3-er Verpackung |
| 04.906.7 | **Moonred** *TP*O | KW 9–34 | **HR:** Bl 29-40; TBSV; Fol:4; **IR:** LMV:1 | roter, kürzerer Mini-Romanasalat für Salatherzenproduktion im Ganzjahresanbau |
| 04.991.3 | **Adicamp** *TP*O | KW 10–14 | **HR:** Bl 29-39; Nr:0; TBSV; Pb; **IR:** Ss | dunkelgrüner Maxi-Romanasalat; für Frischmarkt und Verarbeitung; unempfindlich gegen Schossen und Innenrand; hohe Feldhaltbarkeit |
| **Little Gem** | | | | |
| 04.333.1 | **Alaine** *TP*O | KW 10–34 | **HR:** Bl 29-32, 34-39; Fol:1; Nr:0; **IR:** LMV:1 | dunkelroter Little Gem für Freiland und Hydroponic; langsame Füllung; stark gegen Schossen, Trockenrand und Innenbrand. Verwendung als Einzelköpfe und Salatherzen |

**HR** = hohe Resistenz, **IR** = intermediäre (mittlere) Resistenz;
**Bl** = Bremia lactucae, **Nr:0** = Grüne Salatlaus, **LMV:1** = Salatmosaikvirus, **Pb** = Wurzellaus,
**Fol** = Fusarium; **Ss** = Korkwurzeln, **TBSV** = Tomato bushy stunt virus

**Über die Verfügbarkeit von Kleinpackungen (1.000 TP) informieren Sie gerne unsere Außendienstmitarbeiter.**



**04.906.7 Romanasalat Moonred**



**04.900.5 Romanasalat Forellenschluß**



**04.991.3 Romanasalat Adicamp**



**04.923.4 Romanasalat Xoana**



**04.903.6 Romanasalat Xalbadora**



**04.333.1 Little Gem Alaine**

# BABY-LEAF-SALAT



06.590.6 **Lollo Rossa Rosalo** *NS* Ⓚ O
Dunkelroter Lollo Rossa mit festem Blatt; gutes Shelf-life. **Resistenzen**: **HR**: Bremia l. 29-40 und die Grüne Salatlaus“ (Nr:0).



06.712.2 **Eichblatt rot Moya** *NS* Ⓚ O
Dunkelroter Eichblatt mit gut gezahntem Blatt und guter Haltbarkeit; **Resistenzen**: **HR:** Bremia l. 29-36,38-40; die „Grüne Salatlaus“ (Nr:0), TBSV. **IR**: LMV: 1



06.716.0 **Batavia rot Diablotin** *NS* Ⓚ O
Dickes, ovalrundes Blatt mit guter Haltbarkeit; **Resistenzen**: **HR:** gegen Bremia l. 29-40.



06.625.7 **Batavia grün Kinlar** *NS* Ⓚ O
grüner Batavia mit hohem Gewicht, festem, ovalrundem Blatt und gutem Shelf life. **Resistenzen**: **HR:** Bremia l. 29-40 die „Grüne Salatlaus“ (Nr:0), TBSV. **IR**: LMV: 1, Ss.



06.707.8 **Eichblatt grün Oaking** *NS* Ⓚ O
Dunkelgrüner Eichblatt mit schöner Zahnung und stabilem Blatt; gutes Shelf life. **Resistenzen**: **HR:** gegen Bremia l. 29-40 und die „Grüne Salatlaus” (Nr:0), **IR**: gegen Salatmosaikvirus (LMV:1).



06.637.8 **Romana rot Preluda** *NS* Ⓚ O
Glänzend roter, kurzgestielter Romana mit rundem, festem Blatt. Auch für die Produktion von „rotem Feldsalat". **Resistenzen**: **HR**: Bremia l. 29-40, „Grüne Salatlaus“ (Nr:0), TBSV, **IR**: Salatmosaikvirus (LMV:1)



04.939.5 **Grüner Eishäuptel (Schnitt)** *NS* O
Dunkelgrüner, krausblättriger Eis-Schnittsalat.



04.309.6 **Rucola Coltivata Vesuvio** *NS* O
Sehr stark gefiedert, kommt von der Laubform nahe an Rucola selvatica. Durch den halbaufrechten Wuchs wird der Schnitt erleichtert, die Blätter verschmutzen nicht so leicht. Für Treib- und Freilandkultur geeignet.



03.266.3 **Mangold Fire Fresh F1** *NS* Ⓚ O
Sehr schnelle Sorte fürs Freiland. Schöner Kontrast zwischen grünem Blatt und rotem Stiel. Resistenzen: HR: Cercospora. IR: Mehltau (Peronospora farinosa f.sp Betae).



03.274.8 **Mangold Bright Lights F1** *NS* O
Sorte mit vielfärbigen Stängeln und Blättern in verschiedenen Grüntönen. Geeignet für die ganzjährige Produktion, Je kühler die Temperaturen, umso intensiver färben die Stiele. Geringere Frosthärte.



03.275.5 **Mangold** *NS* Ⓚ O, *NS* ● **Rhubarb Chard**
Rotstieliger, dekorativer Mangold. Für die ganzjährige Kultur im Freiland.



04.203.7 **Rote Rüben Bull’s Blood-Scarletta** *NS* Ⓚ O
Lebendiges Rot für Babyleaf-Verpakkungen; hübsche rote Blätter mit mildem Geschmack nach Roten Rüben; gute Qualität während der gesamten Kulturdauer.Zum Sortenschutz eingetragen - Versuchssaatgutregelung.



**SPINATSORTEN** mit Eignung für die Baby-Leaf-Produktion **siehe Seite 103.**
**ASIA-BLATTGEMÜSE** (Mizuna, Mustard - Blattsenf) **siehe Seite 85**





*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# WINTER-ENDIVIEN *Cichorium endivia L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1.000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 g | 3 g bzw. 1.200 TP | Sommer: April-Juni | Mai-Juli | 40 x 30 | Juli-Sept. | 800 Stk. |
| | | Herbst: Juni-Juli | Juli-Aug. | 40 x 30 | Sept.-Nov. | 800 Stk. |
| | | Glashaus: 10. Aug. | 1.-4. Sept. | 30 x 25 | Nov.-Dez. | 1.100 Stk. |




**Bei Frühkultur unbedingt warme Jungpflanzenanzucht bei 25°C durchführen! Frühkultur ist eine Risikokultur!!!**
**Bei Frisee-Typen ist vorbeugender Pflanzenschutz gegen Herzkranzfäule notwendig.**

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reife in Tagen nach Aufgang | Anbaueignung Freiland | Anbaueignung Treibkultur | Kopf-größe | Blattfarbe | Haltbarkeit | Gelbanteil | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Eskariol (Nr. 5-2)-Typen** | | | | | | | | | |
| 05.011.7 | **Eliance** TPO, TP● | 82 | Fj, So, He | | mittel | dunkel-grün | sehr gut | sehr gut | sehr schossfest bei Kälte und Hitze; mittelschnelle bis schnelle Füllung; auch für Abdeckung geeignet |
| 05.044.5 | **Nuance** NS O, TPO, TP● | 82 | Fj, He | X | mittel - groß | mittelgrün | sehr gut | sehr gut | sehr hoher Gelbanteil, für Treib- und Freilandkultur |
| **Frisee-Typen** | | | | | | | | | |
| 05.051.3 | **Benefine** *NEU* TPO | 80 | Fj, So, He | | mittel - groß | mittelgrün | gut | sehr gut | fein gekrauster Frisee-Typ; gute Füllung mit hohem Gelbanteil; gute Schossfestigkeit; hohe Toleranz gegen Blattnekrosen |
| 04.975.3 | **Curlesi** TPO | 80 | Fj, So, He | | mittel - groß | mittelgrün | gut | sehr gut | mittlere Krause; gut gefüllt; sehr gute Schossfestigkeit von Frühsommer bis Herbst; gute Toleranz gegen Blattnekrosen |
| 05.067.4 | **Domari** TPO | 80 | Fj, So, He | | mittel - groß | mittelgrün | gut | sehr gut | mittelgrobe Krause; hohe Schossfestigkeit bei Kälte, gute Füllung und Gesundheit; ideal für die Verarbeitungsindustrie |

**Über die Verfügbarkeit von Kleinpackungen (1.000 TP) informieren Sie gerne unsere Außendienstmitarbeiter.**

Fj = Frühjahr So = Sommer He = Herbst



**05.011.7 Endivie Eliance**



**05.051.3 Endivie Benefine**



**05.044.5 Endivie Nuance**



**04.975.3 Endivie Curlesi**



**05.067.4 Endivie Domari**

# ZICHORIEN *Cichorium intybus. L. (partim)*

## 1. CHICORÉE (Wurzelzichorie), zum Treiben in den Wintermonaten

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 g | ca. 380.000 Korn | Ende April bis Mai | 40–50 x 4–7 | Wurzeln: Mitte September bis Anfang November | 40–60 kg Pfeifen |

2000 m² Freilandfläche = 100 m² Treibfläche.
Die rübenförmigen Wurzeln werden in einem dunklen Raum im Wasserbad oder Sand getrieben. Optimale Temperaturen zum Treiben 18°C Wassertemperatur u. 15°C Raumtemperatur.

05.063.6 **Atlas F1** ***PRO***
Frühe Standardsorte für Aussaat Ende April bis Mai. Feldernte nach ca. 140 Tagen. Für Treibproduktion November bis Jänner.



**05.063.6 Chicoree Atlas F1**

## 2. KOPF-ZICHORIEN, für Freilandkultur (vor Wildschäden schützen!)

| 1.000 Korn Gewicht ca. | ca. Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1–1,5 g | 100.000 TP für 80.000 bis 90.000 Pflanzen | ca. 1 Monat vor Pflanzung | siehe Sorten | 30 x 30 | siehe Sorten | 50.000–80.000 Stk. |




## 2a. Zuckerhut-Typen (Fleischkraut)

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Pflanzung | Ernte | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 05.105.3 | **Sumero F1** ***TPO, TP●*** | Anfang April - Anfang August | Mitte Juni - Ende Oktober | hohe Flexibilität und Feldhaltbarkeit; hohe Schossfestigkeit und Uniformität; ideal für Frischmarkt und Salatverarbeitung, hohe Ausbeute an stabilen, gesunden Blättern; stark gegen Zellenplatzer |
| 05.091.9 | **Vespero F1** ***TPO, TP●*** | Ende März - Anfang August | Ende Juni - Ende Oktober | große, gleichmäßige, hellgrüne Köpfe mit gelber Innenfarbe; ausgezeichnete Blatt- und Rippen-qualität; hohe Schosstoleranz bei Hitze; auch für kurze bis mittlere Lagerung geeignet |
| 05.104.6 | **Uranus F1** ***TPO, TP●*** | Anfang Juli - Mitte August | Ende September - Anfang November | zylindrische Sorte mit dunkelgrüner Farbe; für die Herbsternte; großfallende Köpfe mit einer Höhe von ca. 50 cm; gute Toleranz gegen Krankheiten; verträgt etwas Frost |

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**



**05.105.3 Zuckerhut Sumero F1**



**05.091.9 Zuckerhut Vespero F1**



**05.104.6 Zuckerhut Uranus F1**



***NS*** = Normalsaatgut ***KS*** = kalibriertes Saatgut ***PR*** = Präzisionssaatgut ***TP*** = Topfpillen

# 2b. Radicchio

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Pflanzung | Ernte | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 05.078.0 | **Indigo F1** *TPO* | Anfang April - Ende Juli | Anfang Juni - Anf. Oktober | wuchskräftige Hybride mit breitem Erntefenster; Indigo F1 bildet dunkelrote, runde, feste Köpfe mit grünem Umblatt aus; gute Toleranz gegen Schossen und Randen |
| 05.071.1 | **Vasari F1** *TPO* | Anfang Mai - Ende Juli | Mitte Juli - Mitte Oktober | für Sommerernte zwischen Indigo und Leonardo; bildet große, flachrunde Köpfe mit herausragender Farbe bereits im Sommer bei geringerem Schossrisiko gegenüber Leonardo |
| 05.099.5 | **Caravaggio F1 (CMS)** *TPO* | Anfang Mai - Ende Juli | Mitte Juli - Mitte Oktober | schossfester Treviso-Typ; auffallend intensiv rote Farbe der kompakten Köpfe; ca. 75 Wachstumstage |
| 05.085.8 | **Leonardo F1** *TPO, TP●* | Anfang Juni - Ende Juli | September - November | großköpfige Sorte für die Herbsternte; Leonardo ist homogen, der Kopf ist rund bis flachrund und intensiv dunkelrot gefärbt; hohe Krankheitstoleranz und widerstandsfähig gegen Blattrandbrand |
| 05.098.8 | **Raffaello F1** *TPO* | Juli | November | Rossini-Typ für die Ernte im Spätherbst; großfallende, flachrunde Köpfe mit tiefroter Farbe; sehr schönes Farbverhältnis rot zu weiß; gute Feldhaltbarkeit auch bei tieferen Temperaturen |

**Bei Frühkultur unbedingt warme Jungpflanzenanzucht! Frühkultur ist eine Risikokultur!!!**

**Information Ihres Bio-Verbandes zur Sorteneignung beachten. Bio-Austria z.B. unter: https://www.bio-austria.at/download/zellfusionsfreie-sorten-im-gemuesebau/**



**05.078.0 Radicchio Indigo F1**





**05.071.1 Radicchio Vasari F1**



**05.099.5 Radicchio Caravaggio F1**

**05.085.8 Radicchio Leonardo F1**



**05.098.8 Radicchio Raffaello F1**

## Radicchio für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

05.089.6 **Variegata Castelfranco di Lusia** *NS* O *TPO*
Italienische Spezialsorte mit dekorativen hellgrünen Blättern und intensiven roten Flecken. Voluminöser, lockerer Kopf mit glattem Blattrand. Gewicht 350–400 g. Samenfeste Sorte (cms-frei).
Die Aussaat zur Jungpflanzenproduktion erfolgt im Juli;
Jungpflanzenproduktion ca. 5 Wochen, Pflanzung im August;
mittelspät reifend, Ernte ab Oktober.

05.013.1 Rossa di Treviso 4 **Sincro** *NS* O
Italienische Spezialsorte mit typisch aufrechter Blattstellung
für Sommeraussaat und Ernte im Herbst; auch für Marktfahrer und Direktvermarkter.



**05.089.6 R. V. Castelfanco di Lusia**



**05.013.1 Radicchio Sincro**

**SCHWARZWURZEL** . . . . . *siehe Seite 104*



05.127.5 Sellerie Monarch



05.128.2 Sellerie Alicia F1



05.135.0 Sellerie Prinz



05.145.9 Bleichsellerie Rubens F1



05.123.7 Sellerie President



05.143.5 Sellerie Boston F1



05.139.8 Bleichsellerie Dali F1



05.129.9 Sellerie Calgary F1



05.146.6 Bleichsellerie Paolo F1



05.223.4 Spinat Kiowa F1



05.219.7 Spinat Monterey F1



05.227.2 Spinat Dallas F1



05.218.0 Spinat Harmonica F1



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# SELLERIE *Apium graveolens L*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | ca. Saatgutbedarf f. 1000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 g | 1 g bzw. 1.250 K bzw. 1.200 TP | Knollen: Frühkult.:*) Mitte Jän. – Anf. Feb. | E. März - Anf. April | 30 x 30 | Ab Anf. Juli | 950 Stk. |
| | | Normalkult.: E. Feb. – Anf. März | Mitte Mai | 50 x 40 | Oktober | 480 Stk. |
| | | Bleichsell.: E. Feb. – Anf. März | Mai | 30 x 30 | Aug.-Sept. | 1.000 Stk. |




***) Achtung:** Bei früher Pflanzung Gefahr des Schossens. Warme Jungpflanzenanzucht (22-25° C) und Vliesabdeckung nach Pflanzung nötig. Witterungsbedingt können auch bei geeigneten Sorten Schosser auftreten.

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reife | Knollen Größe | Knollen Schale | Knolle Fleisch | Schoss-resistenz | Eignung für Frühkultur | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Knollensellerie** | | | | | | | | |
| 05.128.2 | **Alicia F1** TPO*) | früh | groß | glatt, hell | reinweiß | sehr gut | | wächst hoch über dem Boden, produziert wenig Seitenwurzeln, unempfindlich gegenüber Doppelköpfen, sehr gut lagerfähig |
| 05.143.5 | **Boston F1** *NEU* TPO | früh | groß | glatt, hell | reinweiß | sehr gut | | runde glatte Knolle mit aufrechtem Laub; tiefer Wurzelansatz; für Frischmarkt und Industrie; auch für Lagerung bis Mitte März |
| 05.135.0 | **Prinz** TPO, TP ● | früh - mittel | mittel | glatt, hell | reinweiß | sehr gut | X | bekannte Sorte für Frischmarkt und Industrie, sehr schossfest, weißes Fleisch mit sehr guter Innenqualität |
| 05.129.9 | **Calgary F1** TPO | mittel | groß | glatt | reinweiß | sehr gut | | geeignet für Produktion von Bundware und großfallenden Knollen; für Pflanzung ab Anfang Mai für Frischmarkt und Industrie |
| 05.127.5 | **Monarch** TPO, TP ● | mittel | groß | glatt, hell | reinweiß | sehr gut | X | für Frischmarkt und Industrie, zur Produktion von großfallenden Knollen mit exzellenter Innenqualität; auch für die Lagerung |
| 05.123.7 | **President** PR Ⓚ O, TPO | mittel | groß | glatt, hell | reinweiß | gut | | widerstandsfähig gegen Selleriemosaikvirus und Septoria |
| **Bleichsellerie** (Stangensellerie) | | | | | | | | |
| 05.139.8 | **Dali F1** TPO | | | | | | | schneller Wuchs, sehr stark gegen Schossen; dunkelgrün, glänzend, glatte Stiele; mittelgroß aufrecht; früh bis mittelfrüh |
| 05.145.9 | **Rubens F1** TPO | | | | | | | kompakte Sorte mit dunkelgrünen, glatten Blattstielen; mittelgroße Pflanze mit aufrechtem Wuchs; stark gegen Innenbrand; empfohlen für Pflanzung ab Mitte Mai; hohes Gewicht |
| 05.146.6 | **Paolo F1** TPO | | | | | | | mittelgrüne Sorte für die Hauptanbau-Saison; mittelfrüh mit guter Schosstoleranz; aufrechter Wuchs |

Bleichsellerie kann satzweise gepflanzt werden. In Folienhäuser Pflanzung Anfang April und im Freiland ab Mitte April unter Vlies.

***) = geprimt** **Über die Verfügbarkeit von Kleinpackungen (1.000 TP) informieren Sie gerne unsere Außenmitarbeiter.**

# SPINAT *Spinacia oleracea*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Reihenab-stand in cm | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|
| 8–12 g | für Frischmarkt: 3–4 Mill. Korn | siehe Sorten | 25–30 | 150 – 300 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Aussaat Gewächshaus | Aussaat Freiland | **Resistenzen HR** | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.227.2 | **Dallas F1** PR Ⓚ O | Ende November – Anfang März | März – Mitte April, Mitte August – Mitte Okt. | Pfs: 1-18 | schöne, fast runde, dunkelgrüne, fast aufrecht wachsende; Blätter; mittel schossfest, nicht geeignet für Sommeranbau |
| 05.215.9 | **Sioux F1** NS Ⓚ O | Anf. Jänner - Ende Feb. Anf. Sept. - Ende Dez. | Ende Feb. - Ende April Anf. August - Ende Sept. | Pfs: 1-15, 17, 19 | mittelschneller, aufrechter Wuchs; runde, feste, dunkelgrüne Semi-Savoy-Blätter; sehr zuverlässig und hochproduktiv |
| 05.218.0 | **Harmonica F1** PR Ⓚ O | Anf. Jänner - Ende Feb. Anf. Sept. - Ende Dez. | Mitte Feb. - Ende April Anf. Sept - Ende Okt. | Pfs: 1-15, 17, 19 | schnellwachsend; glattblättrig; aufrechtes, dunkles Blatt; für Frischmarkt, **Babyleafproduktion**, als Überwinterungsspinat |
| 05.223.4 | **Kiowa F1** PR Ⓚ O | Mitte Jan. – Mitte März Mitte Aug. – Mitte Sept. | Mitte März - Ende Mai Anf. Aug. - Mitte Sept. | Pfs: 1-18 | aufrechter, mittelschneller Wuchs; halbrunde, dunkelgrüne Blätter; für Baby- Leaf und Frischmarkt; füllt die Kiste sehr gut aus |
| 05.219.7 | **Monterey F1** NS Ⓚ O | — | Mitte April - Ende Juni | Pfs: 1-15, 17, 19 | glattblättrig; mitteldunkelgrüne Farbe; hoher Ertrag; die ovalen Blätter wachsen aufrecht; auch für **Babyleafproduktion** |
| 05.221.0 | **Pawnie F1** NS Ⓚ O | — | Mitte April - Ende Juni | Pfs: 1-15, 17, 19 | langsam wachsende Sommersorte; dicke, runde bis halbovale mittelgrüne Semi-Savoy-Blätter |

**Pfs = Peronospora farinosa f. sp. spinaciae (Falscher Mehltau)**

**SPARGEL** . . . . . *siehe Seite 104*

# SPARGEL *Asparagus officinalis*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf für 100 m² | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15–25 g | 50 g | April | April im 2. Jahr | 50 x 150 | April-Juni ab dem 3. Jahr | ca. 50 kg |



05.180.0 **Gijnlim F1** *NS* O
Gijnlim ist eine zu 100 % männliche Hybride und eignet sich besonders gut für den Anbau von sowohl weißem als auch grünem Spargel in gemäßigtem Klima. Die Sorte ist besonders früh und ihr Ertrag ist sehr hoch. Die besten Ergebnisse im Anbau für weißen Spargel werden bei einer Bestandesdichte von 3–3,5 Pflanzen pro laufenden Meter erzielt. Die Bestandesdichte kann um rund 30 % erhöht werden, wenn grüner Spargel geerntet werden soll.



05.172.5 **Erasmus F1** *PR* O
Violette Spezialzüchtung. 100 % männliche Hybride mit frühem Erntebeginn und vergleichsweise hoher Ertragsleistung. Für Anbau unter Thermofolie sowie Minitunnel geeignet. Starkwachsender Blattapparat. Interessante Sondersorte. Anbau vergleichbar mit Grünspargel. Empfohlener Pflanzabstand: 5 bis 6 Pflanzen/Meter.

## Sorte für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

05.170.1 **Mary Washington:** Mittelfrühe, ertragreiche Sorte. *NS* O

# SCHWARZWURZEL *Scorzonera hispanica L.*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf für 100 m² | Saat-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 g | 100–140 g | März – April möglichst zeitig | 30 x 5–7 | Oktober – November | 150 – 250 kg |



05.121.3 **Meres** *NS* O
Bildet lange, glatte, zylindrische Wurzeln mit dunkler Farbe aus. Meres hat eine sehr hohe Toleranz gegen Echten Mehltau. Für Frischmarkt und Industrie.

# HAFERWURZEL *Tragopogon porrfolius*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf für 100 m² | Saattermin | Standweite in cm | Ernte-termin |
|---|---|---|---|---|
| 11,5 | 150–200 g | Februar – April | vereinzeln auf 40 x 5–10 cm | September – Februar |



09.100.4 **Haferwurzel** *NS* O
Synonym: Weißwurzel, Habermark, Purpur-Bocksbart
Winterhartes Gemüse mit 20–30 cm langen und 1–2 cm dicken Wurzeln, diese enthalten wie die Schwarzwurzel Milchsaft. Standort: Sonnig bis halbschattig, tiefgründiger Boden. Für Direktvermarkter.



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# TOMATEN

## Salattomaten | Fleischtomaten | Cocktailtomaten





**05.319.4 Tomate Bauna F1**



**05.357.6 Tomate Irvin F1**



**05.349.1 Tomate Willy F1**



**05.448.1 Tomate Codino F1**



**05.321.7 Tomate Bolstar Granda**



**05.282.1 Tomate Cherokee F1**



**05.451.1 Tomate Corfu F1**



**05.262.3 Tomate Graziano F1**



**05.455.9 Tomate Gaheris F1**



**05.494.8 Tomate Bolstar Gimli F1**



**05.442.9 Tomate Barbados F1**

# TOMATEN (Paradeiser) *Solanum lycopersicum L. (ehem. Lycopersicon esculentum)*

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf f. 1.000 Pflanzen | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro 100 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 g | ca. 1.400 Korn | Treibkultur: Mitte Febr. Mitte März | Ende März– Anf. Mai | 80–100 x 40–50 | ab Anf. Juni | 1500 – 2.300 kg |
| | | Freiland: März | Mitte Mai | 100 x 40–60 | ab Juli | 700 – 1.000 kg |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife in Tagen nach Pflanzung | ca. Frucht-gewicht | Frucht-form | Anbaueignung Freiland | Anbaueignung Treib | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RUNDE Sorten ROT** | | | | | | | ***für lose Ernte*** |
| 05.442.9 | **Barbados F$_1$** NS Ⓚ O | 64 | 120–130 g | rund | | X | erprobte Hybride mit LSL-Qualität; hoher Früh- und Gesamtertrag; robuster Pflanzenaufbau |
| 05.451.1 | **Corfu F$_1$** NS Ⓚ O | 64 | 105–115 g | rund | X | X | hoher Früh- und Gesamtertrag, robuster Pflanzenaufbau, "Long shelf life-Typ" |
| 05.319.4 | **Bauna F$_1$** *NEU* NS Ⓚ O | 64 | 90–110 g | rund | X | | frühe Reife; gute Fruchtqualität; für Freiland und Folientunnel; **tolerant gegen Phytophtera** |
| 05.357.6 | **Irvin F$_1$** *NEU* NS Ⓚ O | 65 | 130–140 g | rund - flachrund | | X | Mercedes-Typ; mittelfrühe Ernte; wüchsige Pflanzen; für lose Ernte und Rispenproduktion |
| 05.455.9 | **Gaheris F$_1$** NS Ⓚ O | 65 | 125 g | rund | | X | mittelfrühe, sehr wüchsige Sorte, die auch bei Hitze keine Blüten abstößt |
| 05.321.7 | **Bolstar Granda** NS Ⓚ ● | 75 | 90–110 g | rund | X | | für temperierten bzw. ungeheizten Anbau; für lose Ernte mit Kelch; 5 bis 10 Früchte pro Rispe; sehr gutes Shelf Life |

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife in Tagen nach Pflanzung | ca. Frucht-gewicht | Frucht-form | Kultur kalt/ temperiert | Kultur geheizt/ intensiv | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RUNDE Sorten ROT** | | | | | | | ***Rispentomaten*** |
| 05.349.1 | **Willy F$_1$** NS Ⓚ O | 60 | 150–180 g | rund | X | X | frühe Reife; sehr feste Früchte („Long shelf life-Typ"); als Rispe oder einzeln zu ernten |
| 05.282.1 | **Cherokee F$_1$** NS Ⓚ | 70 | 140–160 g | rund - flachrund | X | | 5–6 Früchte pro Rispe; „Long shelf life-Typ"; wenig anfällig für Rissbildung; für Pflanzung im Frühjahr und Herbst |
| 05.448.1 | **Codino F$_1$** NS Ⓚ ● | 70 | 100–120 g | rund | | X | rasche gleichmäßige Reife; kaum Königsfrüchte; Trossernte; aufrechtstehende Blätter, offener Wuchs |
| 05.262.3 | **Graziano F$_1$** NS Ⓚ O | 70 | 90–100 g | rund | | X | starke Pflanze, toleriert hohe Temperaturen, setzt Früchte auch bei geringem Licht an, für lose und Rispenernte, glänzend rot |
| 05.494.8 | **Bolstar Gimli F$_1$** NS Ⓚ ● | 75 | 70–80 g | rund | X | | für temperierten bzw. ungeheizten Anbau; 7 bis 10 Früchte pro Rispe; für Trossernte und lose; sehr gutes Shelf Life |

Sämtliche oben angeführte Sorten sind **indeterminant**, d.h. unbegrenzt wachsend.

| Art.Nr. | Sorte | Hohe Resistenz | Intermediäre Resistenz |
|---|---|---|---|
| 05.330.9 | **Amerigo F$_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | **IR: Mj \| TSWV** |
| 05.442.9 | **Barbados F$_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | GSPP |
| 05.319.4 | **Bauna F$_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0-2 \| For** | **IR: TYLCV** |
| 05.494.8 | **Bolstar Gimli F$_1$** | **HR: ToMV:0 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For** | |
| 05.321.7 | **Bolstar Granda** | **HR: ToMV:0 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For** | |
| 05.282.1 | **Cherokee F$_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** |
| 05.448.1 | **Codino F$_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Ff:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For** | **IR: On \| TSWV \| tolerant: Si** GSPP |
| 05.451.1 | **Corfù F$_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va \| Vd \| Fol:0,1** | |
| 05.455.9 | **Gaheris F$_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** GSPP |
| 05.262.3 | **Graziano F$_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For** | **IR: On \| TSWV \| tolerant: Si** |
| 05.357.6 | **Irvin F$_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-C \| Fol:0,1** | **IR: TSWV \| TYLCV** |
| 05.349.1 | **Willy F$_1$** | **HR: Fol:0,1 \| Va:0 \| Vd:0** | **IR: TSWV** |

**GSPP** = Good Seed and Plant Practices

**Aal** = Alternaria alternata sp. lycopersici
**For** = Wurzelfusarium (Fus. oxy. f. sp. **radicis** lycopersici)
**Fol** = Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)
**Ma** = Nematoden (Meloidogyne arenaria)
**Mi** = Nematoden (Meloidogyne incognita)
**Mj** = Nematoden (Meloidogyne javanica)
**On** = Echter Mehltau (Oidium neolycopersici)
**Pf** = Samtflecken (Passalora fulva, ex Fulvia fulva)
**Pst** = Pseudomonas syringae pv. tomato
**Sbl** = Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
**Ss** = Stemphylium solani
**Si** = Silberblatt (Chimera)
**ToMV** = Tomatenmosaikvirus (Tomato mosaic virus)
**TSWV** = Bronzefleckenvirus
**TYLCV** = Tomato Yellow Leaf Curl Virus
**Va** = Verticillium (Verticillium albo-atrum)
**Vd** = Verticillium (Verticillium dahliae)

Generell erfolgen der Nachweis und die Ausweisung der Resistenzen durch den Züchter der jeweiligen Sorte!



05.444.3 Tomate Borsalina $F_1$



05.276.0 Tomate Marmyto $F_1$



05.487.0 Tomate Marbonne $F_1$



05.508.2 Tomate Tiren $F_1$



05.559.4 Tomate Sauron $F_1$



05.433.7 Tomate Grifone $F_1$



05.525.9 Tomate Belle $F_1$



05.416.0 Tomate Loreto $F_1$



05.312.5 Tomate Bolstar Sensatica $F_1$



05.431.3 Tomate Orinade $F_1$



05.449.8 Tomate Cyclade $F_1$



05.491.7 Tomate Myriade $F_1$



05.263.0 Tomate Ionico $F_1$



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# TOMATEN (Paradeiser) Fortsetzung

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife in Tagen nach Pflanzung. | ca. Frucht-gewicht | Frucht-form | Anbaueignung Freiland | Anbaueignung Treib | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FLEISCHTOMATE STANDARDTYP** | | | | | | | |
| 05.525.9 | **Belle $F_1$** NS K O | 68 | 180–220 g | flachrund | X | X | sehr große, feste Fleischtomate mit bester Qualität; für lose Ernte |
| **FLEISCHTOMATEN TYP MARMANDE** | | | | | | | |
| 05.276.0 | **Marmyto $F_1$** NS K O | 62 | 240 g | flachrund gerippt | | X | Marmande-Typ; sehr platzfest; für lose Ernte |
| 05.487.0 | **Marbonne $F_1$** NS K O | 65 | 190–250 g | flachrund gerippt | | X | hybridisierter Marmande-Typ; für lose Ernte |
| **FLEISCHTOMATEN TYP OCHSENHERZ** | | | | | | | |
| 05.444.3 | **Borsalina $F_1$** NS K O | 64 | 180–200 g | Ochsen-herz-Typ | | X | hybridisierter Ochsenherz-Typ (“coeur de boeuf”); muss noch leicht orangefarben geerntet werden; für lose Ernte |
| 05.559.4 | **Sauron $F_1$** NS K O | 65 | 300–350 g | Ochsen-herz-Typ | X | | wüchsige Ochsenherz-Hybridsorte; bringt sehr große und uniforme, attraktiv gerippte, feste fleischige und aromatische Früchte; für lose Ernte |
| 05.433.7 | **Grifone $F_1$** NS K O | 66 | 180–300 g | Ochsen-herz-Typ | | X | ein Typ Ochsenherz mit einem sehr guten Geschmack und einer für diesen Typ guten Haltbarkeit nach der Ernte; für lose Ernte |
| **LÄNGLICHE und OVALE TOMATEN - FÜR FRISCHMARKT** | | | | | | | |
| 05.416.0 | **Loreto $F_1$** *NEU* NS K O | 62 | 70–90 g | oval | X | X | frühe Pflaumentomate nit offenen, kräftigen Pflanzen; regelmäßiger Tross-aufbau; guter Geschmack; sehr gute Fruchtfestigkeit; für lose Ernte |
| 05.297.5 | **Atyliade $F_1$** NS K O | 64 | 120–130 g | oval | X | X | vielseitige Sorte vom Typ Myriade mit hohem Ertrag und sehr schöner Fruchtfärbung; für Freiland und kalten Tunnel; für lose Ernte |
| 05.312.5 | **Bolstar Sensatica $F_1$** NS K ● | 64 | 85 g | oval | | X | platzfest, lange an der Pflanze haltbar; lange Rispen; guter Fruchtansatz; für Tunnel und leicht geheizte Gewächshäuser; für lose Ernte |
| 05.491.7 | **Myriade $F_1$** NS K ● | 66 | 110–130 g | oval | | X | Salattomate für lose Ernte |
| 05.449.8 | **Cyclade $F_1$** NS K O | 68 | 120–240 g | oval | | X | Salattomate für Rispenvermarktung; etwas schwerere Früchte als Myriade $F_1$; 5–6 Früchte pro Rispe |
| 05.431.3 | **Orinade $F_1$** NS K O | 70 | 100–120 g | oval | | X | **Roma-Typ** mit attraktiven, intensiv **orangen** Früchten; homogene Frucht-größe; für lose Ernte |
| 05.508.2 | **Tiren $F_1$** NS K O | 66 | 120–130 g | länglich | | X | länglicher **San Marzano-Typ**; typischer Salatparadeiser; für lose Ernte; auf verstärkte Kalziumversorgung achten!! |
| 05.263.0 | **Ionico $F_1$** NS K O | 70 | 140–160 g | länglich | | X | **San Marzano-Typ**; für Glashaus/Tunnel; offener Wuchs; wenig anfällig gegen Fruchtendfäule; 10–12 cm lange Früchte, Durchmesser 4-5 cm; für lose Ernte |

**Bei Hellfrucht-Typen, länglichen bzw. ovalen Sorten ist wegen Frucht-Endfäule verstärkte Düngung mit Kalksalpeter notwendig.**

Sämtliche oben angeführte Sorten sind **indeterminant**, d.h. unbegrenzt wachsend.

| Art.Nr. | Sorte | Hohe Resistenz | Intermediäre Resistenz |
|---|---|---|---|
| 05.297.5 | **Atyliade $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** GSPP |
| 05.525.9 | **Belle $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | |
| 05.312.5 | **Bolstar Sensatica $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For** | **IR: On** |
| 05.444.3 | **Borsalina $F_1$** | **HR: Va:0 \| Vd:0** | GSPP |
| 05.449.8 | **Cyclade $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** GSPP |
| 05.433.7 | **Grifone $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| ToANV \|Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0** | **IR: TSWV** |
| 05.263.0 | **Ionico $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Fol:0,1 \| Va:0 \| Vd:0** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** |
| 05.416.0 | **Loreto $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | |
| 05.487.0 | **Marbonne $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Fol:0** | GSPP |
| 05.276.0 | **Marmyto $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Fol:0 \| For** | **IR: TYLCV \| Ma \| Mi \| Mj** |
| 05.491.7 | **Myriade $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** |
| 05.431.3 | **Orinade $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | **IR: Ma \| Mi \| Mj \| On** GSPP |
| 05.559.4 | **Sauron $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** |
| 05.508.2 | **Tiren $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0** | |

**GSPP** = Good Seed and Plant Practices

**Aal** = Alternaria alternata sp. lycopersici
**For** = Wurzelfusarium (Fus. oxy. f. sp. **radicis** lycopersici)
**Fol** = Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)
**Ma** = Nematoden (Meloidogyne arenaria)
**Mi** = Nematoden (Meloidogyne incognita)
**Mj** = Nematoden (Meloidogyne javanica)
**On** = Echter Mehltau (Oidium neolycopersici)
**Pf** = Samtflecken (Passalora fulva, ex Fulvia fulva)
**Pst** = Pseudomonas syringae pv. tomato
**Sbl** = Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
**Ss** = Stemphylium solani
**Si** = Silberblatt (Chimera)
**ToANV** = Tomato apex necrotic virus
**ToMV** = Tomatenmosaikvirus (Tomato mosaic virus)
**TSWV** = Bronzefleckenvirus
**TYLCV** = Tomato Yellow Leaf Curl Virus
**Va** = Verticillium (Verticillium albo-atrum)
**Vd** = Verticillium (Verticillium dahliae)

Generell erfolgen der Nachweis und die Ausweisung der Resistenzen durch den Züchter der jeweiligen Sorte!



# Cherry & Cocktail

## Tomatensortiment

## in attraktiven Formen und Farben



**05.505.1 Tomate Rhianna $F_1$**



**05.445.0 Tomate Chipano $F_1$**



**05.268.5 Tomate Star Gold $F_1$**



**05.502.0 Tomate Summersun $F_1$**



**05.507.5 Tomate Sakura $F_1$**



**05.551.8 Tomate Yellow Mimi $F_1$**



**05.450.4 Tomate Hanami $F_1$**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# TOMATEN (Paradeiser) Fortsetzung

## CHERRY- UND COCKTAILTOMATEN

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife in Tagen nach Pflanzung | ca. Frucht-gewicht | Anbaueignung Freiland | Anbaueignung Treib | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **rote runde Sorten** | | | | | | |
| 05.293.7 | **Bejbino $F_1$** PR Ⓚ O | 58 | 30–40 g | X | X | runde, rote Cocktailtomate; kräftige Pflanzen; für lose Ernte |
| 05.505.1 | **Rhianna $F_1$** NS Ⓚ O | 60 | 30 g | X | X | wohlschmeckende, magenta-rote Früchte; ø 8 Früchte pro Rispe; für lose Ernte |
| 05.507.5 | **Sakura $F_1$** NS Ⓚ O | 62 | 20–25 g | | X | mittelgroße Cherry-Tomate; Durchmesser ca. 3 cm; für lose Ernte, auch für Rispenvermarktung |
| 05.450.4 | **Hanami $F_1$** NS Ⓚ O<br>NS Ⓚ ● | 62 | 18–24 g | X | X | Rispentomate mit maximaler Anbausicherheit, resistent gegen alle aktuell bekannten Cladosporium-Stämme! |
| 05.445.0 | **Chipano $F_1$** NS Ⓚ O | 65 | 20–22 g | X | X | gute Toleranz gegen Platzen, auch im Freiland; für lose Ernte |
| **gelbe und orange runde Sorten** | | | | | | |
| 05.551.8 | **Yellow Mimi $F_1$** NS Ⓚ O | 58 | 15 g | X | X | **goldgelbe** Cherrytomate mit gutem Geschmack; für lose Ernte |
| 05.268.5 | **Star Gold $F_1$** NS Ⓚ O | 58 | 20–25 g | X | X | **goldgelbe** Cocktailtomate, für lose Ernte, lange Rispen können auch Doppelrispen sein, saftig, süße Frucht, Brix: 9 |
| 05.502.0 | **Summersun $F_1$** NS Ⓚ O | 58-60 | 15–25 g | | X | runde bis kurzovale, **goldgelbe** Cherry-Sorte; Fruchtdurchmesser ca. 2,5 cm; süße Frucht, Brix: 8-9; für lose Ernte |
| 05.506.8 | **Sungold $F_1$** NS Ⓚ O | 58-60 | 15–18 g | | X | runde, **orange** Cherry-Hybride; auch als Rispe (12–14 Früchte); Fruchtdurchmesser ca. 2,5 cm |

Sämtliche oben angeführte Sorten sind **indeterminant**, d.h. unbegrenzt wachsend.

| Art.Nr. | Sorte | Hohe Resistenz | Intermediäre Resistenz |
|---|---|---|---|
| 05.293.7 | **Bejbino $F_1$** | **HR: ToMV \| Pf** (ex Ff) **\| Va \| Fol:1,2** | |
| 05.445.0 | **Chipano $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0** | |
| 05.450.4 | **Hanami $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Fol:0, 1** | |
| 05.505.1 | **Rhianna $F_1$** | **HR: ToMV:0,1 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Fol:0-1 \| For \| Vd:0 \| Ss** | **IR: Mi** |
| 05.507.5 | **Sakura $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Pf** (ex Ff)**:A-E \| Fol:0,1** | **IR: Ma \| Mi \| Mj \| tolerant: Si** |
| 05.268.5 | **Star Gold $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Fol:0,1 \| Va:0 \| Vd:0** | |
| 05.502.0 | **Summersun $F_1$** | **HR: ToMV \| Vd \| Fol:1** | |
| 05.506.8 | **Sungold $F_1$** | **HR: ToMV \| Fol:0,1** | |
| 05.551.8 | **Yellow Mimi $F_1$** | **HR: ToMV \| Fol** | |

**Aal** = Alternaria alternata sp. lycopersici
**For** = Wurzelfusarium (Fus. oxy. f. sp. **radicis** lycopersici)
**Fol** = Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)
**Ma** = Nematoden (Meloidogyne arenaria)
**Mi** = Nematoden (Meloidogyne incognita)
**Mj** = Nematoden (Meloidogyne javanica)

**On** = Echter Mehltau (Oidium neolycopersici)
**Pf** = Samtflecken (Passalora fulva, ex Fulvia fulva)
**Pst** = Pseudomonas syringae pv. tomato
**Sbl** = Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
**Ss** = Stemphylium solani
**Si** = Silberblatt (Chimera)

**ToMV** = Tomatenmosaikvirus (Tomato mosaic virus)
**TSWV** = Bronzefleckenvirus
**TYLCV** = Tomato Yellow Leaf Curl Virus
**Va** = Verticillium (Verticillium albo-atrum)
**Vd** = Verticillium (Verticillium dahliae)

Generell erfolgen der Nachweis und die Ausweisung der Resistenzen durch den Züchter der jeweiligen Sorte!



**05.293.7 Tomate Bejbino $F_1$**



**05.506.8 Tomate Sungold $F_1$**



**Tomatenversuch im Seewinkel**



05.291.4 Tomate Lobello $F_1$



05.304.0 Tomate Skate $F_1$



05.468.9 Tomate Fantino $F_1$



05.509.9 Tomate Trilly $F_1$



05.350.7 Tomate Dolcetto $F_1$



05.520.4 Tomate Sorbetto $F_1$



05.567.9 Tomate Marzabello $F_1$



05.514.3 Tomate Valido $F_1$



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# TOMATEN (Paradeiser) Fortsetzung

## COCKTAILTOMATEN - ovale Sorten

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife in Tagen nach Pflanzung | ca. Frucht-gewicht | Anbaueignung Freiland | Anbaueignung Treib | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **rote ovale Sorten** | | | | | | |
| 05.291.4 | **Lobello $F_1$** NS K O | 60 | 18–22 g | | X | kleine Pflaume; Länge 40–45 mm, Durchmesser ca. 25 mm; 12–14 Früchte pro Rispe; für lose Ernte und Rispenproduktion |
| 05.350.7 | **Dolcetto $F_1$** NS K O | 60 | 10–15 g | | X | ertragreiche Mini-Pflaume mit kurzen Internodien; für lose Ernte und Rispenproduktion; sehr süßer Geschmack (Dattel-Tomate, 10-11° Brix) |
| 05.514.3 | **Valido $F_1$** NS K O | 60 | 20–25 g | X | X | kleine Pflaume mit hohem Zuckergehalt; gute Toleranz gegen Rissbildung; kräftige Pflanzen mit kurzen Internodien; für lose Ernte |
| 05.520.4 | **Sorbetto $F_1$** NS K O | 60 | 30–35 g | | X | Mini-San Marzano-Typ; für lose Ernte und Rispenproduktion; Brix 9–11° |
| 05.509.9 | **Trilly $F_1$** NS K | 60 | ca. 20 g | | X | Mini-San Marzano-Typ mit länglichen Pflaumen; für lose Ernte und Rispenproduktion |
| 05.567.9 | **Marzabello $F_1$** NS K O | 70 | 25–35 g | | X | etwas größerer Mini-San Marzano Typ; mittelstarker Wuchs, sehr ertragreich, ausgezeichneter Fruchtansatz; für Einzelernte; hoher Brixgehalt |
| **gelbe und orange ovale Sorten** | | | | | | |
| 05.304.0 | **Skate $F_1$** NS K O | 60 | 18–22 g | X | X | **goldgelbe**, kleine Pflaume; Länge 40–45 mm, Durchmesser ca. 25 mm; für lose Ernte und Rispenproduktion |
| 05.468.9 | **Fantino $F_1$** NS K O | 60 | 18–22 g | X | X | leuchtend **orange** Mini-Pflaume; etwas wüchsigere Sorte; Länge 40–45 mm, Durchmesser ca. 25 mm; 14-16 Früchte pro Rispe; für lose Ernte |

Sämtliche oben angeführte Sorten sind **indeterminant**, d.h. unbegrenzt wachsend.

| Art.Nr. | Sorte | Hohe Resistenz | Intermediäre Resistenz |
|---|---|---|---|
| 05.350.7 | **Dolcetto $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | |
| 05.468.9 | **Fantino $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | |
| 05.291.4 | **Lobello $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Fol:0,1** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** |
| 05.567.9 | **Marzabello $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** |
| 05.304.0 | **Skate $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | |
| 05.520.4 | **Sorbetto $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** |
| 05.509.9 | **Trilly $F_1$** | **HR: Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | |
| 05.514.3 | **Valido $F_1$** | **HR: ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1** | **IR: Ma \| Mi \| Mj** |

**Aal** = Alternaria alternata sp. lycopersici
**For** = Wurzelfusarium (Fus. oxy. f. sp. **radicis** lycopersici)
**Fol** = Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)
**Ma** = Nematoden (Meloidogyne arenaria)
**Mi** = Nematoden (Meloidogyne incognita)
**Mj** = Nematoden (Meloidogyne javanica)

**On** = Echter Mehltau (Oidium neolycopersici)
**Pf** = Samtflecken (Passalora fulva, ex Fulvia fulva)
**Pst** = Pseudomonas syringae pv. tomato
**Sbl** = Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
**Ss** = Stemphylium solani
**Si** = Silberblatt (Chimera)

**ToMV** = Tomatenmosaikvirus (Tomato mosaic virus)
**TSWV** = Bronzefleckenvirus
**TYLCV** = Tomato Yellow Leaf Curl Virus
**Va** = Verticillium (Verticillium albo-atrum)
**Vd** = Verticillium (Verticillium dahliae)

Generell erfolgen der Nachweis und die Ausweisung der Resistenzen durch den Züchter der jeweiligen Sorte!



**Tomatenversuch im Seewinkel**



05.523.5 Tomate Tirouge F1



05.521.1 Tomate Tiverta F1



05.522.8 Tomate Timenta F1



05.436.8 Tomate Amorelli F1



05.289.0 Tomaten Crispino Plum F1



05.465.8 Tomate Chocostar F1



05.453.5 Tomate Cornabel F1



05.488.7 Tomate Enroza F1



05.434.4 Tomate Maitai F1



05.432.0 Tomate CubraLibre F1



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# TOMATEN (Paradeiser) Fortsetzung

## TOMATEN – SPEZIALITÄTEN und SONDERFORMEN

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife in Tagen nach Pflanzung. | ca. Frucht-gewicht | Frucht-form | Anbaueignung Freiland | Anbaueignung Treib | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cocktailtomaten** | | | | | | | |
| 05.436.8 | **Amorelli F$_1$** NS K O | 62 | 11 g | | X | X | „**Erdbeer Tomate**“, mittel-stark wüchsig; fleischige, saftige Früchte, Brix: 7,5; zeichnet sich vor allem durch ihre Fruchtform aus |
| 05.289.0 | **Crispino Plum F$_1$** NS K O | 60 | 35–40 g | oval | X | X | kleine, rote **Mini-Pflaume**ntomate mit **grünen Streifen**; für lose Ernte; 6–10 Früchte/Rispe, kräftiger, buschiger Wuchs |
| 05.465.8 | **Chocostar F$_1$** NS K O | 60 | 10–12 g | oval | | X | kleine, braune, fleischige **Mini-Pflaume**ntomate; bis zu 16 Früchte pro Rispe, gutes “Shelf-Life“, hoher Brixgehalt 8,9; für lose Ernte |
| **Runde Tomaten** | | | | | | | |
| 05.521.1 | **Tiverta F$_1$** NS K O | 65 | 110–130 g | rund | | X | mittelspäte, optisch interessante Sorte mit gelben, grün **gestreiften** Früchten; für lose Ernte |
| 05.522.8 | **Timenta F$_1$** NS K O | 65 | 110–130 g | rund | | X | mittelspäte, optisch interessante Sorte mit roten, grün **gestreiften** Früchten; für lose Ernte |
| 05.523.5 | **Tirouge F$_1$** NS K O | 65 | 110–130 g | rund | | X | mittelspäte, optisch interessante Sorte mit roten, orange **gestreiften** Früchten; für lose Ernte |
| **Fleischtomaten** | | | | | | | |
| 05.432.0 | **CubaLibre F$_1$** NS K ● | 65 | 180–300 g | flachrund | | X | **Noire de Crimee Typ** mit guter Befruchtung, flachrunde, gerippte Frucht, wohlschmeckend aromatisch; für lose Ernte |
| 05.434.4 | **Maitai F$_1$** NS K ● | 65 | 180–300 g | flachrund | | X | **Typ Ananas** mit flachrunden-runden Früchten mit sehr gutem Geschmack; für lose Ernte |
| 05.488.7 | **Enroza F$_1$** NS K ● | 65 | 180–250 g | rund | | X | **Pink** farbene Fleischtomate im Typ Berner Rose, mit dem typischen Umami Geschmack und guter Fruchtfestigkeit; für lose Ernte |
| **Tomaten Sonderform** | | | | | | | |
| 05.453.5 | **Cornabel F$_1$** NS K O | 68 | 180 g | länglich-spitz | X | X | mittelspäte, optisch interessante Rarität mit **länglich-spitzen**, fleischigen Früchten; für lose Ernte |

Sämtliche oben angeführte Sorten sind **indeterminant**, d.h. unbegrenzt wachsend.

| Art.Nr. | Sorte | Hohe Resistenz | Intermediäre Resistenz |
|---|---|---|---|
| 05.436.8 | **Amorelli F$_1$** | **HR:** Ss | **IR:** Fol:2 \| Mi \| **tolerant:** On |
| 05.465.8 | **Chocostar F$_1$** | **HR:** ToMV:0-2 \| Fol:0 \| Ss | **IR:** Mi |
| 05.453.5 | **Cornabel F$_1$** | **HR:** Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 | |
| 05.289.0 | **Crispino Plum F$_1$** | **HR:** ToMV:0-2 \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 | **IR:** Ma \| Mi \| Mj |
| 05.432.0 | **CubaLibre F$_1$** | **HR:** ToMV:0-2 \| ToANV \| **Pf** (ex Ff):**A-E** \| Fol:0,1 | **IR:** On |
| 05.488.7 | **Enroza F$_1$** | **HR:** ToMV:0-2 \| ToANV \| **Pf** (ex Ff):**A-E** \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For | **IR:** Ss |
| 05.434.4 | **Maitai F$_1$** | **HR:** ToMV:0-2 \| ToANV \| **Pf** (ex Ff):**A-E** \| Va:0 \| Vd:0 \| Fol:0,1 \| For | |
| 05.522.8 | **Timenta F$_1$** | **HR:** ToMV:0-2 \| For | GSPP |
| 05.523.5 | **Tirouge F$_1$** | **HR:** ToMV:0-2 \| For | GSPP |
| 05.521.1 | **Tiverta F$_1$** | **HR:** ToMV:0-2 \| For | GSPP |

**GSPP** = Good Seed and Plant Practices

**Aal** = Alternaria alternata sp. lycopersici
**For** = Wurzelfusarium (Fus. oxy. f. sp. **radicis** lycopersici)
**Fol** = Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)
**Ma** = Nematoden (Meloidogyne arenaria)
**Mi** = Nematoden (Meloidogyne incognita)
**Mj** = Nematoden (Meloidogyne javanica)
**On** = Echter Mehltau (Oidium neolycopersici)
**Pf** = Samtflecken (Passalora fulva, ex Fulvia fulva)
**Pl** = Pyrenochaeta lycopersici (Korkwurzel)
**Pst** = Pseudomonas syringae pv. tomato
**Sbl** = Stemphylium botryosum f. sp. lycopersici
**Ss** = Stemphylium solani
**Si** = Silberblatt (Chimera)
**ToANV** = Tomato apex necrotic virus
**ToMV** = Tomatenmosaikvirus (Tomato mosaic virus)
**TSWV** = Bronzefleckenvirus
**TYLCV** = Tomato Yellow Leaf Curl Virus
**Va** = Verticillium (Verticillium albo-atrum)
**Vd** = Verticillium (Verticillium dahliae)

Generell erfolgen der Nachweis und die Ausweisung der Resistenzen durch den Züchter der jeweiligen Sorte!

# Tomaten-Veredelungsunterlagen

05.578.5/3001 **Fortamino F$_1$** TP O
Eine Unterlage mit generativem Charakter und ausreichend Wuchskraft bei Stress in der Kultur.
**Resistenzen: HR: ToMV:0-2** / **Pf** (ex Ff): A-E / **Pl** / **Va**:0, **Vd**:0 / **Fol**:0-2 / **For**; **IR: TSWV** / **Ma, Mi, Mj**



05.585.3 Tomate Montfavet 63/5 F1



05.579.2 Tomate Goldene Königin



05.594.5 Tomate Zieglers Fleisch



05.351.4 Tomate Cour di bue



05.591.4 Tomate S. Marzano 2





05.299.9 Tomate Berner Rose



05.499.3 Tomate Sweet Million

05.500.6 Tomate Prezioso F1



05.580.8 Tomate Goldkrone



05.589.1 Tomate Red Pear



05.380.4 Tomate Green Zebra



05.518.1 Tomate Tigerella



05.281.4 Tomate Ananas



05.279.1 Tomate Andine cornue



05.292.0 Tomate Citrina



05.582.2 Tomate Kremser Perle



05.303.3 Tomate Indigo Rose



05.344.6 Tomate Eskort



05.348.4 Tomate Diabolik F1



05.347.7 Tomate Pink Bomb F1



05.346.0 Tomate Amapola F1



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# TOMATENSORTEN (Paradeiser) für Pflanzenverkauf an Hobbygärtner

## SALATTOMATEN *rund, sehr früh bis mittelfrüh reifend*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.585.3 | **Montfavet 63/5 F1** | **rote, runde,** mittelgroße Früchte. | NS K O |
| 05.579.2 | **Goldene Königin** | **gelbe, runde,** mittelgroße Früchte. | NS K O |

## FLEISCHTOMATEN *rund, spät bis spät reifend*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.594.5 | **Zieglers Fleisch** | **rote, flachrunde,** sehr große, glatte Früchte | NS K O, NS K ● |
| 05.299.9 | **Berner Rose** | **rosarote, runde/flachrunde,** mittelspäte Sorte mit großen, fleischigen Früchten . | NS K ● |

## OCHSENHERZ-TOMATEN *mittelspät bis spät reifend*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.351.4 | **Cour di bue** | typisch italienische **Ochsenherz-Tomate**, mit großen, leicht gerippten Früchten | NS K O |

## LÄNGLICHE SORTEN *mittelspät bis spät reifend*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.591.4 | **S. Marzano 2** | **rote, längliche,** kleine bis mittelgroße Früchte**; ideal für Pizza, Pasta, Suppe & Co.!** . | NS K O |

## CHERRY- UND COCKTAILTOMATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.592.1 | **Freude** | (syn. Gardener's Delight) **rote, runde** Cherrytomate mit kleinen bis mittelgroßen Früchten. | NS K O |
| 05.500.6 | **Prezioso F1** | **rote, runde,** sehr früh reifende (60 T)**,** reichtragende Cherrytomate mit sehr gleichmäßigen Rispen; wüchsige Pflanzen für die Kultur in Gewächshaus und Freiland; Fruchtgewicht ca. 15-20 g; Resistenzen: **HR**: ToMV:0-2 **\|** Va:0 **\|** Vd:0 **\|** Fol:0,1 **\| IR**: Ma/Mi/Mj | NS K O |
| 05.499.3 | **Sweet Million F1** | **rote, runde** Cherrytomate für Glashaus und Freiland; Resistenzen: **HR**: ToMV:0,1 **\|** Fol:0 | NS K O |
| 05.580.8 | **Goldkrone** | **gelbe, runde** Cherrytomate mit kleinen bis mittelgroßen Früchten. | NS K O |
| 05.589.1 | **Red Pear** | **rote, birnenförmige** Cocktailtomate mit kleinen bis mittelgroßen Früchten. | NS K O |
| 05.593.8 | **Yellow Pearshaped** | **gelbe, birnenförmige** Cocktailtomate mit kleinen bis mittelgroßen Früchten. | NS K O |

## SPEZIALITÄTEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.303.3 | **Indigo Rose** | **glänzend blauviolette, runde,** kleine bis mittelgroße Früchte, die auf rot umfärben (= optimaler Erntezeitpunkt); außerordentlich hoher Anthocyangehalt; Fruchtgewicht ca. 50 g; leicht eingerollte Blätter sind sortentypisch. | NS K O |
| 05.380.4 | **Green Zebra** | **gestreifte**, mittelgroße, runde Früchte; die Streifen färben auf gelb-orange um; durchschnittliches Fruchtgewicht ca. 80–120 g. | NS K O |
| 05.518.1 | **Tigerella** | **rot orange-gestreifte, runde**, frühe, widerstandsfähige und ertragreiche Sorte mit mittelgroßen, Früchten; Fruchtgewicht ca. 70–100 g. | NS K O |
| 05.279.1 | **Andine cornue** | (syn. Andenhörnchen) **Rarität mit hornförmigen, roten, länglich-spitzen**, aromatischen, ca. 80–150 g schweren Früchten mit wenig Saftanteil und Samen. | NS K O |
| 05.281.4 | **Ananas** | **gelbe, rot-geflammte,** große, flachrund gerippte Früchte (kernarm); Fruchtgewicht ca. 240–400 g. | NS K O |
| 05.292.0 | **Citrina** | **gelbe, zitronenförmige** mittelgroße Früchte; bildet ausladende Rispen mit bis zu 30 Früchten mit Ø Fruchtgewicht von ca. 80 g; nur 3–4 Rispen je Pflanze belassen! | NS K O |

## BUSCHTOMATEN *und determiniert/begrenzt wachsende Sorten - auch für´s Hochbeet!*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.582.2 | **Kremser Perle** | **rote, runde** sehr frühe **Salattomate**; bringt saftige, kleine bis mittelgroße Früchte | NS K O |
| 05.344.6 | **Eskort** | **rote, hochrund-ovale,** frühe **Saucen-Tomate**; leicht zu ernten, denn die festen Früchte wachsen über dem Laub und eignen sich hervorragend für Pasta, Pizza, Saucen, Suppen und zum Einlegen (geschält). | |
| 05.348.4 | **Diabolik F1** | **hellrote, länglich-ovale,** frühe **Salattomate**; **determinant** wachsende Hybridsorte; das durchschnittliche Fruchtgewicht liegt bei ca. 100-140 g. Resistenzen: **HR:** Pst **\|** Fol: 0-1 **\|** Ss **\|** Vd:0, **IR**: TSWV **\|** Mi | NS K O |
| 05.347.7 | **Pink Bomb F1** | **rosafarbene runde,** sehr frühe (68 T), **große Fleischtomate** ohne Grünkragen; **determinant**, mittelstark wachsende Hybridsorte; guter Geschmack; Fruchtgewicht durchschnittlich ca. 180-210 g; Resistenzen: **HR:** ToMV:0-2 **\|** Ff: A-E **\|** Fol:0,1 **\|** Vd:0 **\| IR**: Mi | NS K O |
| 05.346.0 | **Amapola F1** | **leuchtend rote**, große **Fleischtomate** Typ Ochsenherz; **determinant** wachsend, kann als Busch kultiviert werden; gute Haltbarkeit am Lager (Long shelf Life); Fruchtgewicht durchschnittlich ca. 240-290 g; Resistenzen: **HR:** Aal **\|** Fol:0,1 **\|** Ss **\|** Vd:0 **\| IR**: TSWV **\|** TYLC | NS K O |

**Resistenzen:**

**Aal** = Alternaria alternata sp. lycopersici
**Ff** = Samtflecken (Fulvia fulva, ex Cladosporium fulvum)
**Fol** = Fusarium (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)
**Ma** = Nematoden (Meloidogyne arenaria)
**Mi** = Nematoden (Meloidogyne incognita)
**Mj** = Nematoden (Meloidogyne javanica)
**Pst** = Pseudomonas syringae pv. tomato
**Ss** = Stemphylium solani
**ToMV** = Tomatenmosaikvirus (Tomato mosaic virus)
**TSWV** = Bronzefleckenvirus
**TYLCV** = Tomato Yellow Leaf Curl Virus
**Va** = Verticillium (Verticillium albo-atrum)
**Vd** = Verticillium (Verticillium dahliae)



05.556.3 Topf-Tomate Aztek



05.557.0 Topf-Tomate Venus



05.504.4 Topf-Tomate Totem F1



05.558.7 Topf-Tomate Vilma



05.535.8 Hänge-Tomate Tumbling Tom Red



05.536.5 Hänge-Tomate Tumbling Tom Yellow

## Topf-Tomaten

05.311.8 **Divinity F1** .....*NS* K O
- ❑ determinante Topftomate
- ❑ rote Früchte, ø Gewicht 45–50 g

05.504.4 **Totem F1** .....*NS* K O
- ❑ bringt runde, rote Früchte mit einem Fruchtgewicht von 25–35 g

05.558.7 **Vilma** .....*NS* K O
- ❑ rote Früchte
- ❑ kompakter Wuchs
- ❑ Fruchtgewicht 15–20 g
- ❑ für Topf, größere Container, Hochbeet

05.556.3 **Aztek** .....*NS* K O
- ❑ gelbe Früchte
- ❑ kompakter Wuchs
- ❑ Fruchtgewicht 15–20 g
- ❑ für Topf, größere Container, Hochbeet

05.557.0 **Venus** .....*NS* K O
- ❑ orange Früchte
- ❑ kompakter Wuchs
- ❑ Fruchtgewicht 15–20 g
- ❑ für Topf, größere Container, Hochbeet

## Hänge-Tomaten

### Tumbling Tom
- ❑ hängende Topf- bzw. Balkontomaten
- ❑ sehr schöner Habitus **in Ampeln**
- ❑ Pflanzenlänge ca. 50 cm
- ❑ Fruchtdurchmesser 2–4 cm
- ❑ Hellfrucht-Typ

05.536.5 **Tumbling Tom Yellow** .*NS* K O
05.535.8 **Tumbling Tom Red**.....*NS* K O



05.311.8 Topf-Tomate Divinity F1



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# ZWIEBEL

## Sommerzwiebel | Überwinterungszwiebel | Bundzwiebel






**Sommerzwiebel**
**Wiro**
**samenfest + bio**

AT-BIO-401



**Sommerzwiebel**
**Wiener Bronzekugel**
**samenfest + bio**

AT-BIO-401



05.620.1 Zwiebel Ailsa Craig




05.698.0 Fleischerzwie. Exhibition



05.705.5 Zwiebel MSX 101005 $F_1$



05.694.2 Zwiebel Crockett $F_1$



05.689.8 Zwiebel Nevada



05.657.7 Wiener Bronzekugel



05.660.7 Zwiebel Wiro



05.629.4 Bundzwiebel Tundra



05.603.4 Bundzw. Interstellar $F_1$



05.747.5 Zwiebel Red Lady $F_1$



05.599.0 Bundzwiebel Yoda $F_1$



05.604.1 Bundzwiebel Red Toga



05.725.3 Schnittzwiebel Parade



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# ZWIEBEL *Allium cepa L*

## Sommerzwiebel

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 g | 2,8-3,2 kg (ø 3 kg) oder ca. 750.000 Korn | Ende Februar – Ende März | – | 30–40 od. Beetsaat*) (ca. 22 cm) *) meist in Doppelreihe | August – Okt. | 30–80 t |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | | Reife 90–120 Tage nach Aufgang | Zwiebel Größe | Zwiebel Form | Zwiebel Schale | Lager-fähigkeit | Schoss-resistenz | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Braun- und gelbschalige Sorten** (z.B. amerikanische, spanische, italienische, Rijnsburger Typen und Mischtypen ) | | | | | | | | | |
| 05.705.5 | **MSX 101005 F$_1$** | PR Ⓚ, PR Ⓚ O | mittel | groß | rund | bronze-gelb | sehr gut | sehr gut | Kreuzung Amerikaner x Italiener mit hohem Ertrag, schalenfest, Lagerung bis März |
| 05.694.2 | **Crockett F$_1$** | PR Ⓚ, PR Ⓚ O | mittel | groß | rund - hochrund | dunkel-braun | sehr gut | sehr gut | Kreuzung Amerikaner x Spanier; auch für Trockengebiete und Schälbetriebe geeignet; Resistenzen: **IR**: Foc \| Pt |
| 05.657.7 | **Wiener Bronzekugel** | PR Ⓚ O+), PR Ⓚ ●+) | mittel-spät | groß | rund | bronze | sehr gut | sehr gut | sehr gute Lagereignung, sehr starkes Wurzelsystem, für Trockengebiete, schalenfest |
| **Rotschalige Sorten** | | | | | | | | | |
| 05.747.5 | **Red Lady F$_1$** | PR Ⓚ O | mittel | mittel - groß | hochrund | dunkelrot | sehr gut | sehr gut | dunkelrote Außenfarbe, intensive Innenfärbung; sehr gute Lagerfähigkeit; Resistenz: **IR**: Pt |
| 05.660.7 | **Wiro** | PR Ⓚ O+), PR Ⓚ ●+) | mittel | mittel - groß | rund | dunkelrot | sehr gut | sehr gut | gut durchfärbte rote Zwiebel mit sehr guter Lagereignung; Standard; sehr starkes Wurzelsystem |
| **Spezialitäten** | | | | | | | | | |
| 05.689.8 | **Nevada** | NS Ⓚ O+) | mittel | mittel | rund | weiß | gut | gut | **weiße** Qualitätssorte für mittelfristige Lagerung |
| 05.620.1 | **Ailsa Craig** | NS Ⓚ O+) | mittel-spät | sehr groß | rund - hochrund | gelb-braun | kurz | — | Jausenzwiebel mit mildem Geschmack; vorrangig für Pflanzkultur |
| 05.698.0 | **Exhibition** | PR Ⓚ+), PR Ⓚ O+) | spät | sehr groß | rund | gelb-braun | kurz | — | **"Fleischer-Zwiebel"**; besonders geeignet für Pflanzkultur; Resistenz: **IR**: Foc; Saatgutbedarf pro ha: 250.000–400.000 K. |

**1 EH (Einheit) = 250.000 Korn = ca. 1 kg** **+) auch in Kleinmengen (ab 10.000 K.)**

**IR** = **intermediäre (mittlere) Resistenz**
**Pt** = Pyrenochaeta terrestris (Rosa Wurzelfäule)
**Foc** = Fusarium oxysporum f. sp. cepae (Zwiebelbasalfäule)

## Bundzwiebel

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| **Bundzwiebel ohne (bzw. mit leichter) Zwiebelbildung** ***(Allium fistulosum L.)*** - Saatgutbedarf pro ha: 1,25–1,75 Mio. Korn | | | |
| 05.725.3 | **Parade** | PR Ⓚ ●+) | sehr früher Lauchzwiebel ohne Zwiebelbildung, für Ganzjahresanbau; etwas länger im Laub als Performer; auch als Schnittlauchersatz geeignet; Resistenzen: **IR**: Foc \| Pt |
| 05.599.0 | **Yoda F$_1$** | NS Ⓚ | sehr schönes dunkelgrünes Laub, stark aufrechter Wuchs; sehr gleichmäßig, gesund und relativ schnell; für den ganzjährigen Anbau; sehr leicht zu putzen; sehr ertragreich; die Feldhaltbarkeit ist sehr gut |
| 05.603.4 | **Interstellar F$_1$** | NS Ⓚ O | sehr wüchsig, schön stahl-blau gefärbt, straff aufrechter Wuchs; besonders für den Sommer- und Herbstanbau; das wachsige Laub gibt einen gewissen Schutz gegen Mehltau, besonders in der zweiten Jahreshälfte |
| 05.685.0 | **Palmyra F$_1$** | PR Ⓚ | intermediärer Typ (fistulosum x cepa) mit leichter Zwiebelbildung; aufrechte Pflanzen mit kräftigem Wachstum; attraktive, dunkelgrüne Farbe; kräftiges Laub; einfach zu putzen, hohe Gleichmäßigkeit |
| 05.604.1 | **Red Toga** | NS Ⓚ O | winterharte Lauchzwiebel mit attraktiver, roter Farbe; bildet lange Schäfte mit geringer Zwiebelbildung; sehr schmackhaft, mildes Aroma; für den Ganzjahresanbau; die Sorte bildet mehrjährige horstartige Bestände |
| **Bundzwiebel mit Zwiebelbildung** ***(Allium cepa L.)*** - Saatgutbedarf pro ha: 5–7 kg bzw. 1,25–1,75 Mio. Korn | | | |
| 05.629.4 | **Tundra** | NS 🛆 O | bildet im Erntestadium hochovale, weiße Zwiebeln aus; fester Hals; leichte Putzarbeit; kräftig; Ganzjahresanbau; für Überwinterung Anbau vom 15. August bis 10. September. Bild siehe nächste Seite. |

Ⓚ **1 EH (Einheit) = 250.000 Korn = ca. 1 kg** **+) auch in Kleinmengen (ab 10.000 K.)**

# Säschalotten für Frühjahrsaussaat

| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | ca. Reife Tage nach Aufgang | Zwiebel Größe | Zwiebel Form | Zwiebel Schale | Lager-fähigkeit | Schoss-resistenz | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.840.3 | **Ambition F1** PR Ⓚ +) | 120 | groß | rund | rotbraun | gut | sehr gut | Aussaat Anfang bis Mitte April, Ernte August. Saatgutbedarf (Ablage in der Reihe ca. 3 cm): 175.000–200.000 Korn/1.000 m² |
| 05.844.1 | **Conservor F1** PR Ⓚ +), PR Ⓚ ● +) | 120 | groß | länglich/ hochrund | rotbraun | gut | sehr gut | |

Ⓚ 1 EH (Einheit) = 250.000 Korn = ca. 1 kg  +) auch in Kleinmengen (ab 10.000 K.)

## Säschalotten für Frühjahrsaussaat - Sonderformen

05.612.6 **Zébrune** PR Ⓚ
Typ Echalion. Rosig braune Zwiebel mit rosiger Innenfarbe und feinem Hals. Gute Schossfestigkeit. Aussaat März-April. Ernte ab August. Wohlschmeckend, aromatisch und sehr ertragreich. Geschmack zwischen Schalotte und Zwiebel für Frisch- und Industriemarkt. Lange Lagerung möglich. 83-86 Korn pro Laufmeter

05.611.9 **Figaro** PR Ⓚ
Schalenfester, bronze-gelber Typ Echalion mit hohem Ertrag. Lange bananenförmige Zwiebel, kupferbraune glänzende Zwiebel mit weißem Fleisch. Aussaat März bis Mai. Ernte August-September. Gute Schossfestigkeit. Sehr guter Geschmack. Sehr gut Lagerfähig. 83-86 Korn pro Laufmeter

# Überwinterungszwiebel

| 1.000 Korn Gewicht ca. | Saatgutbedarf pro ha | Saat-termin | Pflanz-termin | Standweite in cm | Ernte-termin | Ertrag pro ha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–4 g | 0,75–1,0 Mill. K. Bundzwiebel: 5-7 kg | 15.-25. August abhängig von der Sorte) | – | 30–40 oder Beetsaat | Juni – Juli | 40–60 t |




| Artikel-Nr. | Sorten und lieferbare Saatgutformen | Reife | Zwiebel Größe | Zwiebel Form | Zwiebel Schale | Lager-fähigkeit | Schoss-resistenz | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.619.5 | **Sonic F1** PR Ⓚ | sehr früh | mittel | rund | braun-gelb | kurz | gut | dünner Hals, gute Schalenfestigkeit, uniform in Form und Abreife |
| 05.683.7 | **Telesto F1** *NEU* PR Ⓚ, PR Ⓚ O | früh | mittel - groß | rund | braun | sehr gut | gut | Zwiebelgröße 50–70 mm; hohes Ertragspotential |
| 05.653.9 | **Thalassa F1** *NEU* PR Ⓚ, PR Ⓚ O | mittelspät | groß | halbrund - rund | braun-gelb | gut | gut | gute Schalenfestigkeit; starkes Wurzelsystem; Zwiebelgröße 60–70 mm; etwas schneller als Galatea F1 |
| 05.683.6 | **Galatea F1** PR Ⓚ | mittelspät | mittel | rund | braun-gelb | gut | mittel | sehr uniform in Form und Abreife, schalenfest |
| 05.618.8 | **Red Glamour F1** PR Ⓚ, PR Ⓚ O | früh - mittel | mittel - groß | halbrund - rund | dunkelrot | beschränkt | gut | rote Winterzwiebel Hybride, sehr gute Winterhärte, gleichmäßige Abreife |

## Bundzwiebel für Überwinterung

| | | |
|---|---|---|
| 05.629.4 | **Tundra** NS O | Ideale Sorte zur Überwinterung. Anbau ab 20. Juli für Überwinterung mit Risiko möglich. Normale Anbauzeit zwischen 15. August und 10. September. Fester Hals, leichte Putzarbeit. Saatgutbedarf ca. 5–6 kg/ha. |
| 05.604.1 | **Red Toga** NS Ⓚ O | winterharte Lauchzwiebel mit attraktiver, roter Farbe; bildet lange Schäfte mit geringer Zwiebelbildung; sehr schmackhaft, mildes Aroma; für den Ganzjahresanbau; die Sorte bildet mehrjährige horstartige Bestände |

Ⓚ 1 EH (Einheit) = 250.000 Korn = ca. 1 kg  +) auch in Kleinmengen (ab 10.000 K.)


05.840.3 Säschalotte Ambition F1


05.683.6 Zwiebel Galatea F1


05.653.9 Zwiebel Thalassa F1


05.683.7 Zwiebel Telesto F1


05.844.1 Säschalotte Conservor F1


05.618.8 Zwiebel Red Glamour F1


05.629.4 Bundzwiebel Tundra


05.604.1 Bundzwiebel Red Toga



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# STECKZWIEBEL, SCHALOTTEN, KNOBLAUCH — PFLANZGUT



**Steckzwiebel**

## Sommersteckzwiebel

Pflanzgutbedarf: 600 (Sortierung 8/15) bis 1.500 (Sortierung 15/21) kg/ha. 25 Zwiebeln pro Laufmeter in Streusaat. (Pflanzung März); Ertrag 40 t/ha bei guter Kultur.

**Setton F$_1$** O
früheste Sorte
05.861.8 Sort. 10/21

**Stuttgarter gelb** O
Mittelfrühe, runde, ockerfarbene Sorte.
Ertrag 50 t/ha bei guter Kultur.
05.803.8 Sort. 12/21

05.781.9 **Karmen F$_1$**, Sort. 12/21 O
rubinrote Sorte mit starkem Wurzelsystem

## Überwinterungssteckzwiebel

Ablage ca. 25–30 Zwiebeln pro Laufmeter in Streusaat. Pflanzgutbedarf: ca. 1.300 kg/ha ohne Bewässerung, ca. 1.500 kg/ha mit Bewässerung. (Pflanzung ca. 5. September)

05.866.3 **Shakespeare**, Sort. 12/21 O
05.812.0 **Senshyu Yellow** Sort. 12/21 O

Weitere Sorten und Sortierungen auf Anfrage.



**Knoblauch White Messidrome**



**Knoblauch Purple Germidour**

## Schalotten

Pflanzgutbedarf für 100 m² bei 12–15 cm Pflanzenabstand und 25 cm Reihenabstand: ca. 10 kg. Bei zu früher Pflanzung können Schosser auftreten.

90.569.1 **Golden Gourmet**, Sort. 7/14
gelbschalig

05.823.6 **Red Sun**, Sort. 7/14
beste rotbraune, ertragssichere Sorte

## Knoblauch zur Frühjahrspflanzung

Pflanzgutbedarf für 100 m² bei 15 cm Pflanzenabstand:
6 kg bei 25 cm Reihenabstand,
10 kg bei 15 cm Reihenabstand.
Pflanzung Anfang April

90.572.1 **Morado**

## Knoblauch zur Herbstpflanzung

Pflanzgutbedarf für 100 m² bei 15 cm Pflanzenabstand:
6 kg bei 25 cm Reihenabstand,
10 kg bei 15 cm Reihenabstand.
Pflanzung Mitte September bis Mitte Oktober

**White Messidrome**
Französischer Typ mit weißer Färbung.
05.791.8 White Messidrome, Sort. 50/60

**Purple Germidour**
Französischer Typ mit violetter Färbung.
05.795.6 Purple Germidour, Sort. 40/50
05.794.9 Purple Germidour, Sort. 50/60
05.793.2 Purple Germidour, Sort. 60/+

# NASCHGARTEN

## Erdbeeren | Physalis | Melonenbirne



**Melonenbirne**
00.370.0



**Erdbeere**
**Toscana F1**
13.576.0

## Andenbeere, Inkapflaume
## Physalis *(Physalis edulis)*

06.825.9 **Physalis Schönbrunner Gold** *NS* K O
- ❑ besonders großfrüchtige Sorte



**06.825.9 Physalis edulis Schönbrunner Gold**

## Melonenbirne
## Pepino dulce *(Solanum muricatum)*

00.370.0 **Melonenbirne** ..... *NS* K O
- ❑ Die Früchte sind violett gestreift und eiförmig rund. Das Fruchtfleisch schmeckt etwas nach Melone und Birne.



**13.576.0 Hängeerdbeere Toscana F1**

## Erdbeeren
## Fragaria *(Fragaria ssp.)*

### Hänge-Erdbeeren
Aussaat: Oktober bis März; Ernte ab März

13.576.0 **Toscana F1** ..... *NS* K O
- ❑ bis zu 4 cm große, **karminrosa** Blüten
- ❑ Aussaat bis Blüte: 14–15; Aussaat bis Ernte: 17–18 Wochen
- ❑ Ernte ca. 1 kg pro Pflanze

13.571.5 **Grande F1** ..... *NS* K O
- ❑ ca. 4 cm große, pinkfarbene Blüten
- ❑ gute Kombination mit Fragaria Toscana
- ❑ sehr geschmackvolle, große Früchte
- ❑ Blüte 14-15 Wochen nach Aussaat
- ❑ Früchte 17-18 Wochen nach Aussaat

### Monats-Erdbeeren
Aussaat März, Ernte Mai bis September

06.100.7 **Großfrüchtige Alexandria** ..... *NS* O
- ❑ sehr große, voll ausfärbende Früchte mit aromatischem Geschmack
- ❑ reichtragend

06.110.6 **Rügen Selecta** ..... *NS* O
- ❑ die Früchte zeigen die echte Rügenform, das heißt sie sind leicht zugespitzt



**13.571.5 Hängeerdbeere Grande F1**



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

# KRÄUTER SAMEN



## Sortiment 2024












05.914.1 Basilikum Hohes Grünes Superbo



05.770.3 Basilikum Verdano



05.766.6 Basilikum Royal



05.758.1 Basilikum Basego



05.771.0 Basilikum Eleonora

# KRÄUTER
## Samen-Sortiment 2024

05.902.8 **Anis** *Pimpinella anisum* (40–50 cm) ⊙ | *NS* O (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 3–4 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 15 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 25 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 1 kg/1.000 m²<br>Keimdauer 21 Tage, warm!<br>Neutral- u. Lichtkeimer | III–IV | 20–30 cm | VIII–IX, …die reifen Samen, sobald der Stängel gelb, bzw. die Dolde braun wird. | Gewürz für Backwerk, Brote, Likör, Tee, Hustensaft |

05.908.0 **Baldrian** *Valeriana officinalis* (150 cm) ⊙ -24
*Syn.: Hexenkraut, Katzenkraut*
*NS* O (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 0,3 - 1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 5 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 300-500 g/1.000 m²<br>Keimdauer: 28T., 18°C, Lichtkeimer | III–V | 30–50 cm | Ab dem 2. Jahr können von IX - XI die Wurzeln geerntet werden. | Die Wurzeln enthalten Öl, welches das Nervensystem beruhigt. |

**Kulturhinweis:** Erst nach 4-5 jähriger Pause wieder nach sich selbst anbauen. Leichte Böden haben geringere Inhaltsstoffgehalte zur Folge. Vorfrucht am besten Getreide (außer Wintergerste), keinesfalls Pflanzen aus der selben botanischen Familie (z.B. Feldsalat).

**Basilikum** *Ocimum basilicum, frostempfindlich* ⊙
*Syn.: Balsam, Basilienkraut, Königskraut, Suppenbasil*
(Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 1,8 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 15-20 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 4 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 300-500 g/1.000 m²<br>Keimdauer 14–21 Tage bei 20–25°C; Lichtkeimer | IV–V | 30 x 20 cm<br>40 x 25 cm | Geerntet werden die jungen Blätter und Triebe kurz vor der Blüte. | Für Salate, Fleisch, Soßen und Würste. |

**Kulturhinweis:** Direktsaat ist ab Anfang Juni prinzipiell möglich, jedoch wird die Kälteempfindlichkeit von Basilikum in Kombination mit der langen Keimdauer besonders in kühlen Lagen zum Problem (Vliesabdeckung vorteilhaft!).

### Genoveser Basilikum

05.758.1 **Basego** (ca. 30 cm), **fusariumgetestet**: kompakter und uniformer Wuchs; besonders für Topfkultur geeignet; wird durch die kurzen Internodien nicht so schnell überständig und ist daher über einen sehr langen Zeitraum attraktiv; glänzendes, dunkelgrünes und blasiges Laub — *NS* K O

05.770.3 **Verdano** (ca. 45 cm): wurde besonders für die lichtarme Zeit entwickelt; kompakter Genoveser-Typ mit dunkelgrüner Farbe; durch den uniformen Wuchs besonders für die Topfkultur geeignet — *NS* K O

05.766.6 **Royal** (ca. 40–50 cm): widerstandsfähig gegen Falschen Mehltau; glänzend dunkelgrünes, leicht blasiges Blatt mit sehr intensivem Aroma; ausgeglichener Wuchs, für Frischmarkt und Industrie — *NS* K O

05.915.8 **Hohes Grünes Superbo** (45–60 cm): auch für Topfkultur — *NS* O, *NS* ●, *TP-MP* O*)
*) TP-Multipill (8–10 Korn/Pille); Pillengröße 3,75–4,5 mm

05.914.1 **Hohes Grünes Superbo** (45–60 cm): **fusariumgetestet**, auch für Topfkultur — *NS* K O

05.946.2 **Gemini** (30–40 cm) — *NS* K O
Genoveser-Typ mit kleineren, flacheren Blättern als Superbo. Für Topf, Gewächshaus und Freiland.
Resistenzen (IR): Fob: Fusarium oxysporum f.sp. basilicum, Pb: Peronospora belbahrii (Falscher Mehltau).

05.771.0 **Eleonora** (ca. 40 cm): Wüchsige Sorte mit längeren Internodien. — *NS* K O
Widerstandsfähig gegen Falschen Mehltau. Für Topfproduktion, Freilandanbau, Industrie.

05.774.1 **Evi** *NEU* (30–40 cm): Dunkelgrüner Genoveser-Typ mit starker Resistenz gegen — *NS* K O, *NS* ●
Falschen Mehltau. Für Frischmarkt und Topfkultur.

05.763.5 **Marian** (25–30 cm): Topf-Basilikum im Genoveser Typ. Kompakt wachsend, kurze Internodien, guter Geschmack. Robust gegen Pack- und Transportschäden; für Hydroponic geeignet. — *NS* K O

### Rotblättriges Basilikum

05.919.6 **Rosie** (20–30 cm): Topftyp mit kurzen Internodien. Intensiv dunkelrote Farbe, kompakter, aufrechter Aufbau und kräftige Stiele. Geeignet für den Topf- und Frischmarktanbau. — *NS* K O

05.750.5 **Dark Opal** (20–50 cm): Dunkel(violett)rote, mittelgroße, aromatische Blätter; für Topf geeignet. — *NS* ●

05.751.2 **Red Rubin** (20–30 cm): Aufrechter, kompakter Wuchs, intensiv Rot, für Topfkultur geeignet. — *NS* K O

### Griechisches Basilikum

05.911.0 **Gythis** (ca. 20 cm): hebt sich durch die hellgrüne Farbe von anderen Sorten ab; beginnt spät zu blühen und kann so zu sehr dekorativen „Großpflanzen" herangezogen werden — *NS* O

05.910.3 **Manos** (ca. 25 cm): sehr schöne, olivfarbene Blätter; der ideale Partner zu Gythis; der intensive Geruch soll Gelsen vertreiben; lässt sich auch in größeren Töpfen zu schönen Kugeln heranziehen — *NS* O

### Dekoratives Basilikum

05.761.1 **Limoncello** (ca. 40 cm): das hellgrüne Laub verströmt eine dezente Zitronennote; reinweiße Blüten; eignet sich zur Topfproduktion sowohl als dekorative „Laubpflanze", als auch mit Blüte. — *NS* K O

### Exotic-Basilikum

05.917.2 **Lemonette** (25–30 cm): kompakt, kleinblättrig, intensives Zitronen-Aroma, auch für Topfkultur — *NS* O

05.913.4 **Siam Queen** (30–35 cm): **Thai-Basilikum**, großblättrig, intensiver, interessanter Geschmack zwischen Zimt und Anis, auch für Topfkultur — *NS* O

05.912.7 **Cinnamonette** (40–50 cm): große Blätter mit Zimt-Aroma, auch für Topfkultur — *NS* O



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen



**05.911.0 Basilikum Gythis**



**05.910.3 Basilikum Manos**



**05.913.4 Basilikum Thai Siam Queen**



**05.946.2 Basilikum Gemini**



**05.917.2 Basilikum Lemonette**



**05.912.7 Basilikum Cinnamonette**



**05.750.5 Basilikum Dark Opal**



**05.751.2 Basilikum Red Rubin**



**05.919.6 Basilikum Rosie**



**05.774.1 Basilikum Evi**



**05.763.5 Basilikum Marian**



**05.761.1 Basilikum Limoncello**



05.922.6 Bergbohnenkraut



05.986.8 Bibernelle



05.993.6 Blutampfer Bloody dock



05.925.7 Boretsch



05.938.7 Dill Hera

**05.918.9 Beifuß** *Artemisia vulgaris* (150 cm) — NS O (Min. 5 g) — Tausendkorngewicht: 0,6–1,0 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 2–3 g/1.000 Pflanzen<br>Keimdauer 14-24 Tage<br>Lichtkeimer<br>Kulturhinweise: Beifuß nicht aussamen lassen, wird sonst zur Plage! | ab II oder Herbst | 40 x 50 cm | ...Blütenstände, kurz vor dem Aufblühen. Keine Blätter an den Blütenstängeln lassen, sie schmecken bitter! | Würze für Fleisch, Schmalz, Gänse-, Enten-, Hammel-, und Schweinsbraten. |

**05.922.6 Bergbohnenkraut** *Satureja montana* (30–40 cm) *Syn.: Winterbohnenkraut* — NS O (Min. 5 g) — Tausendkorngewicht: 0,7–1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Direktsaat: 500 - 700g/1.000 m²<br>Keimdauer 14–21 Tage | V–VII | 50 x 40 cm | Junge Blätter kurz vor der Blüte. | Wie einjähriges Bohnenkraut. |

**05.986.8 Bibernelle** *Sanguisorba minor* (bis 60 cm) *Syn.: Bockspetersilie* — NS O (Min. 10 g) — Tausendkorngewicht: 6–8 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 80 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 15 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 5 kg/1.000 m²<br>Keimdauer 14 - 28 Tage | IV–V | 20–25 cm | Kraut: VI - IX<br>Wurzeln: Spätherbst bzw. Frühjahr | Für Salate, Fisch, Suppen, Kräutermischungen, Eierspeisen. |

Kulturhinweis: Nicht nach sich selbst oder nach anderen Doldenblütlern (*Umbelliferae* bzw. *Apiaceae*) anbauen. Im Jugendstadium salzempfindlich; daher Grunddüngung im Herbst geben, bzw. können zu hohe Düngergaben in trockenen Jahren wachstumshemmend wirken .

**05.993.6 Blutampfer** **Bloody dock** (40–80 cm) *Rumex sanguineus* — NS O (Min. 1 g) — Tausendkorngewicht: 1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Kultur | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 25 g/1.000 Töpfe<br>Keimdauer 2–3 Wochen | ganzjährig | im 9 cm-Topf | laufend | Beigabe zu Gemüsesuppen und Salaten, zur Dekoration |

**05.920.2 Bohnenkraut** *Satureja hortensis L.* (30-60 cm) *Syn.: Pfefferkraut, Käsekraut, Satrei, Wurstkraut* — NS O, NS ● (Min. 10 g) — Tausendkorngewicht: 0,6–0,8 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 10 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 2 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 800 g/1.000 m²<br>Keimdauer 12–21 T. Lichtkeimer | IV–V | 20 x 25 cm | Das Kraut kurz vor bzw. spätestens zur Vollblüte (ca. im Juli) wenn der Stängel noch weich ist. | Für Hülsenfrüchte; zum Einlegen von Gurken, Salatgewürz, Pfefferersatz in Leberwurst. |

**05.925.7 Boretsch** *Borago officinalis* (30-80 cm) *Syn.: Gurkenkraut* — NS O (Min. 10 g) — Tausendkorngewicht: 20 - 30 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Direktsaat: 5–6 kg/1.000 m²<br>Topfkultur: 150 g/1.000 Töpfe<br>Keimdauer 10-15 T.,Dunkelkeimer | III–VII | 30 cm | Junge Blätter und Triebspitzen | Für Salate und Rohkostgerichte, verliert beim Kochen den Geschmack |

Hinweis: Boretschblüten kann man frisch essen, kandieren oder zur Blaufärbung von Essig verwenden.

**05.959.2 Brunnenkresse** *Nasturtium officinale* — NS O (Min. 10 g) — Tausendkorngewicht: 0,2 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| 8–10 g/m². Aussaat in Kistchen. Die Sämlinge werden, sobald sie einige Blätter haben, ins Wasser gestellt, wobei die Spitzen der Pflänzchen aus dem Wasser ragen müssen. Keimdauer 6–8 Tage | V–VIII | **Standort im sauberen und klaren Wasser; braucht einen „feuchten Fuß“.** | Triebspitzen VIII-V | Wie Gartenkresse als Zugabe zu Salaten und Kräutersoßen. Brunnenkresse hat einen scharfwürzigen Geschmack. |

Hinweis: Im Winter tiefer ins Wasser setzen - vermindert Frosteinwirkung! Achtung: **Sauber produzierte Brunnenkresse ist der in freier Natur gesammelten Wildpflanze unbedingt vorzuziehen!** Der Verzehr wild gesammelter Pflanzen ist bedenklich, weil oft die Reinheit der Gewässer bzw. die Wasserqaulität nicht einwandfrei ist!

**Dill** *Anethum graveolens* (Wuchshöhe siehe Sorten) *Syn.: Dille* — (Min. 50 g) — Tausendkorngewicht: 0,9 - 2,1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 20 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 3 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 3–4 kg/1.000 m²<br>Keimdauer 7–14 Tage | IV–VI | 20–25 cm | Junge Blätter, Samen. | Getrocknet und frisch zu Salat, Spinat, Gurke und Pilzen; zu Kräuteressig. |

| | | |
|---|---|---|
| 05.939.4 | **Dill farnblättrig** (ca. 50 cm). Dunkelgrün, besonders für Topfkultur | NS K O |
| 05.932.5 | **Dill Dukat** (bis 100 cm). Eine Sorte, die sehr früh geerntet werden kann, und daher besonders für die Treibkultur geeignet ist. Mittlere Resistenz gegen Falschen Mehltau. | NS O |
| 05.933.2 | **Dill Tetra** (bis 100 cm). Eine Dillsorte mit enorm viel Blattmasse. Die Pflanzen sind schnellwachsend und bringen sehr viel hellgrünes Laub, das sehr aromatisch ist. | NS O, NS ● |
| 05.938.7 | **Dill Hera** (bis 100 cm). Spätschossender Dukattyp mit blaugrüner Blattfarbe, enorm viel Blattmasse, straffer Pflanzenaufbau. Für Sommeranbau geeignet. | NS O |
| 05.941.7 | **Dill Topaz**. Sehr dunkelgrüne Selektion; sehr spätschossend; intensiver Geschmack; geeignet für die Produktion im Topf; reich an Blättern mit wenig Stiel | NS O |

Kulturhinweis: Bei Aussaat und Düngung ist die spätere Nutzung entscheidend! Sollen die Körner genutzt werden werden ca 3 g/m² ausgesät und phosphorbetont gedüngt. Wenn es um die Blatternte geht, soll die Aussaatstärke bei ca. 4 g/m² liegen und die Kultur ausreichend mit Stickstoff versorgt sein (Achtung: Stickstoffüberdüngung kann zum Lagern führen!)

**Echinacea** siehe Roter Sonnenhut ..... *siehe Seite 131*

05.940.0 **Estragon,** Russischer *Artemisia dracunculus* (bis 150 cm), *Syn.: Esdragon, Bertram, Dragon*

NS O (Min. 5 g) | **Tausendkorngewicht:** 0,2–0,3 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 4 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 0,8 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 3 - 4 kg/ha<br>Keimdauer 8–12 T., Lichtkeimer | III–IV | 40-70 x 60 cm | Junge Blätter und Triebspitzen | Zur Senferzeugung, sowie für Soßen, Gurken, Salate und Kräuteröl. |

Kulturhinweis: Eine mechanische Unkrautbekämpfung am Feld ist aufgrund der Ausläuferbildung nur sehr früh in der Kultur möglich!

05.945.5 **Gewürzfenchel** *Foeniculum vulgare Miller* (bis 2 m), *Syn.: Großer bzw. Süßer Fenchel*

NS O (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 3,5 - 7,0 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 20 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 10 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 400 - 600 g/1.000 m²<br>Keimdauer 15–20 Tage | III | 40 x 50 cm | Reife Samen | Für Tee. |

21.195.2 **Hirschhornwegerich** NEU *Plantago coronopus* (Höhe ca. 20 cm)

NS ● | **Tausendkorngewicht:** 0,3 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Direktsaat: 2 g/1.000 m²<br>Keimtemperatur 10–15°C<br>Keimdauer 10–14 Tage<br>Lichtkeimer | Freiland: VI–VIII<br>Vorkultur: III–IV | Freiland: 30 x 30 cm<br>Vorkultur: 20 x 25 cm | Ca. 8 Wochen nach der Aussaat. Einzelne Blätter oder knapp über dem Herz abschneiden, damit die Pflanzen neu austreiben. | Junge Blätter für Salat, ältere Blätter werden wie pinat zubereitet. Nussig-würziger bis salziger Geschmack. |

Hinweis: Tiefverzweigte Pfahlwurzel. Ganzjährige Ernte ist mögich. Auch für geschützten Anbau als Wintergemüse.
Hirschhornwegerich ist für eine Ergänzung von Baby-Leaf-Mischungen gut geeignet.

27.065.2 **Johanniskraut** *Hypericum perforatum L.* (60 cm), *Syn.: Hartheu*

NS O (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 0,1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 1 g/1.000 Pflanzen (7-10 Korn/Würfel)<br>Direktsaat: 500 g/ha<br>Keimdauer 18–25 Tage | II-V mit Ernte IX, oder VIII mit Ernte VI | 40 x 25 cm | Krautige Teile der Pflanzen samt Blüten, vor der Hauptblüte! | Dem Tee wird eine nervenstärkende, antidepressive Wirkung zugeschrieben. |

05.950.9 **Kamille,** Echte *Matricaria chamomilla* (15-60 cm), *Syn.: Chamomilla recutita, Mutterkraut*

NS O, NS ● (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 0,1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 1–2 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 100–200 g/1.000 m²<br>Keimdauer 10–14 T. Lichtkeimer | IV–V | 30–20 cm | Blüten | Tee zur Behandlung innerer und äußerer Leiden. |

05.955.4 **Kerbel,** Fijne Krul (Extra Krauser) *Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.* (30–60 cm)

NS O, NS ● (Min. 50 g) | **Tausendkorngewicht:** 2–3 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Direktsaat: 20–30 kg/ha<br>Keimdauer 14–21 Tage | III-VI | 15–20 cm | Blätter und Triebe | Für Kräuterbutter, Suppen und Soßen. |

**Koriander** (bis 60 cm) *Coriandrum sativum*

NS O, NS ● (Min. 50 g) | **Tausendkorngewicht:** 4–6 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 6 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 0,8-1 kg/1.000 m²<br>Keimdauer 21–30 Tage | IV | 25 x 15 cm | Trockene Samen ca. ab Mitte Juli. Man schneidet die Pflanzen wenn die Früchte hell werden und läßt sie nachreifen. Früchte fallen dann ab. | Gemahlen oder ganz für Gebäck und Salate. Zu Gulasch und Wild, zum Pöckeln. Für Marinaden u.a. Rote Rüben. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 05.963.9 | **Kairos** | sehr dunkelgrün; sehr spätschossende Sorte für Freiland und Topfkräuter-Bereich | NS O |
| 05.964.6 | **Madras** | etwas schnellere Variante von Kairos; für Schnitt gut geeignet | NS O |

**Kresse,** Gartenkresse ..... *siehe Seite 44*

05.960.8 **Kümmel** *Carum carvi* (bis 100 cm) *Syn.: Wiesenkümmel, Feldkümmel*

NS O (Min. 50 g) | **Tausendkorngewicht:** 2,5-3 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 8 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 0,6–1 kg/1.000 m²<br>Keimdauer 16–21 Tage | ab III–V | 40 x 30 cm | Im Juni bzw. Juli des 2. Jahres | Würze für Brote, Sauerkraut, Gemüse, Soßen, Käse, Likör- und Schnaps. Kümmeltee. |

Kulturhinweis: Ausreichend mit Phosphor und speziell Kalium versorgen. Stickstoffüberdüngung vermeiden - neigt zum Lagern! Jedoch darf die Kultur nicht zu schwach in den Winter gehen, denn kräftige Pflanzen mit einem Stängeldurchmesser von ca. 7 mm (gemessen am Wurzelhals) sind die Gewähr für eine gute Blüte im 2. Jahr - daher: N-Düngung schwacher Kulturen noch im Herbst vornehmen.



**05.940.0 Estragon**



**21.195.2 Hirschhornwegerich**



**05.950.9 Kamille**



**27.065.2 Johanniskraut (Hypericum perforatum)**



**05.955.4 Kerbel Fijne Krul**



05.967.7 Lemongras



05.970.7 Liebstöckl



05.975.2 Majoran



05.982.0 Oregano



05.985.1 Pfefferminze

## Lavendel
*Lavandula angustifolia officinalis*

**Tausendkorngewicht:** 0,8–1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 2–3 g/1.000 Pflanzen in Töpfe pikieren<br>Direktsaat: 50–100 g/1.000 m²<br>Lavendel keimt ungleichmäßig!<br>Keimdauer 16–20 T. Kaltkeimer | Frühbeetkasten: ab III<br>Freiland: ab V | 40 x 30 cm | Haupternte der blühenden Zweigspitzen ab dem zweiten Jahr; zur Ölgewinnung nur Blütenrispen ohne Blatt | Nur in geringen Mengen zum Würzen von Fisch und Fleisch, Kräuterbutter. Duftbeutel. |

05.965.3 **Einfacher Echter** (bis 60 cm) — *NS* O (Min. 5 g)
14.690.2 **Hidcote Blue Strain** (30 cm) — *PR* O (Min. 250 K)

## 05.967.7 Lemongras *Cymbopogon flexuosus* (50–60 cm)
*Syn.: Zitronengras*

*NS* O (Min. 10 g)

**Tausendkorngewicht:** ca. 0,5 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Kulturdauer | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 0,05–0,1 g/12 cm-Topf<br>Keimdauer 20–35 Tage bei 20–25°C; Lichtkeimer<br>benötigt hohe Luftfeuchtigkeit | I–VI | 2,5–3 Monate | Blätter und Stiele | vor allem in der asiatischen Küche; auch als Zutat von Früchtetees |

## 05.970.7 Liebstöckl *Levisticum officinale* (bis 180 cm)
*Syn.: Maggikraut, Bergliebkraut, Lusch*

*NS* O (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** 2,0-5,3 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 40 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 8 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 400-600 g/1.000 m²<br>Keimdauer 14–30 Tage | IV–V od.VIII bzw. Vorkultur: Anfang III | 40 x 50 cm | Kraut und Wurzeln | Für Suppen, Braten, Geflügel etc. Bei Verdauungsbeschwerden. |

**Erntehinweis:** Je nach Anzucht- bzw. Kulturmethode kann das Kraut im ersten Standjahr Mitte Juli, Anfang September und im Oktober geerntet werden; ab dem zweiten Standjahr von Juni bis September. Wurzelernte kann z.B. nach 2-3 Standjahren im Herbst erfolgen

## 05.972.1 Löwenzahn *Taraxacum officinale* (20 cm)

*NS* O (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** 0,8 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Direktsaat: 3–4 kg/ha (Aussaat Mitte VIII- Ende IX; Ernte 2. Jahr)<br>Keimdauer 21-28 Tage | Vorkultur III–IV und im Mai–Juni auspflanzen. | 30 x 40 cm | Eventuell Bleichen durch Zubinden der Blätter. Kann auch im Winter, wie Zichoriensalat getrieben werden. | Als Salat mit etwas bitterem Geschmack. |

## 05.975.2 Majoran *Origanum majorana L.* (bis 50 cm)
*Syn.: Französischer Majoran*

*NS* O (Min. 10 g)

**Tausendkorngewicht:** 0,2–0,4 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 4 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 0,6-2 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 1 kg/1.000 m²<br>Keimdauer 21–28 Tage<br>Lichtkeimer | Glashaus: III<br>Freiland: V | 25 x 25 cm<br>2 Pflanzen je Pflanzstelle | Blatternte nach der Knospenbildung aber vor der Vollblüte (erst ca. 10% Blüten offen) | Wurstwürze, Braten, Soßen, Gemüse etc. Auch als Tee. |

05.980.6 **Melisse** ..... *siehe Zitronenmelisse, Seite 132*

27.090.4 **Nigella sativa** ..... *siehe Schwarzkümmel, Seite 131*

## 05.982.0 Oregano *Origanum vulgare* (40-60 cm)
*Syn.: Dost, Staudenmajoran, Wilder Majoran*

*NS* O, *NS* ● (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** 0,2–0,3 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 1 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 500 g/1.000 m²<br>Keimdauer 25–30 Tage<br>Lichtkeimer | Ende IV | 50 x 50 cm | Laufende Ernte möglich; aber bestes Erntegut erhält man nur zu Beginn der Blüte (vor Vollblüte!) | Für Tomaten, Eierfrucht, Zucchini, Fleisch, Pizza etc. also das Gewürz der Italienischen Küche. |

**Pastinake & Petersilie** (Schnitt- und Wurzelpetersilie) ..... *siehe Seite 75*

## 05.984.4 Perilla purple Shiso *Perilla frutescens*
*Syn.: Schwarznessel*

*NS* O (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** 0,9–1,3 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Kulturdauer | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Aussaat für Schnittware:<br>8–10 Korn/4 cm Presstopf<br>Topfkultur: 6–7 Korn/Topf<br>Keimdauer 10–20 Tage bei 20°C<br>Lichtkeimer | III–VII | 25–60 Tage (je nach Lichtintensität) | Sprossen, Blätter, Blüten | Zum Würzen und Garnieren; Aroma zwischen Zimt, Citrus und Koriander |

*Bei ganzjähriger Kultur ab Oktober Zusatzlicht, sonst vorzeitige Schosser; Saatgut im Kühlschrank lagern, da sonst die Keimung stark reduziert wird.*

## 05.985.1 Pfefferminze *Mentha x piperita* (bis 80 cm)
*Syn.: Englische Minze, Edelminze, Teeminze*

*NS* O (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** 0,06–0,1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 2 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 0,5 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 200 g/1.000 m²<br>Keimdauer 25–28 T. Lichtkeimer | III - IV | 30 x 40 cm | Blatternte, sobald sich die Blütenknospen zeigen; in voller Sonne geerntet, erhält man beste Qualität. | Für Salatmarinaden, Lammgerichte,Tee. Rohkost, Gewürzessig, und Süßspeisen. |

**Pimpinelle** siehe Bibernelle ..... *siehe Seite 128*

**Rauke, Rucola** ..... *siehe Seite 88*



*NS* = Normalsaatgut *KS* = kalibriertes Saatgut *PR* = Präzisionssaatgut *TP* = Topfpillen

## Ringelblume, Calendula ..... *auf Anfrage*

05.990.5 **Rosmarin** *Rosmarinus officinalis* (100–150 cm)
*Rosmarin ist frostempfindlich!*

NS O (Min. 5 g) | **Tausendkorngewicht:** 1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 10–20g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 3–5 g/1.000 Pflanzen<br>Keimdauer 20–35 T., keimt langsam und ungleichmäßig. | Glashaus: ab III<br>Freiland: IV-V | 40 x 40 cm | Junge Blätter und Triebe zu Blühbeginn | Würze für Braten, Soßen. Griechische Küche. |

*Rosmarin benötigt im Winter eine Frostschutzabdeckung. Besser ist jedoch die frostfreie Überwinterung in Töpfen.*

05.991.2 **Roter Sonnenhut, „Echinacea“**
*Echinacea purpurea L.* (100 cm), *Syn.: Igelkopf*

NS O, NS ● (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 2,6–5,1 g (ø 3,3 g)

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 20–25 g/1.000 Pflanzen (5-7 Korn/Würfel)<br>Direktsaat: 2 kg/ha<br>Keimdauer: 15–25 Tage | II–IV | 40 x 30 cm | Blüte, Triebe und Wurzeln | Tee. Soll virushemmend und gegen Bakterien wirken, steigert die körpereigenen Abwehrkräfte. |

05.995.0 **Salbei** *Salvia officinalis* (bis 70 cm)
*Syn.: Gartensalbei, Edelsalbei*

NS O, NS ● (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 7-10 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 80 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 15 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 1,2 kg/1.000 m²<br>Keimdauer 14–21 Tage | Glashaus: ab II<br>Freiland: ab IV | 40 x 40 cm | Laufend junge Blätter und Triebe; Stängel vor oder nach der Trocknung entfernen. | Für Braten und Soßen. Tee gegen Halsschmerzen; wirkt adstringierend. Griechische Küche. |

05.997.4 **Sauerampfer** *Rumex acetosa* (40–80 cm)

NS O (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Direktsaat: 2 kg/1.000 m²<br>Keimdauer 8–21 Tage | IV–V | 35 x 35 cm | laufend frische, junge Blätter. Blütenstiele immer entfernen | Würze für Salat, Suppen, Braten. Hoher Säuregehalt. |

**Erntehinweis:** Will man Sauerampfer konservieren, ist das Tiefgefrieren der Blätter dem Trocknen (=starker Aromaverlust) vorzuziehen.
Achtung: Das zerkleinerte Blatt nicht trocken, sondern in Wasser einfrieren, sonst „erfriert“ es.

**Schnittlauch** *Allium schoenoprasum L.* (bis 30 cm)

Min. Menge siehe Sorten | **Tausendkorngewicht:** 1–1,5 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 40 g bzw. 26–40 TK / 1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 20–45 g bzw. 20–30 TK / 1.000 Presstöpfe<br>Keimdauer ca. 21 Tage | Glashaus: ab II<br>Freiland: III–VII | 30–40 cm | laufend das ganze Jahr | Feingeschnitten zu Butterbrot, Eierspeise, für Salate und – wie Petersilie – für Suppen. |

| | | |
|---|---|---|
| 05.111.4 | **Medium Leaf** | NS O (Min. 50 g) |
| 05.118.3 | **Polyvert** | NS O (Min. 50 g) |
| 05.994.3 | **Biggy**: grobröhrig, dunkelgrün; für Topf, Frischmarkt, Industrie | NS Ⓚ O (Min. 50TK) |
| 05.114.5 | **Staro**: grobröhrig | NS Ⓚ O (Min. 50TK), NS Ⓚ ● (Min. 50TK) |

### Schnittlauch-Treiberei im Winter:

a) Die Anzucht der zum Treiben bestimmten Pflanzen soll bei einjähriger Vorkultur schon im Februar erfolgen, besser sind zweijährige Pflanzen, wobei die Aussaat im zeitigen Frühjahr im Freien erfolgt.
b) Abstände weit genug wählen. Reihen ca. 50 cm, in der Reihe ca. 25 cm. Zur Ausbildung von Reservestoffen kräftig düngen.
c) Rodung der Pflanzen so spät wie möglich, jedenfalls nicht vor Ende Oktober.
d) Vor dem Aufstellen im Treibhaus ca. 16-stündiges Warmwasserbad. Treibtemperatur in der ersten Woche 23° C danach 15–18° C.

05.998.1 **Schnittknoblauch** *Allium tuberosum* (bis 30 cm)

NS O (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 3–4 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 60 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 7 g/1.000 Pflanzen<br>Keimdauer ca. 21 Tage | III–XII | 30 cm | laufend das ganze Jahr | Gleiche Verwendung wie Schnittlauch, nur mit leichtem Knoblauchgeschmack. |

27.090.4 **Schwarzkümmel** *Nigella sativa* (40-60 cm)

NS O (Min. 10 g) | **Tausendkorngewicht:** 1,9-2,6 g

| Saatgutbedarf | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Drillsaat direkt: 15-20 kg/ha | IV-V | 20-30 cm<br>Blüte VII-IX | Reife Samenkörner Ende August | Samenkörner und Öle |

05.996.7 **Stevia** *Stevia rebaudiana* (40 cm)
*Syn.: Süßkraut*

NS Ⓚ O (Min. 100 K) | **Tausendkorngewicht:** 0,8–0,9 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Kulturdauer | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 4–5 Korn/11 cm-Topf<br>Keimdauer 10–15 Tage bei 22°C<br>Lichtkeimer<br>benötigt hohe Luftfeuchtigkeit | ab April | 1,5–2 Monate<br>Kulturtemperatur: 15°C | Blätter, frisch oder getrocknet | Zum Süßen von Getränken und Speisen. |



**05.991.2 Roter Sonnenhut (Echinacea p.)**



**05.990.5 Rosmarin**



**05.995.0 Salbei**



**27.090.4. Schwarzkümmel**



**05.996.7 Stevia rebaudiana**



06.001.7 Tagetes lucida

## 06.001.7 Tagetes lucida (40 cm)

*Syn.: Würztagetes, Winter-Estragon*

NS O (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** ca. 0,4 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Kulturdauer | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 5–10 Korn/12 cm-Topf<br>Keimdauer 10–20 Tage<br>Lichtkeimer | ab März | 1,5–2 Monate | Blüten und Blätter | wie Estragon; intensiver, anisartiger Estragongeschmack |



06.000.0 Thymian

## 06.000.0 Thymian *Thymus vulgaris* (20–40 cm)

*Syn.: Römischer Quendel, Gartenthymian*

NS O (Min. 5 g), NS ● (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** 0,2–0,4 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 6 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 2 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 700 g/1.000 m²<br>Keimdauer 15–21 Tage | Glashaus: ab II<br>Freiland: IV–V | 20 x 20 cm | Kurz vor der Blüte. Nach dem Trocknen die Blätter abreiben. | Frisch und getrocknet für Salate, Suppen, Soßen, Braten etc. Tee gegen Husten und Halsentzündung. |

**Kulturhinweis:** Bei Direktsaat ist aufgrund der kleinen Samen besonders sorgfältig zu säen! Thymian bevorzugt kalkhaltige Böden; kann auch auf tonhaltigen gedeihen, wenn diese nicht zu feucht sind. Im Allgemeinen ist ein gut geführter Thymian-Bestand frostbeständig, jedoch empfiehlt sich speziell wenn länger andauernde Fröste zu erwarten sind bzw. bei sehr intensiv genutzten, d.h. viel geschnittenen, Beständen eine Frostabdeckung. Thymian kann ca. 5 Jahre am selben Standort genutzt werden, also auf Unkrautfreiheit achten. Wird um die Mittagszeit und bei voller Sonne geerntet (wie bei Pfefferminze), so ist die Konzentration der geschmacksbildenden Inhaltsstoffe und damit die Qualität des Erntegutes am besten! Trocknungstemperatur soll nicht über max. 40°C liegen!

## 06.002.4 Waldmeister *Galium odoratum* (bis 50 cm)

NS O (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** 5–7 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 60 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 15 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 1 kg/1.000 m²<br>Frostkeimer; keimt langsam und ungleichmäßig. Keimdauer 200 T. | IX–X | 25 x 15 cm | ab dem 2. Jahr. Vor Blühbeginn. Bestes Aroma entwickeln die blätter im angetrockneten Zustand. | Für Obstsalate, Suppen, Süßspeisen, Waldmeisterbowle und Speiseeis. |

## 06.005.5 Weinraute *Ruta graveolens* (bis 80 cm)

NS O (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** 2 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Vorkultur: 5 g/1.000 Pflanzen<br>Keimdauer 20–30 Tage | III–IV | 40 x 30 cm | laufend Blätter | In kleinen Mengen zu Suppen, Fleisch und Gemüse. |



06.010.9 Wermut

## 06.010.9 Wermut *Artemisia absinthium* (bis 100 cm)

*Syn.: Absinth, Wurmkraut, Großer Wermut*

NS O (Min. 5 g)

**Tausendkorngewicht:** 0,1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 0,8 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 0,3 g/1.000 Pflanzen<br>Keimdauer 10–12 Tage | IV–V | 50 x 50 cm | junge Blätter und Blütenstände. | Wermutwein, Liköre und Tee gegen Magenbeschwerden. |

**Kulturhinweis:** Die Direktsaat ist aufgrund des überaus kleinen Samens NICHT zu empfehlen! Zur Ertragssteigerung sollte nach der Pflanzung die Möglichkeit zur künstlichen Bewässerung vorgesehen werden. Ein Bestand kann, mehrjährig gut kultiviert, ca. 6-8 Jahre genutzt werden.

## 06.013.0 Winterportulak *Claytonia perfoliata,*

*Syn.: Montia perfoliata* (bis 20 cm) (=Winterpostelein)

NS O (Min. 10 g)

**Tausendkorngewicht:** 1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Direktsaat: 1–2 kg/1.000 m²<br>Keimtemperatur: unter 12° C<br>Keimdauer 14 Tage | XII–IX | 8–20 cm Reihenabstand oder breitwürfig | 6–8 Wochen nach Aussaat. Weitere Ernten im Winter. Blüht ab März, vorher abräumen. | Als Salat, leicht mit säuerlichem Geschmack. Am besten für den Frischverzehr geeignet! |

**Erntehinweis:** Portulak zu konservieren ist schwierig, weil er dabei einen großen Teil seines Geschmacks verliert. Will man ihn trotzdem haltbar machen, empfiehlt sich das Einlegen in Salz oder Essig.



05.980.6 Zitronenmelisse

## 06.015.4 Ysop *Hyssopus officinallis* (50–80 cm)

*Syn.: Eiserigkraut, Eisewig*

NS O (Min. 10 g)

**Tausendkorngewicht:** 1 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 10 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 3 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 800 g/1.000 m²<br>Keimdauer 14 Tage | Glashaus: II–III<br>Freiland: ab V | 30 x 30 cm | laufend frische Blätter und Triebe vom Blühbeginn bis zur Vollblüte. | Für Salate, Soßen, Suppen, Fleisch und Marinaden. |

## 05.980.6 Zitronenmelisse *Melissa officinalis*

(60–100 cm); *Syn.: Engl. Brennessel, Römische Melisse*

NS K O, NS ● (Min. 10 g)

**Tausendkorngewicht:** 0,5–0,6 g

| Saatgutbedarf, Keimung | Saattermin | Reihe, Pflanzung | Ernte: | Verwendung: |
|---|---|---|---|---|
| Topfkultur: 6 g/1.000 Töpfe<br>Vorkultur: 3 g/1.000 Pflanzen<br>Direktsaat: 0,8-1kg/1.000 m²<br>Zitronenmelisse keimt ungleichmäßig! Keimdauer 20–30 Tage | III - V | 30 x 30 cm<br>Verunkrautungsgefahr bei Direktsaat! | Junge Triebspitzen laufend ernten. Der Bestand kann in der Regel 3-4 Jahre genutzt werden | Ersatz für Zitronen. Würze für Salate, Fleisch, Fisch und Pilze. Melissentee. |

AUSTROSAAT

# GRÜNLAND GRÜNRAUM

## Saatgutmischungen 2024

*Katalog anfordern!*

für

Zwischenfruchtbau

Weinbau | Obstbau | Bienenweiden

Dauergrünland | Feldfutterbau

Grünraumgestaltung

Landschaftsbau | Sportplatzbau













# FLÜSSIGE RHIZOBIEN-IMPFMITTEL

# RhizoFix®

Unsere Verkaufsmitarbeiter im Außendienst beraten Sie gerne!

## Was sind Rhizobien?

Leguminosen gehen mit artenspezifischen Knöllchenbakterien (Rhizobien) eine Symbiose ein. Rhizobien leben direkt an den Wurzeln und funktionieren wie kleine Düngerfabriken für die Pflanzen.

Knöllchenbakterien kommen in unterschiedlicher Menge ganz natürlich in unseren Böden vor.

Manchmal könnten jedoch am Beginn der Pflanzenentwicklung mehr von diesen nützlichen Organismen im Boden vorhanden sein.

Das würde den Leguminosen schon von der Aussaat weg beim Aufwuchs und der Entwicklung helfen.

## Vorteile von Rhizobien

- ✔ Ertragssteigerung
- ✔ schnellstmögliche Symbiose zwischen Pflanzen und Rhizobien
- ✔ direkter Kontakt mit dem Saatgut für schnelle Besiedlung der Wurzeln
- ✔ verbesserte Stresstoleranz
- ✔ geeignet für den ökologischen Landbau
- ✔ Anbau auch auf Flächen ohne natürlichem Rhizobienvorkommen möglich
- ✔ kräftiger Aufwuchs

## Warum RhizoFix®?

Bei *RhizoFix®* handelt es sich um flüssige Rhizobien-Impfmittel zur direkten Impfung von Saatgut unmittelbar vor der Aussaat!

- ✔ einfache Handhabung des Impfmittels
- ✔ sofort einsatzfähig





**Knöllchenbakterien an einer Leguminosen-Wurzel**

## Welche RhizoFix® Stämme gibt es?

Zur Verfügung stehen sorgfältig ausgewählte *RhizoFix®*-Rhizobien-Stämme die möglichst schnell eine Symbiose mit folgenden Kulturen eingehen:

| | |
|---|---|
| *RhizoFix®* RF10 | für Sojabohne auch geeignet für Serradella |
| *RhizoFix®* RF20 | für Ackerbohne |
| *RhizoFix®* **RF30** | **für Erbse** auch geeignet für Linse |
| *RhizoFix®* RF40 | für Lupine und Wicke, auch geeignet für Platterbse und Kichererbse |
| *RhizoFix®* RF45 | für Kleearten (Rotklee, Weißklee, Schwedenklee, Alexandrinerklee, Gelbklee und Inkarnatklee) |
| *RhizoFix®* RF50 | für Luzerne, auch geeignet für Steinklee |
| *RhizoFix®* **RF60** | **für Stangenbohne auch geeignet für Buschbohne** |

# ZWISCHENFRUCHTBAU

Gründüngung | Humusaufbau | Bodenvorbereitung | Fruchtfolge

## ARTEN- UND SAATGUTWAHL *für gute Zwischenfruchtbestände*

Maßgeschneiderte Fruchtfolgemischungen die an die Kulturen angepasst sind, sind das Um und Auf für einen gesunden Boden und einen vitalen Pflanzenbestand. Verbesserter Bodenaufschluss, Humusaufbau und die Verringerung von Krankheits- und Schädlingsdruck sind wichtige Vorteile.

Die 14+1 unterschiedlichen Zwischenfruchtmischungen von **Terra Gold®** (TG) vereinen viele Vorteile des Anbaues in einer Mischung. Die Vorteile von Mischungen sind insgesamt höher einzustufen als die Summe der Vorteile der einzelnen Komponenten.

Ein vielfältiges Erscheinungsbild oder auch der ökologische Wert, den eine Zwischenfruchtfläche besitzt, lassen sich mit einer einzelnen Art nicht erreichen.

Bei der Auswahl der Komponenten in den **Terra Gold®**-Mischungen ist besonders auf die Anpassung an Trockenheitsbedingungen geachtet worden.

Aus südlichen Anbauregionen stammende Arten (Sonnenblume, Ramtillkraut, Sudangras, etc.) kommen mit Trockenheit deutlich besser zurecht und sind aus diesen und anderen Gründen in vielen der folgenden Mischungen als Komponenten auffindbar.

Auch Öllein, Gartenkresse und Leindotter kommen mit vergleichsweise wenig Wasser aus. In jedem Fall ist qualitativ hochwertiges Saatgut zu wählen, gesicherte Keimfähigkeiten und genaue Angabe, welche Arten mit welchen Anteilen in der Mischung vertreten sind.



| **Terra Gold®** die richtige **MISCHUNG** | **TG Nr.** | **für Süßgräser wie z.B.** Getreide, Mais Zuckermais | **für Korbblütler wie z.B.** Artischocken, Endivie, Schwarzwurzel, Zichorien, Salate | **für Kürbisgewächse wie z.B.** Gurken, Kürbis, Zuchini | **für Hülsenfrüchte wie z.B.** Bohnen, Erbse, Linsen, Erdnüsse, Kichererbse, Sojabohnen | **für Kreuzblütler wie z.B.** Weißkraut, Rotkraut, Brokkoli, Karfiol, Kohlrabi | **für Nachtschattengewächse wie z.B.** Aubergine, Paprika, Pfefferoni Tomate, Kartoffel | **für Doldenblütler wie z.B.** Fenchel, Karotte, Pastinake, Wurzelpetersilie, Dill, Kerbel, Schnittselerie Koriander |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HUMUS** | TG 1 | +++ | +++ | +++ | – | +++ | 0 | +++ |
| **MELIORATION** | TG 9 | +++ | + | +++ | 0 | 0 | 0 | +++ |
| **BIOFUM** | TG 5 | +++ | – | ++ | +++ | – | 0 | +++ |
| **STREUFIX** | TG 11 | +++ | 0 | ++ | +++ | +++ | 0 | +++ |
| **GEMÜSE FIT** | TG 13 | ++ | +++ | +++ | 0 | 0 | +++ | ++ |
| **GEMÜSE EXPRESS** o. Leg. | TG 18 | ++ | +++ | +++ | ++ | – | +++ | ++ |
| **HAPPY KAPPES** | TG 20 | + | +++ | +++ | ++ | +++ | + | + |
| **ALLROUND** *NEU* | TG 25 | +++ | 0 | ++ | +++ | +++ | 0 | +++ |
| **HOT SUMMER** *NEU* | TG 26 | ++ | – | ++ | ++ | – | 0 | ++ |
| **RÜBEN FIT** | TG 2 | +++ | +++ | +++ | – | – | – | +++ |
| **SOLARA** | TG 3 | +++ | +++ | +++ | – | 0 | +++ | +++ |
| **WINTER FIT** | TG 16 | +++ | ++ | ++ | + | – | – | +++ |
| **FUTTERSTAR** | TG 17 | +++ | ++ | ++ | ++ | +++ | ++ | +++ |
| **AQUA** | TG 7 | +++ | - | ++ | +++ | - | 0 | +++ |

**Legende:** Sehr gut geeignet +++ gut geeignet ++ geeignet + neutral 0 nicht geeignet –

# ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN

Saatgutmischungen zur **Gründüngung, als Bodenvorbereitung und zum Humusaufbau**

## HUMUS
### Stickstoffbindung und Humusaufbau TG-1

Vielseitige Mischung für getreide-, mais- und rapsreiche Fruchtfolgen ohne Kreuzblütler. Sie friert in der Regel sicher ab und kann auch für die Mulchsaat genutzt werden. Die enthaltenen Arten sorgen für eine gute Durchwurzelung des Bodens. Durch den hohen Anteil an Leguminosen kann der Aufwuchs Stickstoff effizient fixieren und erhebliche Mengen an oberirdischer Biomasse bilden. Für eine erfolgreiche Etablierung ist eine frühzeitige Aussaat zu bevorzugen.

Saatgutbedarf: 40 kg/ha Aussaat bis Mitte August
Art. Nr.: 206019 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 20,0 | % | Futtererbse |
| 7,5 | % | Alexandrinerklee |
| 10,0 | % | Serradella |
| 7,5 | % | Perserklee |
| 10,0 | % | Phacelia (Mantelsaat) |
| 25,0 | % | Sudangras |
| 20,0 | % | Sommerwicke |



HUMUS - die richtige Mischung zur Stickstoffbindung

## MELIORATION
### zur Bodenlockerung TG-9

Diese Mischung ist vor allem für Böden mit Verdichtungen wie Pflugsohlen etc. gedacht. Der enthaltene Meliorationsrettich bricht mit seiner massiven Pfahlwurzel verdichtete Böden auf und sorgt für eine hervorragende Bodengare. Mit den tiefwurzelnden Arten Lupine und Ölrettich wird die Mischung ideal ergänzt. In den gebildeten Wurzelkanälen erfolgt ein Luftaustausch in tiefere Bodenschichten und Wasser kann infiltrieren. Mit Wasser gefüllte Wurzelkanäle tragen im Winter zur Frostsprengung bei und dienen der Bodenlockerung.

Saatgutbedarf: 20-25 kg/ha Aussaat bis Mitte August
Art. Nr.: 206095 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 10,0 | % | Meliorationsrettich |
| 40,0 | % | Buchweizen |
| 5,0 | % | Phacelia (Mantelsaat) |
| 5,0 | % | Ramtillkraut |
| 20,0 | % | Ölrettich |
| 20,0 | % | Blaue Bitterlupine |

## BIOFUM
### Biofumigationsmischung TG-5

Biofum ist eine Sondermischung zur Bekämpfung von Bodenschädlingen mittels Biofumigation. Der Prozess beruht auf der Bildung von Gas, welches aus den Pflanzenzellen nach deren Zerkleinerung freigesetzt wird. Werden die Zellen der Kreuzblütler, die in der Mischung enthalten sind, mechanisch beschädigt, wird enzymatisch das Gas Isothiocyanat (ITC) freigesetzt. Der Pflanzenmulch muss unverzüglich in den Boden eingebracht und nach Möglichkeit abgedeckt werden, damit das ITC nicht ausgast. Durch die Wirkung des ITC wird eine Vielzahl von schädlichen Bodenorganismen und Krankheitserregern zerstört.

Saatgutbedarf: 15 kg/ha Aussaat bis Mitte August
Art. Nr.: 206057 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 80,0 | % | Ölrettich |
| 10,0 | % | Winterfutterraps |
| 10,0 | % | Sareptasenf |



STREUFIX - zur Stickstoffbindung

## STREUFIX
### Stickstoffbindung TG-11

Fruchtfolgeneutrale Zwischenfruchtmischung, die ohne große Bodenbearbeitung mit dem Schneckenkornstreuer, Düngerstreuer oder in Kombination mit einem Striegel großflächig ausgesät werden kann. Begrünt schnell, schützt so vor Erosion, führt dem Boden wertvolle organische Masse zu und friet sicher ab. Der enthaltene Alexandrinerklee bindet Luftstickstoff und stellt diesen der Folgekultur zur Verfügung.

Saatgutbedarf: 15 kg/ha Aussaat bis Mitte August
Art. Nr.: 206118 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 15,0 | % | Ramtillkraut |
| 25,0 | % | Phacelia (Mantelsaat) |
| 17,0 | % | Alexandrinerklee |
| 8,0 | % | Perserklee |
| 35,0 | % | Sandhafer |



Stand Oktober 2023: Änderungen der Mischungszusammensetzung vorbehalten.

# ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN

Saatgutmischungen in der Fruchtfolge - **Schwerpunkt Gemüsebau**

## GEMÜSE FIT
für komplexe Fruchtfolgen TG-13

Zwischenfruchtmischung für komplexe Fruchtfolgen mit Kartoffeln, Rüben und Gemüseanteilen. Der doppelresistente Ölrettich reduziert die Rübennematoden sowie die gallenbildenden Nematoden. Die Erreger der Eisenfleckigkeit bei Kartoffeln werden zurückgedrängt. Sandhafer reduziert die freibleibenden Nematoden. Durch die reduzierende Wirkung auf viele Nematoden ist die Terra Gold® 13 eine ideale Vorfrucht für viele Kulturen. Sommerwicken binden durch die Symbiose mit Rhizobien Luftstickstoff, der anschließend angebauten Pflanzen zur Verfügung steht.

Saatgutbedarf: 30 kg/ha
Aussaat von Anfang August bis Anfang September
Art. Nr.: 206149 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:
35,0 % Sandhafer
30,0 % Ölrettich, doppelresistent
35,0 % Sommerwicke




## GEMÜSE EXPRESS
*ohne Leguminosen* TG-18

Mischung für Gemüseanbauer mit engen Fruchtfolgen, geprägt von Kartoffeln, Rüben und verschiedenen Gemüsearten. Für alle Betriebe, deren Augenmerk auf der Aufrechterhaltung der Bodengesundheit liegt. Diese Mischung ist direkt auf die Reduktion von Nematoden ausgelegt, deshalb wurde auf alle Komponenten außer Ölrettich und Sandhafer verzichtet. Die Alternative für den intensiven Gemüseanbau.

Saatgutbedarf: 30 kg/ha Aussaat bis Ende August
Art. Nr.: 206224 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:
65,0 % Sandhafer
35,0 % Ölrettich, doppelresistent

## ALLROUND
NEU
blütenreich, zur Stickstoffbindung TG-25

Blütenreiche Zwischenfruchtmischung mit Alexandrinerklee zur Stickstoffbindung. Zur Zeit der Blüte bietet diese Mischung einen sehr schönen Anblick und ein ausgezeichnetes Trachtangebot für Nützlinge. Der Aufwuchs dient vielen Tieren, wie Vögeln und Kleinsäugern, als Nahrungsquelle und Deckung.

Saatgutbedarf: 10 kg/ha
Aussaat August bis Anfang September
Art. Nr.: 206262 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:
40,0 % Phazelia
35,0 % Ramtillkraut
25,0 % Alexandrinerklee

## HAPPY KAPPES
der Kohlhernie-Killer TG-20

Eine neue Zwischenfruchtmischung, die mit Blick auf Fruchtfolgen mit hohem Gemüse-Anteil entwickelt wurde. Hierbei sind besonders Kombinationen aus Kohl, Kraut, Raps oder Kartoffeln im Fokus. Die Komponeneten von Happy Kappes sind weitestgehend neutral gegenüber allen wichtigen Nematoden, weshalb diese Mischung auch das Mittel erster Wahl auf kohlherniebelasteten Flächen im Zwischenfruchtanbau ist. Aufgrund der schnellen Pflanzenentwicklung kann über eine sehr lange Zeitspanne angebaut werden.

Saatgutbedarf: 30-40 kg/ha
Aussaat bis Anfang September möglich!
Art. Nr.: 206217 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:
15,0 % Phacelia (Mantelsaat)
85,0 % Sandhafer

## HOT SUMMER
NEU
für extreme Sommer TG-26

Weitestgehend fruchtfolgeneutrale Mischung, die auf Grundlage der extremen Witterungssituationen der Jahre 2018 und 2019 entwickelt wurde. Hierbei liegt der Fokus auf Arten, die auch mit extrem geringen Mengen Keimwasser auskommen und auch in der Phase der Etablierung geringe Niederschläge effizient nutzen.

Saatgutbedarf: 20 kg/ha
Aussaat August bis Mitte September
Art. Nr.: 206279 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:
35,0 % Sudangras
20,0 % Sonnenblume
15,0 % Lein
8,0 % Abessinischer Senf
8,0 % Ramtillkraut
7,0 % Gartenkresse
7,0 % Leindotter

# ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN

Saatgutmischungen zur Gründüngung, als Bodenvorbereitung und in der Fruchtfolge

## AQUA
für Wasserschutzgebiete TG-7

Ausgewogene Zwischenfruchtmischung ohne Leguminosen, um den Einsatz in Wasserschutzgebieten zu ermöglichen. Regional ist die Aussaat von Zwischenfrüchten in Wasserschutzgebieten förderungsfähig. In dieser Mischung werden Arten verwendet, die in der Lage sind, den vorhandenen Bodenstickstoff aufzunehmen und zusätzlich im Herbst die Feldflur durch ihr Blütenspektrum aufzulockern.

Saatgutbedarf: 20 kg/ha  Aussaat: bis Mitte August
Art. Nr.: 206071 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack
Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 20,0 | % | Sudangras |
| 20,0 | % | Ölrettich, nematodenreduzierend |
| 20,0 | % | Gelbsenf, nematodenreduzierend |
| 10,0 | % | Phacelia (Mantelsaat) |
| 25,0 | % | Sonnenblume |
| 5,0 | % | Ramtillkraut |

## FUTTERSTAR
schmackhafte Zwischenfrüchte TG-17

Winterzwischenfruchtmischung zur ein- bis mehrschnittigen Silagenutzung im folgenden Frühjahr. Verwendet werden hochwertige Sorten des Welschen Weidelgras sowie die kleinkörnigen Leguminosen Inkarnat- und Rotklee. Der hohe Leguminosenanteil sorgt für einen guten Proteingehalt des gewonnen Futters und die Bereitstellung von Stickstoff für die Folgekultur.

Saatgutbedarf: 30 kg/ha
Aussaat: Anfang August bis Ende September
Art. Nr.:206255 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 30,0 | % | Welsches Weidelgras |
| 30,0 | % | Welsches Weidelgras |
| 25,0 | % | Inkarnatklee |
| 15,0 | % | Rotklee |






Stand Oktober 2023: Änderungen der Mischungszusammensetzung vorbehalten.

# ZWISCHENFRUCHTMISCHUNGEN

Saatgutmischungen in der Fruchtfolge

## WINTERFIT
winterhart und spätsaatverträglich TG-16

Winterharte, spätsaatvertraglich Zwischenfruchtmischung, die auch nach der früh räumenden Silomaisernte noch ausgebracht werden kann und ansprechende Aufwüchse bildet. Gut geeignet für mais- und getreidereiche Fruchtfolgen. Die in der Terra Gold® 16 enthaltenen Leguminosen, Inkarnatklee und Winterwicken, sorgen für eine Stickstofffixierung.

Saatgutbedarf: 25 kg/ha
Aussaat: Anfang August bis Ende September
Art. Nr.: 206248 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 15,0 | % | Winterfutterraps |
| 5,0 | % | Winterrübsen |
| 15,0 | % | Inkarnatklee |
| 40,0 | % | Winterwicke |
| 25,0 | % | Welsches Weidelgras |

## RÜBENFIT
für ideale Bodengare TG-2

Eine rübennematodenneutrale Mischung als ideale Mischung als ideale Komponenten von Rübenfruchtfolgen. Enthält Ölrettich und Lupine, die mit ihrem weiten Wurzelsystem dazu beitragen, dass eine hervorragende Bodengare erzeugt wird. Die verwendeten Ölrettich- und Senfsorten sind nematodenreduzierend. Durch die enthaltenen Leguminosen ist eine effiziente Stickstofffixierung möglich. Die unterschiedlichen Blütenfarben sorgen für ein sehr ansprechendes Bild und ein gutes Nektarangebot für Nutzinsekten.

Saatgutbedarf: 25-30 kg/ha Aussaat bis Mitte August
Art. Nr.: 206026 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 15,0 | % | Blaue Bitterlupine |
| 15,0 | % | Sommerwicke |
| 35,0 | % | Ölrettich, nematodenreduzierend |
| 5,0 | % | Phacelia (Mantelsaat) |
| 20,0 | % | Gelbsenf, nematodenreduzierend |
| 5,0 | % | Alexandrinerklee |
| 5,0 | % | Perserklee |



**Vergleich**

**Meliorationsrettich** (links im Bild) mit herkömmlichem Ölrettich (rechts).

## SOLARA
im Kartoffelanbau TG-3

Für Kartoffelfruchtfolgen ausgelegte Mischung. Blaue Bitterlupine und Ölrettich (Meliorationsrettich) sorgen für eine gute und tiefe Durchwurzelung, einen sehr krümeligen Boden sowie eine einfache Bestandsführung der Kartoffeln als Folgekultur. Die verwendete Meliorationsrettichsorte reduziert den Überträger des Tabak-Rattle-Virus und Eisenfleckigkeit im Kartoffelanbau. Früh gesät, können die enthaltenen Leguminosen zur Stickstofffixierung effizent beitragen.

Saatgutbedarf: 40 kg/ha Aussaat bis Mitte August
Art. Nr.: 206033 Liefereinheit: 10 kg oder 25 kg Sack

Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 40,0 | % | Blaue Bitterlupine |
| 20,0 | % | Sandhafer |
| 20,0 | % | Ölrettich, nematodenreduzierend |
| 10,0 | % | Futtererbse |
| 5,0 | % | Phacelia (Mantelsaat) |
| 2,5 | % | Alexandrinerklee |
| 2,5 | % | Perserklee |



# BIENENWEIDEN UND BLÜHMISCHUNGEN

Diese Mischungen können sowohl zur attraktiven Gestaltung naturnaher Bereiche im professionellen Landschaftsbau, als auch als Bereicherung von Brachen (**Biodiversitätsflächen**) zum Einsatz kommen. Sie bieten Artenvielfalt und hohe ästhetische Aspekte. Sie zeichnen sich durch gute Standortsanpassungsfähigkeit und ökologischen Nutzen in Gärten und im öffentlichen Grün aus. In Regionen mit einem Mangel an natürlich vorkommenden Trachtpflanzen auf den Agrarflächen kommen Imker an der Aussaat von Bienenweiden nicht vorbei!

## BIENENWEIDE einjährig
nach Tübinger Art (Artikel Nr.: 207603)

In Obstkulturen bzw. in deren Nähe ist zum Zeitpunkt der Blüte eine ebenfalls reich blühende Begrünung eher störend, da die blütenbesuchenden Insekten dorthin abgelenkt werden. Damit das Blütenangebot zum richtigen Zeitpunkt entsteht ist diese einjährige Bienenweide in ihrer Zusammensetzung auf späte Aussaat ohne Überwinterung abgestimmt und **nützt vor allem unseren wichtigsten Bestäubern: Honigbienen, Wildbienen und Hummeln!** Bestehend aus nacheinander blühenden Pflanzen stellt sie ab ca. 3 Wochen nach der Aussaat ein langes Blütenangebot bis zum ersten Frost bereit und gedeiht außer auf Sandböden nahezu überall. Honigbienen können aus dem Nektar der Blüten in nicht zu trockenen Sommern guten Honig bereiten.

**Hinweise zu Aussaat und Pflege:**
**Aussaat nicht vor Anfang/Mitte Mai** (am besten in feuchten Boden). Saatgut (7 - 10 kg/ha) nach der Aussaat leicht mit Erde bedecken (es sind auch Dunkelkeimer enthalten) Saattiefe bei Drillsaat ca. 5 cm, bei Flächensaat leicht eineggen. Im Herbst sollte die Bienenweide nicht abgeschlegelt werden, im Frühjahr können die abgefrorenen Pflanzenreste untergepflügt oder eingegrubbert werden.



**Zusammensetzung:**

Anethum graveolens
Borago officinalis
Calendula officinalis
Centaurea cyanus
Coriandrum sativum
Fagopyrum esculentum
Raphanus sativus ssp. oleif.
Malva sylvestris
Phacelia tanacetifolia
Nigella sativa
Sinapis alba

## BIENENWEIDE mehrjährig
nach Veitshöchheimer Art (Art.Nr.: 207610)

Artenreiche Blühmischung aus 50 Wild- und Kulturarten (Typ Veitshöchheimer); Blühbeginn April. Ideal für Wegraine, Bracheflächen und Grenzflächen **auch für wenig genutzte Flächen im Öffentlichen Grün!** Ausdauerndes Blütenangebot für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Nützlinge - ein ÜBER-Lebensraum der energiereichen Nektar und viel Pollen und Winterschutz bietet. Kann mehrjährige Brachemischung ergänzen und so den ökologischen Nutzen der Biodiversitätsfläche steigern. Flächenvorbereitung nach guter fachlicher Praxis (feinkrümeliges Saatbett). Altstilllegungen sollten im Herbst oder Winter gepflügt werden. Das Saatgut darf bei der Aussaat nur auf den Boden abgelegt und angewalzt werden.

Aussaathinweise siehe einjährige Bienenweide.

**Zusammensetzung:**

Achillea millefolium
Anethum graveolens
Anthemis tinctoria
Anthyllis vulneraria
Borago officinalis
Brassica oleracea
Calendula officinalis
Centaurea cyanus
Centaurea scabiosa
Cichorium intybus
Coriandrum sativum
Daucus carota
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Fagopyrum esculentum
Foeniculum vulgare
Galium album
Galium verum
Helianthus annuus
Hypericum perforatum
Lathyrus tuberosus
Leucanthemum ircutianum
Linum usitassimum
Lotus corniculatus
Malva moschata
Malva sylvestris
Medicago lupulina
Medicago sativa
Nigella sativa
Oenothera biennis
Papaver rhoeas
Phacelia tanacetifolia
Reseda lutea
Reseda luteola
Salvia pratensis
Sanguisorba minor
Silene dioica
Silene latifolia ssp. alba
Silene vulgaris
Solidago virgaurea
Thymus pulegioides
Verbascum densiflorum
Verbascum nigrum










### MIX FÜR GEMÜSEBAU-NÜTZLINGE EINJÄHRIG, Wuchshöhe 60-80 cm

Diese Mischung enthält 22 einjährige Arten, wie Alyssum, Dill, Sonnenblume, Kornblume, Basilikum, Boretsch, etc.. Darunter sind auch Trachtpflanzen, welche besonders reich an Nektar und Pollen sind, die die Nützlinge benötigen.

Art.Nr.: 203476
Saatstärke: 2-3 g/m²
Packungen zu 50 g oder 500 g
Aussaat: März- Juni
Blütezeit: Juni- September

### MIX FÜR GEMÜSEBAU-NÜTZLINGE MEHRJÄHRIG, Wuchshöhe 60-80 cm

Diese Mischung setzt sich aus 32 ein- und mehrjährigen Komponenten zusammen. Sie fördert – wie auch die einjährige Mischung – die Nützlinge und dient gleichzeitig den Bestäubern als Nahrungsquelle.

Art.Nr.: 203452
Saatstärke: 2-3 g/m²
Packungen zu 50 g oder 500 g
Aussaat: März-Juni
Blütezeit: Bei Frühlingsaussaat schon im ersten Sommer, in den Folgejahren beginnt die Blüte schon im Frühling.

### BLUMEN FÜR WEINGÄRTEN UND OBSTZEILEN - EINJÄHRIG, Wuchshöhe 20-50 cm

Diese Mischung einjähriger Arten verleiht jedem Weingarten Farbe und bietet Nützlingen wertvollen Lebensraum. Sie belebt die unterschiedlichsten Standorte mit Blütenpracht und bringt so „bunte Würze“ ins einheitliche Grün der Rieden. Diese Mischung aus 10 Arten enthält unter anderem Goldlack, Kalifornischen Mohn, Gemeinen Lack und Seifenkraut.

Art. Nr.: 20 353 7
Saatstärke: 2-3 g/m²
Aussaat: März-Juni

### WEINBERGBLUMEN MEHRJÄHRIG, Wuchshöhe 20-40 cm

Diese Mischung mehrjähriger Arten eignet sich zur Aussaat sowohl in der Fahrgasse als auch in der Rebzeile. Die lange Blühperiode bietet Nützlingen einen (Über-)Lebensraum in unmittelbarer Nähe der Rebstöcke. Diese Mischung aus 13 Arten enthält unter anderem Schwarzkümmel, Ringelblume, Gänseblümchen, Kerbel, Duftsteinerich.

Art. Nr.: 20 346 9
Aussaat: März-Juni oder August-Oktober.
Saatstärke: 2-3 g/m²



Stand Oktober 2023 Änderungen der Mischungszusammensetzung vorbehalten.

# SAATGUTMISCHUNGEN ZUR WEINGARTENBEGRÜNUNG

Durch langjährige, zu einseitige Bodenbearbeitung und -begrünung sind viele Weingartenflächen in der Bodenstruktur geschädigt. Bodenverdichtungen und Humusmangel sind die häufigsten Probleme. Das Ziel der Weingartenbegrünung ist also der Erhalt oder die Wiederherstellung intakter Bodenfruchtbarkeit zur harmonischen Ernährung der Reben. Eine gute Bodenvorbereitung ist für den Erfolg einer Begrünungs-Ansaat genau so wichtig wie eine gute Wasserversorgung. Ideal ist eine Aussaat im zeitigen Frühjahr (März/April), sobald die Bodenverhältnisse dies zulassen, um die Winterfeuchtigkeit zu nutzen. Wir empfehlen die Neuansaat anzuwalzen (Güttler- und Cambridge-Walze), um die Auflaufquote zu verbessern.



## WOLFF-Mischung Originalrezept

Art. Nr.: 207054
Liefereinheit: 10 kg Sack
Saatgutbedarf: ca. 40 kg/ha bzw. 20 kg/ha bei Ansaat nur jeder zweiten Gasse.

Zusammensetzung in Gew.%:

| | | |
|---|---|---|
| 7,5 | % | Alexandrinerklee |
| 7,5 | % | Inkarnatklee |
| 2,5 | % | Phacelia |
| 20,0 | % | Winterwicken |
| 7,5 | % | Bokharaklee |
| 15,0 | % | Esparsette |
| 7,5 | % | Luzerne |
| 5,0 | % | Gelbklee |
| 5,0 | % | Perserklee |
| 2,5 | % | Schwedenklee |
| 10,0 | % | Bienenweidemischung: Phacelia, Buchweizen, Koriander, Ringelblume, Schwarzkümmel, Ölrettich, Malve, Boretsch, Dill, Sonnenblumen |
| 10,0 | % | Würzfuttermischung: Kleiner Wiesenknopf, Kümmel, Spitzwegerich, Wegwarte, Schafgarbe, Wilde Möhre, Petersilie, Fenchel, Pastinake, Hornschotenklee |

## Sommerbegrünung für alle Lagen

Einsaat für eine Übergangsbegrünung im Sommer, mit dem Ziel einer schnellen Begrünung mit tiefer Durchwurzelung und guter Bodenbedeckung. Bei Sommertrockenheit walzen oder hoch mulchen.

Saatgutbedarf: ca. 60 - 80 kg/ha bzw. bei Ansaat nur jeder zweiten Gasse die Hälfte davon.

Art. Nr.: 207023
Liefereinheit: 10 kg Sack
Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 46,0 | % | Sommerwicken |
| 7,0 | % | Phacelia |
| 20,0 | % | Buchweizen |
| 7,0 | % | Alexandrinerklee |
| 20,0 | % | Winterwicken |



## WOLFF-Mischung ohne Luzerne

Art. Nr.: 207115
Bedarf: ca. 40 kg/ha bzw. 20 kg/ha bei Ansaat nur jeder zweiten Gasse.

Die Mischung ist an besonders trockene Lagen mancher Weinbaugebiete angepasst. Unter sehr trockenen Bedingungen kann die Luzerne aufgrund ihrer großen Wurzelmasse in Wasser-Konkurrenz zu den Reben treten. Bei dieser Mischung wird auf Luzerne verzichtet und die anderen Komponenten der Mischung werden im richtigen Mischungsverhältnis erhöht, um die Artenvielfalt zu erhalten.

## Winterbegrünung mit Kräutern

Winterbegrünung für die überjährige Nutzung. Saatgutbedarf: ca. 50 kg/ha bzw. bei Ansaat nur jeder zweiten Gasse die Hälfte davon. Aussaat-Termin: August bis Anfang September.

Art. Nr.: 207030
Liefereinheit: 10 kg Sack
Zusammensetzung in Gew.-%:

| | | |
|---|---|---|
| 30,0 | % | Winterwicke |
| 10,0 | % | Inkarnatklee |
| 45,0 | % | Winterroggen |
| 4,0 | % | Winterrübse |
| 3,0 | % | Phazelia |
| 8,0 | % | Würzkräutermischung bestehend aus: |

Kleiner Wiesenknopf, Kümmel, Spitzwegerich, Wegwarte, Schafgarbe, Wilde Möhre, Petersilie, Fenchel, Boretsch, Hornklee, Kamille, Kornblumen, Klatschmohn



# Saatgutmischungen für die GRÜNRAUMgestaltung

## Rasen-Übersicht

| GRÜNRAUMGESTALTUNG u. SPORTPLATZBAU | Artikel Nr. | 1 LE Sack-inhalt | Neuanlage | umbruchlose Erneuerung | trittfest | außerordentlich trittfest | kurzschnittverträglich | sehr kurzschnittverträglich | Aussaat in g / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SPIEL- UND SPORTRASEN** | | | | | | | | | |
| Spiel- und Sportplatzrasen Spezial | 200352 | 10 kg | ✔ | | | ✔ | ✔ | | 20-30 |
| Profi Sportrasen (entspricht RSM 3.1) | 200307 | 10 kg | ✔ | | | ✔ | | ✔ | 20-30 |
| Sportrasen FairPlay® XL | 200376 | 10 kg | ✔ | | | ✔ | ✔ | | 20-30 |
| **PARK- UND GARTENRASEN** | | | | | | | | | |
| Park- und Gartenrasen Spezial - Wohnrasen (entspricht RSM 2.3) | 200703 | 10 kg | ✔ | | ✔ | | ✔ | | 20-25 |
| Schattenrasen Weekend XL | 200208 | 10 kg | ✔ | | ✔ | | ✔ | | 20-25 |
| Standard-Rasen für Gärten und Spielflächen XL | 201861 | 10 kg | ✔ | | ✔ | | ✔ | | 25-30 |
| Standard-Rasen für Gärten und Spielflächen Profi XL | 201885 | 10 kg | ✔ | | ✔ | | ✔ | | 25-30 |
| **RASEN-SPEZIALITÄTEN** | | | | | | | | | |
| Regenerationsrasen Quick Play XL (entspricht RSM 3.2) | 200666 | 10 kg | | ✔ | ✔ | | ✔ | | 20-25 |
| Rohrschwingel-Rasen Summer Sports XL (entspricht RSM 2.2-Var.2) | 200321 | 10 kg | ✔ | | | ✔ | ✔ | | 35-40 |
| **RASEN-SPEZIALITÄTEN** *pro Nitro behandeltes Saatgut* | | | | | | | | | |
| Standard-Rasen für Gärten und Spielflächen Profi ***SPEED*** | 201885,6 | 10 kg | ✔ | | ✔ | | | | 25-30 |
| Regenerationsrasen Quick Play XL (entspricht RSM 3.2) ***SPEED*** | 200666,6 | 10 kg | | ✔ | ✔ | | ✔ | | 20-25 |

| LANDSCHAFTS-, STRASSEN- u. WEGEBAU | Artikel Nr. | 1 LE Sack-inhalt | Neuanlage | Nachsaat | mit Blumen und Kräutern | trockenheitsverträglich | extensiv | befahrbar | Aussaat in g / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LANDSCHAFTSBAU** | | | | | | | | | |
| Dachrasen mit Blumen und Kräutern (entspricht RSM 6.1) | 201953 | 10 kg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | 5-10 |
| Landschaftsrasen für feuchte Lagen (entspricht RSM 7.3) | 201618 | 10 kg | ✔ | ✔ | | | ✔ | | 15-20 |
| Landschaftsrasen für trockene Lagen (entspricht RSM 7.2.1) | 202677 | 10 kg | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | 15-30 |
| Landschaftsrasen mit Blumen und Kräutern (entspricht RSM 7.2.2) | 202684 | 10 kg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | 15-30 |
| **VERKEHRSFLÄCHEN, STRASSENBEGLEITGRÜN** | | | | | | | | | |
| Parkplatzrasen XL ***mit Schafgarbe*** (entspricht RSM 5.1) | 201 588 | 10 kg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30 |
| Parkplatzrasen XL (entspricht RSM 5.1) | 201 571 | 10 kg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 30 |
| Kurzrasen-Böschungsmischung ***ohne Klee*** | 201 472 | 10 kg | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | 15-30 |
| Kurzrasen-Böschungsmischung mit Weißklee | 201 489 | 10 kg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | 15-30 |
| Böschungsmischung zur Futternutzung (Saatgutbedarf ca. **30 kg/ha)** | 201 465 | 10 kg | ✔ | ✔ | | ✔ | ✔ | | siehe links |
| **Blumenwiesen, Rasengesellschaften** | | | | | | | | | |
| AUSTROSAAT Blumenwiese | 201 892 | 10 kg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | 15 |
| Blumenrasen BOKU | 201 632 | 10 kg | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | 10 |

*Katalog anfordern!*





Stand Oktober 2023: Änderungen der Mischungszusammensetzung vorbehalten.

# Saatgutmischungen für die GRÜNLANDwirtschaft

## Übersicht und Einsatzbereiche

| | Art.Nr. | Packungs-inhalt in kg | Grünfutter | Weide | Wiese od. Futterbau | Saatgut-bedarf in kg/ha | Neuanlage geeignet | Nach-/ Übersaat geeignet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DAUERGRÜNLAND & FELDFUTTERBAU MIT BIO-KOMPONENTEN** | | | | | | | | |
| NEU Dauerweide für raue Lagen BIO | 203070,0009 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| NEU Kleegrasmischung für raue Lagen BIO | 205326,0009 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| NEU Wechselwiesenmg. ohne Goldhafer BIO | 204206,0009 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| **DAUERGRÜNLAND** konventionelles Saatgut | | | | | | | | |
| **Dauerwiese** | | | | | | | | |
| für mittlere und trockene Lagen | 203001 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| für raue Lagen | 203209 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| ohne Goldhafer | 203056 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| **Dauerweide** | | | | | | | | |
| für mittlere und trockene Lagen | 204008 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| für raue Lagen | 204022 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| **Nachsaatmischung** | | | | | | | | |
| für Wiesen & Weiden **mit Klee** | 203087 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 20 - 25 | - | ✔ |
| NEU für Wiesen & Weiden **mit Klee *SPEED*** | 203087,6 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 20 - 25 | - | ✔ |
| für Wiesen & Weiden **ohne Klee** | 203070 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 20 - 25 | - | ✔ |
| NEU für Wiesen & Weiden **ohne Klee *SPEED*** | 203070,6 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 20 - 25 | - | ✔ |
| für Wiesen & Weiden mit Klee und Luzerne | 203919 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 20 - 25 | - | ✔ |
| **FELDFUTTERBAU** konventionelles Saatgut | | | | | | | | |
| Rotkleegras für mittlere und raue Lagen | 205159 | 10 | ✔ | - | ✔ | 25 - 30 | ✔ | ✔ |
| Kleegrasmischung für milde u. mittlere Lagen | 205302 | 10 | ✔ | - | ✔ | 25 - 30 | ✔ | ✔ |
| Kleegrasmischung für raue Lagen | 205326 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| Luzernegrasmg. für trockene u.mittlere Lagen | 205005 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| Luzerne-Rotkleegras | 205500 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| Wechselwiesenmischung ohne Goldhafer | 204206 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| Feldfutterintensiv Mischung für raue Lagen | 205425 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| **TIER SPEZIAL** | | | | | | | | |
| Schaf- & Kleintierweide mit Kräutern + Klee | 207283 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| Kräutermischung für Weiden | 207290 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | 1 - 2 | - | ✔ |
| Spitzwegerich - *Plantago lanceolata* | 211846 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | 20 - 25 | - | ✔ |
| Futterzichorie - *Cichorium intybus* | 211853 | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | 15 - 20 | - | ✔ |
| **Pferdehaltung** | | | | | | | | |
| Pferdeweide | 207139 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 30 - 40 | ✔ | ✔ |
| Fruktanarme (Pferde-)weidemischung | 207269 | 10 | ✔ | ✔ | ✔ | 30 - 40 | ✔ | ✔ |
| Pferdeheu | 207146 | 10 | ✔ | - | ✔ | 30 - 35 | ✔ | - |
| **Wildäsung und Hege** | | | | | | | | |
| Wildacker Trio | 207474 | 10 | ✔ | - | - | 30 - 35 | ✔ | ✔ |
| Rehwiese | 207504 | 10 | ✔ | - | - | 40 - 45 | ✔ | ✔ |
| **WEINGARTENBEGRÜNUNG** | | | | | | | | |
| Wolff Mischung Original | 207054 | 10 | - | - | - | 40 - 45 | ✔ | ✔ |
| Wolff Mischung ohne Luzerne | 207115 | 10 | - | - | - | 40 - 45 | ✔ | ✔ |
| Sommerbegrünung für alle Lagen | 207023 | 10 | - | - | - | 60 - 80 | ✔ | ✔ |
| Winterbegrünung mit Kräutern | 207030 | 10 | - | - | - | 50 - 55 | ✔ | ✔ |
| **Blühmischungen** | | | | | | | | |
| Blumen für Weingärten u. Obstzeilen einjährig | 203537 | 1 | - | - | - | 2-3 g/m² | ✔ | ✔ |
| Weinbergblumen mehrjährig | 203469 | 1 | - | - | - | 2-3 g/m² | ✔ | ✔ |
| **ZWISCHENFRUCHTBAU SAATGUTMISCHUNGEN** | | | | | | | | |
| zur Gründüngung und Bodenverbesserung ab Seite 136 in diesem Katalog. | | | | | | | | |

# INHALTSVERZEICHNIS

## Gemüse Katalog 2024
## für den Erwerbsgartenbau


| | Seite |
|---|---|
| NEUHEITEN | 3-6 |
| BIO-SAATGUT Übersicht | 7-12 |
| GEMÜSESAATGUT | 13-124 |
| KRÄUTER, GEWÜRZE | 125-132 |
| Grünraum und Grünland SAATGUTMISCHUNGEN | 133-143 |
| GEMÜSE von A–Z | |
| Artischocke | 15 |
| Aubergine (Eierfrucht) | 15 |
| Asia-Blattgemüse | |
| Mizuna | 85 |
| Mustard | 85 |
| Spargelsalat | 85 |
| Pak-Choi | 85 |
| Bohnen | |
| Buschbohnen | 17 |
| Feuerbohnen | 17 |
| Puffbohnen | 17 |
| Stangenbohnen | 18 |
| Endivien | 99 |
| Erbsen | 19 |
| Erdbeeren | 124 |
| Feldsalat | 84 |
| Fenchel, Knollenfenchel | 20 |
| Gurken | |
| Einlegegurken | 23 |
| Salat- und Senfgurken | 23 |
| Treibgurken | 25 |
| Haferwurzel | 104 |
| Karotten & Möhren | 27 |
| Kohlgemüse | |
| Brokkoli | 29 |
| Karfiol, Blumenkohl | 31 |
| Chinakohl | 33 |
| Kohl, Wirsingkohl | 35 |
| Grünkohl, Blätterkohl | 35 |
| Kohlrabi | 37 |
| Sprossenkohl | 38 |
| Weißkraut | 39 |
| Rotkraut | 43 |
| Sprouting Kohlgemüse | 44 |
| Kresse | 44 |
| Kürbis | 47 |
| Mairüben | 81 |
| Mais (Zuckermais) | 56 |
| Mangold | 57 |
| Melonen | 59 |
| Melonenbirne | 124 |
| Paprika | 63 |
| Pastinak | 75 |
| Petersilie | 75 |
| Pfefferoni, Chili | 71 |
| Physalis | 124 |
| Porree | 77 |
| Radies | 79 |
| Rettich | 80 |
| Rhabarber | 81 |
| Rote Rübe | 83 |
| Rucola | 86 |
| Salate | |
| Treibkopfsalat | 89 |
| Freilandkopfsalat | 91 |
| Winterkopfsalat | 91 |
| Freilandeissalat | 93 |
| Bataviasalat | 93 |
| Bunte Salate | 95 |
| Multiblattsalat | 96 |
| Romanasalat | 97 |
| Salate | |
| Baby-Leaf-Salat | 98 |
| Schnittlauch | 131 |
| Schwarzwurzel | 104 |
| Sellerie | 103 |
| Spargel | 104 |
| Spinat | 103 |
| Tomaten | 105 |
| Zucchini | 55 |
| Zichorien | |
| Chicoree | 100 |
| Zuckerhut | 100 |
| Radicchio | 101 |
| Zwiebel, Schalotten, Steckzwiebel, Knoblauch | |
| Sommerzwiebel | 121 |
| Bundzwiebel | 121 |
| Säschalotten | 122 |
| Überwinterungszwiebel | 122 |
| Steckzwiebel | 123 |
| Schalotten | 123 |
| Pflanzknoblauch | 123 |


## PFLANZENBEDARF je 100 m² Anbaufläche

| Pflanzenabstand in cm | Abstand zwischen den Reihen in cm | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 |
| 2 | 50.000 | 33.333 | 25.000 | 20.000 | 16.666 | 12.500 | 10.000 | 8.333 | 7.140 | 6.250 | 5.555 | 5.000 | 4.000 | 3.333 |
| 3 | 33.333 | 22.220 | 16.666 | 13.333 | 11.111 | 8.333 | 6.666 | 5.555 | 4.760 | 4.160 | 3.700 | 3.333 | 2.666 | 2.222 |
| 4 | 25.000 | 16.666 | 12.500 | 10.000 | 8.333 | 6.250 | 5.000 | 4.160 | 3.570 | 3.120 | 2.770 | 2.500 | 2.000 | 1.680 |
| 5 | 20.000 | 13.333 | 10.000 | 8.000 | 6.666 | 5.000 | 4.000 | 3.333 | 2.850 | 2.500 | 2.220 | 2.000 | 1.600 | 1.333 |
| 8 | 12.500 | 8.333 | 6.250 | 5.000 | 4.160 | 3.120 | 2.500 | 2.080 | 1.780 | 1.560 | 1.380 | 1.250 | 1.000 | 830 |
| 10 | 10.000 | 6.666 | 5.000 | 4.000 | 3.333 | 2.500 | 2.000 | 1.666 | 1.428 | 1.250 | 1.111 | 1.000 | 800 | 666 |
| 15 | 6.666 | 4.444 | 3.333 | 2.666 | 2.222 | 1.666 | 1.333 | 1.111 | 942 | 833 | 740 | 666 | 533 | 444 |
| 20 | 5.000 | 3.333 | 2.500 | 2.000 | 1.666 | 1.250 | 1.000 | 833 | 714 | 625 | 555 | 500 | 400 | 333 |
| 25 | 4.000 | 2.666 | 2.000 | 1.600 | 1.333 | 1.000 | 800 | 666 | 571 | 500 | 444 | 400 | 319 | 266 |
| 30 | 3.333 | 2.222 | 1.666 | 1.333 | 1.111 | 833 | 666 | 555 | 476 | 416 | 370 | 333 | 266 | 222 |
| 35 | 2.875 | 1.905 | 1.428 | 1.143 | 952 | 714 | 571 | 476 | 408 | 357 | 317 | 286 | 228 | 190 |
| 40 | 2.500 | 1.666 | 1.250 | 1.000 | 833 | 625 | 500 | 416 | 357 | 312 | 277 | 250 | 200 | 168 |
| 45 | 2.222 | 1.481 | 1.111 | 889 | 740 | 556 | 444 | 370 | 317 | 278 | 247 | 222 | 178 | 148 |
| 50 | 2.000 | 1.333 | 1.000 | 800 | 666 | 500 | 400 | 333 | 285 | 250 | 222 | 200 | 160 | 133 |
| 55 | 1.818 | 1.212 | 909 | 727 | 606 | 454 | 363 | 303 | 259 | 227 | 202 | 182 | 145 | 121 |
| 60 | 1.666 | 1.111 | 833 | 666 | 555 | 416 | 333 | 277 | 238 | 208 | 185 | 166 | 133 | 111 |
| 65 | 1.538 | 1.026 | 769 | 615 | 513 | 385 | 308 | 256 | 220 | 192 | 171 | 154 | 124 | 103 |
| 70 | 1.428 | 942 | 714 | 571 | 476 | 357 | 285 | 238 | 204 | 178 | 158 | 142 | 114 | 95 |
| 75 | 1.333 | 889 | 667 | 548 | 444 | 333 | 267 | 222 | 190 | 167 | 148 | 133 | 107 | 69 |
| 80 | 1.250 | 833 | 625 | 500 | 416 | 312 | 250 | 208 | 178 | 156 | 138 | 125 | 100 | 83 |
| 90 | 1.111 | 740 | 555 | 444 | 370 | 277 | 222 | 185 | 158 | 138 | 123 | 111 | 88 | 74 |
| 100 | 1.000 | 666 | 500 | 400 | 333 | 250 | 200 | 166 | 142 | 125 | 111 | 100 | 80 | 66 |
| 120 | 833 | 556 | 417 | 333 | 278 | 208 | 167 | 139 | 119 | 104 | 92 | 83 | 67 | 56 |
| 125 | 800 | 533 | 400 | 319 | 266 | 200 | 160 | 133 | 114 | 100 | 88 | 80 | 64 | 53 |
| 150 | 666 | 444 | 333 | 266 | 222 | 166 | 133 | 111 | 95 | 83 | 74 | 66 | 53 | 44 |


Nachdruck bzw. Weiterverarbeitung von Bild oder Text aus Austrosaat-Katalogen, -Prospekten etc. auch in anderen Medien (CD, Internet usw.) auch auszugsweise ist ohne schriftliche Genehmigung der AUSTROSAAT AG WIEN nicht gestattet. Alle Angaben sind nur als unverbindliche Richtlinie anzusehen. Bedingt durch die individuelle Kulturführung jedes Kultivateurs bzw. Standortbedingungen und Witterungseinflüsse kann es zu anderen Ergebnissen kommen. Satz- und Druckfehler in Katalog und Preisliste vorbehalten. Erscheinungsdatum: November 2023

Für die nachfolgend genannten Abbildungen in diesem Katalog gilt Copyright © 2022 [Vilmorin-Mikado]: Aubergine Avan F1, Karotte Bolero F1, Karotte Maestro F1, Karotte Speedo F1, Karotte Gold Nugget F1, Karfiol Locris F1, Zucchini Tendor F1, Radies Tinto F1, Rote Rübe Starval F1, Freilandsalat Tahiti, Freiland-Eissalat Glassica, Bataviasalat Eole, Schnittsalat Pipeline, Endivie Tosca, Tomate Cornabel F1

# ALLGEMEINE LIEFERUNGS– UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN (AB)

1. GELTUNG DER ALLGEMEINEN LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN (AB) | ANGEBOTE UND AUFTRÄGE

Die nachstehenden Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit unseren Kunden, die keine Verbraucher iSd KSchG sind, ausschließlich. Unsere Angebote sind freibleibend, exkl. MwSt. Aufträge gelten von uns erst mit Absendung unserer Auftragsbestätigung bzw. mit Absenden der bestellten Ware als angenommen. Wir liefern ausschließlich aufgrund unserer "Allgemeinen Lieferungs– und Zahlungsbedingungen" (AB). Entgegenstehende "Allgemeine Vertragsbedingungen" des Bestellers sind für uns unverbindlich, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. Bei der Vermittlung von Jungpflanzengeschäften gelten die Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der jeweiligen Jungpflanzenbetriebe. Unsere Angebote sind freibleibend und unterliegen unter anderem bei einer Änderung saatgutrechtlicher oder anderer gesetzlicher Vorschriften einer Anpassung.

2. ANNAHMEVERZUG UND RÜCKTRITTSRECHT

Wir sind berechtigt, im Fall eines Annahmeverzuges als Schadenersatz für die verzögerte Annahme sowie in dem Fall, dass wir vom Vertrag wegen Zahlungsverzuges des Kunden zurücktreten und nicht auf die Erfüllung des Vertrages bestehen, die Bezahlung einer verschuldensunabhängigen Vertragsstrafe von 30 % des Auftragswertes zuzüglich der hierauf entfallenden Umsatzsteuer zu verlangen. Es steht uns jedoch frei, anstelle dieser Vertragsstrafe den Ersatz des uns aus der Nichterfüllung des Vertrages tatsächlich entstandenen Schadens zu fordern.

3. ERNTE - UND VERARBEITUNGSVORBEHALT

Für den Fall von Minder- bzw. Missernten, sowie bei für uns nicht vorhersehbaren Umständen (Streik, Aussperrungen, fehlende Zulieferungen etc.), sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Soweit vom Kunden nicht ausdrücklich verlangt, sind wir berechtigt, bestellte Sorten und Kaliber nach bestem Ermessen durch andere zu ersetzen.

4. SAMENNACHBAU UND -WEITERVERARBEITUNG

Sämtliches Saat– und Pflanzengut wird nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; die Verwendung zur Saatgutgewinnung (Samennachbau) zur Herstellung von Vermehrungsmaterial und die Verarbeitung zu Pillensaatgut etc. ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur zu gleichen Bedingungen erfolgen.

5. LIEFERUNG

Liefertermine werden von uns mit der gebotenen Sorgfalt festgelegt und genannt und zwar unter Zugrundelegung eines normalen Ablaufs des Geschäftsganges. Wird die Lieferung oder Abnahme der Ware aus Gründen verzögert, die keine der Parteien zu vertreten hat, so wird die Lieferzeit angemessen verlängert. Wir können jedoch vom Vertrag zurücktreten, wenn der ursprüngliche Liefertermin um mehr als sechs Wochen überschritten ist. Ansprüche auf Schadenersatz aus einer nicht termingerechten Lieferung sind ausgeschlossen, es sei denn, dass wir Vorsatz oder krass-grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen und zu verrechnen.

6. VERSAND

Die Versendung an den vom Kunden angegebenen Ort erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Gefahr der Verschlechterung oder des zufälligen Unterganges der Ware geht mit Verladung auf den Kunden über, auch wenn die Versendung auf unseren Fahrzeugen erfolgt. Sendungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden versichert. Die Verladung und Lieferung ab Werk Wien, einem anderen Lieferwerk oder Auslieferungslager erfolgt auf Kosten des Kunden.

7. PREISE

Sofern nicht anders vereinbart, gelten unsere Preise netto ab Lager Wien oder Graz. Die Mehrwertsteuer richtet sich nach den Steuersätzen, die am Tage der Auslieferung maßgeblich sind. Unsere Preisinformation hat prinzipiell Gültigkeit von 1. November eines Jahres bis 31. Oktober des Folgejahres. Für neue Ernten können andere Preise in Anrechnung kommen. Wir sind berechtigt, die bekanntgegebenen Preise zu erhöhen, wenn sich die Bemessungsverhältnisse, wie Lohnerhöhungen, Preiserhöhungen unserer Lieferanten, Frachten und Zölle, Notierungen der Devisenkurse und Ähnliches verändert haben.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Wenn nicht anders vereinbart, sind Rechnungen binnen 21 Tagen netto ab dem Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem wir über sie verfügen können.

9. ZAHLUNGSVERZUG

Für den Fall des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der Höhe von mindestens 9,2 % über dem Basiszinssatz der Österreichischen Nationalbank p.a. verrechnet. Ist der Kunde mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung in Verzug, so können wir vorprozessuale Kosten, insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung stellen. Als Mindestkosten werden jedenfalls EUR 14,50 für jede Mahnung verrechnet.

10. AUFRECHNUNGSVERBOT

Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.

11. PRÜFUNGS- UND RÜGEPFLICHT

Jede Sendung ist unverzüglich vom Kunden nach der Ablieferung zu untersuchen. Beanstandungen haben innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware unter spezifischer Angabe des gerügten Mangels schriftlich zu erfolgen. Bei nicht rechtzeitiger Rüge sind sämtliche Ansprüche verwirkt. Bei gewährleistungspflichtigen Mängeln steht uns nach unserer Wahl das Recht auf Zurücknahme der Ware oder eines Teiles der Ware gegen Refundierung des Kaufpreises (Kaufpreisteil) oder auf Ersatzlieferung zu. Wir haften für Schäden außerhalb zwingender gesetzlicher Vorschriften nur, wenn uns Vorsatz oder krass-grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Der Ersatz von jeglichen Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten oder von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sind überhaupt ausgeschlossen. In jedem Fall ist unsere Haftung mit der Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages begrenzt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung des Saat– und Pflanzengutes sowie die Qualität des Erntegutes übernehmen wir keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die wir nicht kontrollieren können. Abhängig von der botanischen Art können, bedingt durch die Variation, die aufgrund der Besonderheit ihrer Vermehrung zu erwarten ist, abweichende Pflanzen in der verwendeten Sorte vorkommen.

12. EIGENTUMSVORBEHALT

Bis zur vollständigen Bezahlung (einschließlich Nebenkosten), bei Scheck- und Wechselzahlungen bis zur Einlösung, behalten wir uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, nach Mahnung unter gleichzeitiger Fristsetzung von 10 Tagen die Ware zurückzufordern, wobei nur bei ausdrücklicher Rücktrittserklärung mit der Rückforderung bereits ein Rücktritt vom Vertrag verbunden ist. Im Falle der Weiterveräußerung ist der Kunde verpflichtet, seine Forderung aus der Weiterveräußerung in Höhe des Rechnungsbetrages an uns abzutreten und in seinen Büchern und Rechnungen einen entsprechenden Vermerk anzubringen, wobei die damit verbundenen Gebühren zu Lasten des säumigen Kunden gehen. Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gilt in jenen Fällen, in denen dem Kunden ein Rückgaberecht für gelieferte Ware eingeräumt wurde, im Sinne der §§ 19 IO ff, dass wir unsere Forderungen gegen den Kunden mit dessen Forderungen aus der Rückgabe der Ware aufrechnen können.

13. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG

Als Erfüllungsort und Gerichtsstand im Verkehr mit Unternehmen (im Sinne des KSchG) wird Wien vereinbart. Die gesamten Rechtsbeziehungen unterliegen ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss der Anwendung des UN Kaufrechts. Dies gilt auch für Streitigkeiten über das wirksame Zustandekommen eines Vertrages.

14. SORTEN-, SAATGUT-, ANBAU- UND PRODUKTINFORMATIONEN

Vom Verkäufer erteilte Informationen aller Art (Beschreibungen, Empfehlungen und Illustrationen in Werbeäußerungen wie Webseiten, Katalogen und Broschüren) sind unverbindlich und basieren auf Angaben der Züchter bzw. auf Erfahrungen aus unseren unter österreichischen Kultur- und Klimabedingungen durchgeführten Versuchen. Bedingt durch die individuelle Kulturführung jedes Kultivateurs bzw. Standort- und Witterungseinflüsse kann es zu abweichenden Ergebnissen kommen. Daher muss der Käufer letztlich selbst beurteilen, ob die Produkte für den geplanten Anbau unter seinen Klima- und Kulturbedingungen geeignet sind.

15. DATENSCHUTZ

Der Kunde stimmt zu, dass Daten über ihn, die wir im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung von dem Kunden oder Dritten erhalten, zu Zwecken des Controlling, Marketing, der Gestaltung von Dienstleistungen etc., von uns ermittelt, verarbeitet, benützt und übermittelt, oder sonst verwendet werden und auch zur Bewerkstelligung von Direktlieferungen durch einen Lieferanten an den Kunden dem Lieferanten überlassen werden.

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Wien, im November 2023

---

AUSTROSAAT Zentrale Wien; A–1232 Wien, Oberlaaer Straße 279
Telefon: +43 (1) 616 70 23 – 0; Telefax Verkauf: +43 (1) 616 72 69; Telefax Einkauf: +43 (1) 616 39 65;
E-Mail: officewien@austrosaat.at; rechnungswesen@austrosaat.at,

AUSTROSAAT Graz, A–8055 Graz, Puchstraße 172
Telefon: +43 (0) 316 / 29 55 02 – 0; Telefax: +43 (0) 316 / 29 55 02 26; E-Mail: officegraz@austrosaat.at

DVR 0030902, Firmennummer/Betriebsnummer: 9001415; Firmenbuch: Handelsregister Wien, Firmenbuchnummer: FN 75342y;
UID-Nummer: ATU 14477706 | ARA–Lizenznummer: 2670 | Bio-Kontrollnummer: AT-Bio-401 | Homepage: www.austrosaat.at


Ganz schön nützlich!
NEMATODEN-REDUZIERENDE TAGETES
Saatgutbedarf: Frühe Aussaat 7,5 kg/ha oder späte Aussaat 10 kg/ha.
Tagetes patula
Tall Nema Mix
Art. Nr.: 18.151.4
Tagetes erecta flora plena
Hohe Mischung
Art. Nr.: 18.162.0
keimt · wächst · blüht
www.austrosaat.at
Austrosaat, Österreichische Samenzucht- und Handels-Aktiengesellschaft
1232 Wien, Oberlaaerstraße 279
8055 Graz, Puchstraße 172
T: +43-(0)1 - 616 70 23 - 0
T: +43-(0) 316 - 29 55 02 - 0
E: officewien@austrosaat.at
E: officegraz@austrosaat.at